

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Injeção de Clofarabina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607012.html>

## Injeção de Clofarabina

pronunciado como (kloe far' a been)

### por que este medicamento é prescrito?

A clofarabina é usada para tratar a leucemia linfoblástica aguda (LLA; um tipo de câncer dos glóbulos brancos) em crianças e adultos jovens de 1 a 21 anos que já receberam pelo menos dois outros tratamentos. A clofarabina está em uma classe de medicamentos chamados antimetabólitos de nucleosídeos de purina. Funciona matando as células cancerígenas existentes e limitando o desenvolvimento de novas células cancerígenas.

### como este medicamento deve ser usado?

A clofarabina vem como uma solução para ser injetada na veia. A clofarabina é administrada por um médico ou enfermeiro. Geralmente é administrado uma vez por dia durante 5 dias seguidos. Este ciclo de dosagem pode ser repetido uma vez a cada 2 a 6 semanas, dependendo da sua resposta à medicação.

Levará pelo menos 2 horas para você receber cada dose de clofarabina. Informe o seu médico ou outro profissional de saúde imediatamente se você se sentir ansioso ou inquieto enquanto estiver recebendo a medicação.

### outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

## Que precauções especiais devo seguir?

### Antes de usar a clofarabina,

- informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico à clofarabina ou a qualquer outro medicamento.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar medicamentos para pressão alta e doenças cardíacas. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
- informe o seu médico se tem ou já teve doença renal ou hepática.
- informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. A clofarabina pode prejudicar o feto. Você deve usar controle de natalidade para evitar a gravidez durante o tratamento com clofarabina. Converse com seu médico sobre os tipos de controle de natalidade que funcionarão para você. Se você engravidar enquanto estiver usando clofarabina, ligue para o seu médico.

- informe o seu médico se estiver a amamentar. Não deve amamentar durante o tratamento com clofarabina.
- se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a receber clofarabina.
- você deve saber que a clofarabina pode causar uma condição de pele chamada síndrome mão-pé. Se você desenvolver essa condição, poderá sentir formigamento nas mãos e nos pés e, em seguida, vermelhidão, secura e descamação da pele das mãos e dos pés. Se isso acontecer, peça ao seu médico para recomendar uma loção que você possa aplicar nessas áreas. Você precisará aplicar a loção levemente e evitar esfregar as áreas com força. Seu médico também pode prescrever medicamentos para aliviar esses sintomas.

## Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Beba muitos líquidos todos os dias durante o tratamento com clofarabina, especialmente se vomitar ou tiver diarreia.

## Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

**A clofarabina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:**

- náusea
- vômito
- dor de estômago
- diarreia
- constipação
- perda de apetite
- perda de peso
- inchaço do interior da boca e nariz
- manchas brancas dolorosas na boca
- dor de cabeça
- ansiedade
- depressão
- irritabilidade
- dor nas costas, articulações, braços ou pernas
- sonolência
- pele seca, com coceira ou irritada
- rubor

**Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu médico imediatamente:**

- batimento cardíaco rápido

- respiração rápida
- falta de ar
- tontura
- tontura
- desmaio
- diminuição da micção
- dor de garganta, tosse, febre, calafrios e outros sinais de infecção
- pele pálida
- cansaço excessivo
- fraqueza
- confusão
- hematomas ou sangramentos incomuns
- sangramento nasal
- sangramento nas gengivas
- sangue na urina
- pequenas manchas vermelhas ou roxas sob a pele
- amarelecimento da pele ou olhos
- coceira
- pele vermelha, quente, inchada e sensível
- agitação incontrolável de uma parte do corpo

A clofarabina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum ao usar este medicamento.

## **o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?**

Este medicamento será armazenado no hospital.

## **n caso de emergência/sobredosagem**

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

## **Os sintomas de overdose podem incluir:**

- amarelecimento da pele ou olhos
- vômito
- irritação na pele

## Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns testes de laboratório para verificar a resposta do seu corpo à clofarabina.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

### nomes de rands

- Clolar®

Última revisão - 01/09/2010

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

---

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022