

[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Klofarabininjektion

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607012.html>

## Clofarabin injektion

uttalas som (kloe far' a been)

### hur är denna medicin utskriven?

Clofarabin används för att behandla akut lymfoblastisk leukemi (ALL; en typ av cancer i vita blodkroppar) hos barn och unga vuxna 1 till 21 år gamla som redan har fått minst två andra behandlingar. Clofarabin är i en klass av läkemedel som kallas purin-nukleosid-antimetaboliter. Det fungerar genom att döda befintliga cancerceller och begränsa utvecklingen av nya cancerceller.

### hur ska detta läkemedel användas?

Clofarabin kommer som en lösning som ska injiceras i en ven. Clofarabin administreras av en läkare eller sjuksköterska. Det ges vanligtvis en gång om dagen i 5 dagar i rad. Denna doseringscykel kan upprepas en gång varannan till var sjätte vecka, beroende på ditt svar på medicinen.

Det kommer att ta minst 2 timmar för dig att få varje dos av klofarabin. Berätta omedelbart för din läkare eller annan vårdgivare om du känner dig orolig eller rastlös medan du får medicinen.

#### användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordinerars för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

### bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

#### Innan du använder clofarabin,

- berätta för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot klofarabin eller andra läkemedel.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna mediciner för högt blodtryck och hjärtsjukdomar. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
- tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft njur- eller leversjukdom.
- berätta för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Clofarabin kan skada fostret. Du bör använda preventivmedel för att förhindra graviditet under din behandling med klofarabin. Tala med din läkare om vilka typer av preventivmedel som kommer att fungera för dig. Om du blir gravid medan du använder klofarabin, kontakta din läkare.

- tala om för din läkare om du ammar. Du bör inte amma under din behandling med klofarabin.
- om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du får klofarabin.
- du bör veta att klofarabin kan orsaka en hudsjukdom som kallas hand-fot-syndrom. Om du utvecklar detta tillstånd kan du uppleva stickningar i händer och fötter och sedan rodnad, torrhet och flagnande hud på händer och fötter. Om detta händer, be din läkare att rekommendera en lotion som du kan applicera på dessa områden. Du kommer att behöva applicera lotionen lätt och undvika att gnugga områdena kraftigt. Din läkare kan också ordinera medicin för att lindra dessa symtom.

## **hatt speciella kostråd ska jag följa?**

Drick mycket vätska varje dag under din behandling med klofarabin, särskilt om du kräks eller har diarré.

## **hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?**

**Clofarabin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:**

- illamående
- kräkningar
- magont
- diarre
- förstoppning
- aptitlöshet
- viktninskning
- svullnad av insidan av munnen och näsan
- smärtsamma vita fläckar i munnen
- huvudvärk
- ångest
- depression
- irritabilitet
- smärta i rygg, leder, armar eller ben
- dåsighet
- torr, kliande eller irriterad hud
- spolning

**Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din läkare omedelbart:**

- snabba hjärtslag

- snabb andning
- andnöd
- yrsel
- yrsel
- svimning
- minskad urinering
- ont i halsen, hosta, feber, frossa och andra tecken på infektion
- blek hud
- överdriven trötthet
- svaghet
- förvirring
- ovanliga blåmärken eller blödningar
- näsblödning
- blödande tandkött
- blod i urinen
- små röda eller lila fläckar under huden
- gulfärgning av huden eller ögonen
- klåda
- röd, varm, svullen, öm hud
- okontrollerbar skakning av en del av kroppen

Clofarabin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du använder denna medicin.

## **hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?**

Denna medicin kommer att förvaras på sjukhuset.

## **n nödfall/överdos**

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

## **Symtom på överdosering kan inkludera:**

- gulfärgning av huden eller ögonen
- kräkningar
- utslag

## Har annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att kontrollera din kropps svar på klofarabin.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

## Varuslag namn

- Clolar®

Senast granskad - 2010-01-09

[Lär dig hur du citerar den här sidan](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS® Patientmedicinering information™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

---

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022