

[Ev](#) → [İlaçlar, Otlar ve Takviyeler](#) → Klofarabin Enjeksiyonu

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607012.html>

klofarabin enjeksiyonu

(kloe far' a be) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Klofarabin, halihazırda en az iki başka tedavi görmüş olan 1 ila 21 yaş arasındaki çocuklarda ve genç yetişkinlerde akut lenfoblastik lösemi (ALL; beyaz kan hücrelerinin bir kanseri türü) tedavi etmek için kullanılır. Klofarabin, purin nükleozid antimetabolitleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Mevcut kanser hücrelerini öldürerek ve yeni kanser hücrelerinin gelişimini sınırlayarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Klofarabin bir damara enjekte edilecek bir çözelti olarak gelir. Klofarabin bir doktor veya hemşire tarafından uygulanır. Genellikle arka arkaya 5 gün boyunca günde bir kez verilir. Bu dozlama döngüsü, ilaca verdiğiniz cevaba bağlı olarak her 2 ila 6 haftada bir tekrarlanabilir.

Her bir klofarabin dozunu almanız en az 2 saat sürecektir. İlacı alırken endişeli veya huzursuz hissediyorsanız, doktorunuza veya diğer sağlık uzmanınıza hemen bildirin.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Klofarabin kullanmadan önce,

- klofarabin veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.
- aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Yüksek tansiyon ve kalp hastalığı için ilaçlardan bahsettiğinizden emin olun. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.
- böbrek veya karaciğer hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz.
- Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Klofarabin fetüse zarar verebilir. Klofarabin ile tedaviniz sırasında hamileliği önlemek için doğum kontrolünü kullanmalısınız. Sizin için işe yarayacak doğum kontrol türleri hakkında doktorunuzla konuşun. Klofarabin kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

- emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Klofarabin ile tedaviniz sırasında emzirmemelisiniz.
- Diş ameliyatı da dahil olmak üzere bir ameliyat geçiriyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize klofarabin aldığınızı söyleyin.
- Klofarabinin el-ayak sendromu denen bir cilt rahatsızlığına neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu durumu geliştirirseniz, ellerde ve ayaklarda karıncalanma ve ardından ellerde ve ayaklarda ciltte kızarıklık, kuruluk ve pullanma yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda doktorunuzdan bu bölgelere uygulayabileceğiniz bir losyon önermesini isteyin. Losyonu hafifçe uygulamanız ve bölgeleri kuvvetlice ovalamaktan kaçınmanız gerekecektir. Doktorunuz bu semptomları hafifletmek için ilaç da reçete edebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Klofarabin ile tedaviniz sırasında, özellikle kusuyorsanız veya ishaliniz varsa, her gün bol miktarda sıvı içiniz.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Klofarabin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- mide bulantısı
- kusma
- karın ağrısı
- ishal
- kabızlık
- iştah kaybı
- kilo kaybı
- ağız ve burun içinin şişmesi
- ağızda ağrılı beyaz lekeler
- baş ağrısı
- endişe
- depresyon
- sinirlilik
- sırtta, eklemlerde, kollarda veya bacaklarda ağrı
- uyuşukluk
- kuru, kaşıntılı veya tahriş olmuş cilt
- kızarma

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın:

- hızlı nabız

- hızlı nefes alma
- nefes darlığı
- baş dönmesi
- sersemlik
- bayılma
- azalmış idrara çıkma
- boğaz ağrısı, öksürük, ateş, titreme ve diğer enfeksiyon belirtileri
- soluk ten
- aşırı yorgunluk
- zayıflık
- bilinç bulanıklığı, konfüzyon
- olağandışı morarma veya kanama
- burun kanaması
- diş eti kanaması
- idrarda kan
- cilt altında küçük kırmızı veya mor lekeler
- cilt veya gözlerin sararması
- kaşıntı
- kırmızı, sıcak, şiş, hassas cilt
- vücudun bir bölümünün kontrol edilemeyen sallanması

Klofarabin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı sorunlarınız varsa doktorunuzu arayın.

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilaç hastanede saklanacaktır.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefonda zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:<https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

- cilt veya gözlerin sararması
- kusma
- döküntü

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun klofarabine yanıtını kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- klozet®

Son İncelenme - 09/01/2010

[Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin](#)



[Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi](#)

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022