Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a691001.html

クロザピン

（kloe'za peen）と発音します

重要な警告：

クロザピンは深刻な血液状態を引き起こす可能性があります。医師は、治療を開始する前、治療中、および治療後少なくとも4週間、特定の臨床検査を注文します。医師は最初は週に1回検査を注文しますが、治療が続くにつれて検査の注文頻度が少なくなる場合があります。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。弱さ; 発熱、喉の痛み、悪寒、またはインフルエンザや感染症の他の兆候; 異常な膣分泌物またはかゆみ; 口や喉の痛み; 治癒するのに長い時間がかかる傷; 排尿時の痛みや灼熱感; 直腸領域またはその周辺の痛みまたは痛み; または腹痛。

この薬にはリスクがあるため、クロザピンは特別な制限された配布プログラムを通じてのみ入手可能です。クロザピンの製造業者によって、クロザピンのリスク評価および軽減戦略（REMS）プログラムと呼ばれる、必要な監視なしに人々がクロザピンを服用しないようにするためのプログラムが設定されています。あなたの医者とあなたの薬剤師はクロザピンREMSプログラムに登録されていなければなりません、そしてあなたの薬剤師は彼または彼女があなたの血液検査の結果を受け取らない限りあなたの薬を調剤しません。このプログラムの詳細と薬の服用方法については、医師にご相談ください。

クロザピンは発作を引き起こす可能性があります。発作を起こした、または発作を起こしたことがあるかどうかを医師に伝えてください。クロザピンを服用している間は、車の運転、機械の操作、水泳、登山をしないでください。突然意識を失った場合、自分自身や他の人に危害を加える可能性があります。発作を起こした場合は、すぐに医師に連絡するか、緊急治療を受けてください。

クロザピンは、心筋炎（危険な可能性のある心筋の腫れ）または心筋症（心臓が正常に血液を送り出すのを妨げる心筋の肥大または肥厚）を引き起こす可能性があります。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。インフルエンザのような症状; 呼吸困難または速い呼吸; 熱; 胸痛; または速い、不規則な、またはドキドキする心拍。

クロザピンは、立ち上がったとき、特に最初に服用を開始したとき、または用量を増やしたときに、めまい、立ちくらみ、または失神を引き起こす可能性があります。心臓発作、心不全、またはゆっくりとした不整脈があるか、または高血圧の薬を服用しているかどうかを医師に伝えてください

プレッシャー。また、激しい嘔吐や下痢、脱水症状がある場合、または治療中にこれらの症状が現れた場合は、医師に相談してください。あなたの医者はおそらくあなたを低用量のクロザピンで始め、あなたの体が薬に順応する時間を与えそしてあなたがこの副作用を経験する可能性を減らすためにあなたの用量を徐々に増やします。クロザピンを2日以上服用しない場合は、医師に相談してください。あなたの医者はおそらくあなたに低用量のクロザピンであなたの治療を再開するように言うでしょう。

高齢者での使用：

研究によると、クロザピンなどの抗精神病薬（精神疾患の薬）を服用している認知症（記憶、明確な思考、コミュニケーション、日常生活の遂行能力に影響を及ぼし、気分や性格の変化を引き起こす可能性のある脳障害）の高齢者治療中に死亡する可能性が高くなります。

クロザピンは、認知症の高齢者の行動問題の治療のために食品医薬品局（FDA）によって承認されていません。あなた、家族、またはあなたが世話をしている人が認知症を患っており、この薬を服用している場合は、クロザピンを処方した医師に相談してください。詳細については、FDAのWebサイトにアクセスしてください。http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

なぜこの薬が処方されているのですか？

クロザピンは、他の薬で助けられなかった人や自殺しようとした人の統合失調症の症状（思考の乱れや異常な思考、人生への興味の喪失、強い感情や不適切な感情を引き起こす精神疾患）の治療に使用されます。再び自分自身を殺したり傷つけたりしようとする可能性があります。クロザピンは、非定型抗精神病薬と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それは脳内の特定の天然物質の活動を変えることによって機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

クロザピンは、錠剤、口腔内崩壊錠（口の中ですぐに溶ける錠剤）、および経口懸濁液（液体）として提供されます。通常、1日1〜2回服用します。毎日ほぼ同じ時間にクロザピンを服用してください。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指示通りにクロザピンを服用してください。多かれ少なかれ服用したり、医師の処方よりも頻繁に服用したりしないでください。

口腔内崩壊錠をホイル包装に押し込まないでください。代わりに、乾いた手を使ってホイルをはがします。すぐに錠剤を取り出し、舌の上に置きます。錠剤はすぐに溶け、唾液を飲み込むことができます。崩壊錠を飲み込むのに水は必要ありません。

クロザピン経口懸濁液を測定するには、次の手順に従います。

1.キャップを時計回り（右）に回して、経口懸濁液容器のキャップがしっかり締まっていることを確認します。使用前にボトルを10秒間上下に振ってください。

2.キャップを押し下げてボトルキャップを取り外し、反時計回り（左）に回します。新しいボトルを初めて開くときは、アダプターの上部が並ぶまでアダプターをボトルに押し込みます。

ボトルの上部まで。

3.投与量が1mL以下の場合は、小さい方（1 mL）の経口注射器を使用してください。投与量が1mLを超える場合は、大きい方（9 mL）の経口注射器を使用してください。

4.プランジャーを引き戻して、経口注射器に空気を充填します。次に、経口注射器の開いた先端をアダプターに挿入します。プランジャーを押し下げて、経口注射器からボトルにすべての空気を押し込みます。

5.経口注射器を所定の位置に保持しながら、ボトルを慎重に上下逆にします。プランジャーを引き戻して、薬の一部をボトルから経口注射器に引き出します。プランジャーを完全に引き出さないように注意してください。

6.経口注射器のプランジャーの端の近くに少量の空気が見えます。プランジャーを押すと、薬がボトルに戻り、空気が消えます。プランジャーを引き戻して、正しい投薬量を経口注射器に引き込みます。

7.経口注射器をボトルに保持したまま、注射器が上になるようにボトルを慎重に上に向けます。プランジャーを押さずに、ボトルネックアダプターから経口シリンジを取り外します。あなたがそれを経口注射器に引き込んだ直後に薬を服用してください。用量を準備し、後で使用するために注射器に保管しないでください。

8.経口注射器の開いた先端を口の片側に置きます。経口注射器の周りの唇をしっかりと閉じ、液体が口に入るときにプランジャーをゆっくりと押します。薬が口に入るときにゆっくりと飲み込みます。

9.アダプターをボトルに残します。キャップをボトルに戻し、時計回り（右）に回して締めます。

10.使用後は、毎回温かい水道水で経口注射器を洗い流してください。カップに水を入れ、経口注射器の先端をカップの水に入れます。プランジャーを引き戻し、水を経口注射器に引き込みます。プランジャーを押して、経口注射器がきれいになるまで水を流しまたは別の容器に噴出させます。経口注射器を風乾させ、残ったすすぎ水を処分します。

クロザピンは統合失調症を抑制しますが、治癒はしません。クロザピンの効果を十分に実感できるようになるまでには、数週間以上かかる場合があります。気分が良くてもクロザピンを服用し続けてください。医師に相談せずにクロザピンの服用を中止しないでください。あなたの医者はおそらくあなたの用量を徐々に減らしたいでしょう。

この薬の用途

この薬は他の用途に処方されるべきではありません。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

クロザピンを服用する前に、

- クロザピン、その他の薬、またはクロザピン錠の成分にアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。
- 医師と薬剤師に、処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、および服用中または服用予定のハーブ製品を伝えてください。重要な警告のセクションに記載されているものと、次のいずれかに必ず言及してください。ジフェンヒドラミン（ベネドリル）などの抗ヒスタミン薬。シプロフロキサシン（Cipro）やエリスロマイシン（EES、E-Mycin、その他）などの抗生物質。ベンズトロピン（コゲンチン）; シメチジン（タガメット）; ブプロピオン（Aplenzin、Wellbutrin、

Zyban、Contrave）; シクロベンザプリン（Amrix）; エスシタロプラム（Lexapro）; 不安神経症、高血圧、精神疾患、乗り物酔い、または吐き気のための薬; エンカイニド、フレカイニド、プロパフェノン（Rythmol）、キニジン（Nuedexta）などの不整脈の薬。経口避妊薬; カルバマゼピン（Equetro、Tegretol、Teril、その他）またはフェニトイン（Dilantin、Phenytek）などの発作の薬; リファンピン（リファチン、リマクタン、リファメート、リファタール）; 鎮静剤; デュロキセチン（シンバルタ）、フルオキセチン（プロザック、サラフェム、セルフェムラなど）、フルボキサミン（ルボックス）、パロキセチン（ブリスデル、パキシル、ペクセバ）、セルトラリン（ゾロフト）などの選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）。睡眠薬; テルビナフィン（ラミシル）; と精神安定剤。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。

- あなたが服用しているハーブ製品、特にセントジョンズワートを医師に伝えてください。
- 重要な警告のセクションに記載されている状態に加えて、あなたまたはあなたの家族の誰かがQT間隔の延長（不整脈、失神、または突然死を引き起こす可能性のあるまれな心臓の問題）または糖尿病を経験したことがあるかどうかを医師に伝えてください。便秘、吐き気、嘔吐、または胃の痛みや膨満がある場合は、医師に相談してください。または、泌尿器系または前立腺（男性の生殖腺）に問題がある、または問題があったことがある場合。脂質異常症（高コレステロール値）; 麻痺性イレウス（食物が腸を通過できない状態）; 緑内障; 高血圧または低血圧; バランスを保つのに苦労します。または心臓、腎臓、肺、または肝臓の病気。また、重度の副作用のために精神疾患の薬の服用をやめなければならなかった場合は、医師に相談してください。
- 妊娠しているかどうか、特に妊娠の最後の数か月にいる場合、または妊娠を計画している場合や授乳中の場合は、医師に相談してください。クロザピンを服用中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。クロザピンは、妊娠の最後の数ヶ月間に服用した場合、出産後の新生児に問題を引き起こす可能性があります。
- 歯科手術を含む手術を受けている場合は、クロザピンを服用していることを医師または歯科医に伝えてください。
- あなたはアルコールがこの薬によって引き起こされる眠気を増す可能性があることを知っておくべきです。
- タバコ製品を使用するかどうかを医師に伝えてください。喫煙はこの薬の効果を低下させる可能性があります。
- まだ糖尿病にかかっていない場合でも、この薬を服用している間、高血糖（血糖値の上昇）を経験する可能性があることを知っておく必要があります。統合失調症の場合は、統合失調症のない人よりも糖尿病を発症する可能性が高く、クロザピンまたは同様の薬を服用すると、このリスクが高まる可能性があります。クロザピンを服用しているときに次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に相談してください：極度の喉の渇き、頻尿、極度の空腹感、かすみ目、脱力感。高血糖はケトアシドーシスと呼ばれる深刻な状態を引き起こす可能性があるため、これらの症状のいずれかが発生したらすぐに医師に連絡することが非常に重要です。ケトアシドーシスは、早期に治療しないと生命を脅かす可能性があります。ケトアシドーシスの症状には、口渇、吐き気と嘔吐、息切れ、
- フェニルケトン尿症（PKU、重度の知的障害を引き起こす可能性のある脳への損傷を防ぐために特別な食事療法に従う必要がある遺伝性疾患）がある場合は、経口崩壊錠剤にフェニルアラニンを形成するアスパルテームが含まれていることを知っておく必要があります。

特別な食事の指示に従うべきですか？

この薬を服用している間、カフェイン入り飲料を飲むことについて医師に相談してください。

服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服用時間になっている場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

クロザピンを2日以上服用し忘れた場合は、薬を服用する前に医師に連絡する必要があります。あなたの医者はより低い線量であなたの投薬を再開したいかもしれません。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

クロザピンは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 眠気
- めまい、不安定感、バランスの維持に問題がある
- 唾液分泌の増加
- 口渇
- 落ち着きのなさ
- 頭痛

いくつかの副作用は深刻な場合があります。次の症状のいずれか、または重要な警告または特別な注意事項のセクションに記載されている症状が発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- 便秘; 吐き気; 胃の腫れや痛み; または嘔吐
- 制御できない握手
- 失神
- 落下
- 排尿困難または膀胱制御の喪失
- 錯乱
- 視力の変化
- 震え
- 重度の筋肉のこわばり
- 発汗
- 行動の変化
- 異常な出血またはあざ
- 食欲減少
- 胃のむかつき
- 皮膚や目の黄変
- 胃の右上部分の痛み

- エネルギーの欠乏

クロザピンは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。室温で、光や過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。経口懸濁液を冷蔵または凍結しないでください。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。

- めまい
- 失神
- ゆっくりとした呼吸
- 心拍数の変化
- 意識の喪失

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。あなたの医者はクロザピンに対するあなたの体の反応をチェックするために特定の臨床検査を命じます。

他の人にあなたの薬を服用させないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- クロザリル®
- FazaClo®ODT
- Versacloz®

最終改訂日-2022年1月15日

このページを引用する方法を学ぶ

American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項
AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省
国立衛生研究所
ページの最終更新日：2022年3月25日