

קבל את המידע העדכני ביותר על בריאות הציבור מ-CDC

## מידע על תרופות

שם: Elvitegravir / Cobicistat / Emtricitabine / Tenofovir Disoproxil Fumarate

מותג: סטריבילד

שמות אחרים: EVG / COBI / FTC / TDF, EVG / c / TDF/ FTC

שיעור סמים: תרופות משולבות

(Integrase Strand Transfer Inhibitor) elvitegravir

מעכב טרנסקריפטאז של נוקלאוזיד (emtricitabine, tenofovir DF) משפר

פרמקוקינטי (קוביציסטט)

תמונת תרופה: (לחץ להגדלה)



## מה הדברים הכי חשובים לדעת על Stribild?

סטריבילד עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות ומסכנות חיים. אלה כוללים הצטברות של חומצה לקטית בדם (חמצת לקטית), כבדבעיות, בעיות כליות חדשות או מחמירות, כולל אי ספיקת כליות, וכן אינטראקציות תרופתיות.

צור קשר עם הרופא שלך מיד אם יש לך אחד מהתסמינים הבאים שיכולים להיות סימנים לחמצת לקטית:

חולשה או עייפות

כאבי שרירים חריגים

קוצר נשימה או נשימה מהירה

כאבי בטן עם בחילות והקאות

ידיים ורגליים קרות או כחולות

סחרחורת או סחרחורת

דופק מהיר או חריג

**צור קשר עם הרופא שלך מיד אם יש לך אחד מהתסמינים הבאים שיכולים להיות סימנים לבעיות כבד:**

הצהבה של העור או לובן העיניים (צהבת)

שתן בצבע כהה

יציאות בצבע בהיר

אובדן תיאבון למשך מספר ימים או יותר

בחילה או הקאות

כאב, כאב או רגישות בצד ימין של הבטן/אזור הבטן

עקצוץ

**אם יש לך גם HIV וגם בנגיף הפטיטיס B שלך HBV (הדבקה HBV) עלול להחמיר (להתלקח) אם תפסיק ליטול Stribild. אל תפסיק ליטול Stribild מבלי לדבר תחילה עם הרופא שלך.**

**צור קשר עם הרופא שלך מיד אם יש לך אחד מהתסמינים הבאים שיכולים להיות סימנים להחמרה בבעיית כליות (נקראת תסמונת פאנקוני), אשר עשוי להיות קשור לתרופות המכילות טנופוביר:**

כאבי עצמות שלא חולפים או מחמירים

כאב בזרועות, בידיים, ברגליים או ברגליים

עצמות שבורות

כאבי שרירים או חולשה

**נטילת Stribild עם תרופות מסוימות עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות ומסכנות חיים.** ספר לרופא שלך על כל התרופות שאתה נוטל, כולל תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים ותוספי צמחים.

בזמן נטילת Stribild, חשוב לקיים את כל הפגישות שלך עם הרופא שלך.

## מה זה סטריבילד?

היא תרופה מרשם שאושרה על ידי ארה"ב Stribild מנהל המזון והתרופות. במבוגרים וילדים בני 12 ומעלה ששוקלים לפחות 77 פאונד (35 ק"ג) ועומדים בדרישות מסוימות, כפי שנקבע על ידי ספק שירותי בריאות HIV- (טיפול בזיהום ב FDA)

סטריבילד הוא HIV מלאמשטר טיפולוצריך לאלשמש עם תרופות אחרות ל-HIV

סטריבילד מכיל ארבע תרופות שונות: tenofovir disoproxil fumarate, cobicistat, amtricitabine, elvitegravir

למידע נוסף על השימוש ב-Stribild באנשים עם HIV, אנא עיין ב-הנחיות לשימוש בחומרים אנטי-רטרו-ויראליים במבוגרים ובני נוער החיים עם HIV וההנחיות לשימוש בחומרים אנטי-רטרו-ויראליים בהדבקת HIV בילדים.

תרופות HIV אינן יכולות לרפא HIV/איידיס, אך נטילת תרופות HIV כל יום עוזרת לאנשים עם HIV לחיות חיים ארוכים ובריאים יותר. תרופות ל-HIV גם מפחיתות את הסיכון ל-HIV הפצה. אם אתה נוטל תרופות ל-HIV, אל תפחית, תדלג או תפסיק ליטול אותן, אלא אם כן הרופא שלך מורה לך לעשות זאת.

## מה עלי לספר לרופא שלי לפני נטילת Stribild?

לפני נטילת Stribild, ספר לרופא שלך:

אם אתה אלרגי לאחת מתרופות ה-HIV ב-elvitegravir, cobicistat, amtricitabine, או tenofovir disoproxil fumarate (או כל תרופה אחרת).

אם יש לך בעיות בכבד, כולל זיהום בנגיף הפטיטיס (HBV) B.

אם יש לך בעיות בכליות.

אם יש לך בעיות בעצמות.

אם יש לך מצב רפואי אחר.

אם את בהריון או מתכננת להיכנס להריון. אין להשתמש בסטריבילד במהלך ההריון מכיוון שאולי אין מספיק מהתרופה בגוף במהלך ההריון. שוחח עם הרופא שלך על סיכונים אפשריים עם נטילת Stribild במהלך ההריון. למידע נוסף על השימוש ב-Stribild במהלך ההריון, עיין ב-המלצות לשימוש בתרופות אנטי-רטרו-ויראליות בנשים הרות עם הידבקות ב-HIV והתערבויות להפחתת העברת HIV סביב הלידה בארצות הברית.

אם את מניקה או מתכננת להניק, עבור נשים עם HIV בארצות הברית, ה קו מנחה לא ממליצה על הנקה. לפני שהתינוק שלך נולד, או אם אתה כבר מניקה, דבר עם הרופא שלך כדי לדון באפשרויות חלופיות להאכלת תינוקך.

אם אתה משתמשת ב-הורמון מניעה מבוססת (כגון גלולות, שתלים או טבעות נרתיקיות). הרופא שלך עשוי להמליץ לך להשתמש בצורות נוספות או חלופיות של אמצעי מניעה בזמן נטילת Stribild. למידע נוסף על שימוש בתרופות למניעת הריון ו-HIV בו-זמנית, עיין ב-HIVinfo אינפוגרפיקה של HIV ומניעת הריון.

**לגבי תרופות אחרות עם מרשם או ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים (כולל סנט ג'ון wort) שאתה לוקח או מתכוון לקחת.** סטריבילד עשוי להשפיע על אופן הפעולה של תרופות או מוצרים אחרים, ותרופות או מוצרים אחרים עשויים להשפיע על אופן הפעולה

סטריבילד עובד. נטילת Stribild יחד עם תרופות או מוצרים מסוימים עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות ומסכנות חיים.

## כיצד עלי ליטול סטריבילד?

מגיע בצורת טבליות. כל טאבלט מכיל Stribild:

150 מ"ג elvitegravir

150 מ"ג [cobicistat](#)

200 מ"ג [גאמטריציטבין](#)

300 מ"ג [tenofovir disoproxil fumarate](#)

קח Stribild בהתאם להוראות הרופא שלך.

קח סטריבילד דרך הפה ועם האוכל. אין ליטול סטריבילד עם תרופות אחרות ל-HIV.

אם אתה צריך ליטול תרופה לטיפול בהפרעות עיכול (נוגד חומצה) המכילה אלומיניום ומגנזיום הידרוקסיד או סידן פחמתי במהלך הטיפול ב-Stribild, קח אותה לפחות שעתיים לפני או לאחר נטילת סטריבילד.

אם נטלת יותר מדי Stribild, צור קשר עם הרופא או המרכז המקומי לבקרת רעלים (1-800-222-1222) מיד, או פנה לחדר המיון הקרוב של בית החולים.

למידע נוסף על אופן נטילת Stribild, ראה אתתווית תרופת ה-FDA.

## מה עלי לעשות אם אשכח מנה?

אם אתה מתגעגע [אמנה](#) של Stribild, קח את המנה שהוחמצה ברגע שאתה זוכר אותה. אבל אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה שלך, דלג על המנה שהוחמצה ופשוט קח את המנה הבאה שלך בזמן הקבוע. אין ליטול שתי מנות בו-זמנית כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

## אילו תופעות לוואי יכולות לגרום לסטריבילד?

סטריבילד עלול לגרום לתופעות לוואי. כמה תופעות לוואי יכולות להיות חמורות כפי שצוין לעיל. תופעות לוואי רבות של תרופות HIV, כגון בחילות או סחרחורת מדי פעם, ניתנות לניהול. ראה את גיליון המידע על HIV [תרופות ל-HIV ותופעות לוואילמידע נוסף](#).

תופעות לוואי אפשריות אחרות של Stribild כוללות:

בעיות בעצמות, כולל כאבי עצמות, כאבי עצמות, או הידלדלות ([אוסטאופניה](#)), מה שעלול להוביל לשברים.

שינויים שלך מערכת החיסון ([שקוראים לשיקום חיסוני תסמונת דלקתית או IRIS](#)). IRIS הוא מצב המתרחש לפעמים כאשר מערכת החיסון מתחילה להתאושש

טיפול בתרופת HIV. ככל שמערכת החיסון מתחזקת, ייתכן שתהיה לה תגובה מוגברת לזיהום שהיה מוסתר בעבר.

ספר לרופא שלך אם יש לך תופעות לוואי שמטרידות אותך או שאינן חולפות.

אלה לא כל ההשפעות האפשריות של סטריבילד. למידע נוסף על תופעות לוואי אפשריות של Stribild, קרא אתתווית תרופה [או תוספת לאריזה](#) שוחח עם הרופא או הרוקח שלך.

אתה יכול לדווח על תופעות לוואי ל-FDA בטלפון 1-800-332-1088 (1-800-332-1088) או באינטרנט.

## כיצד יש לאחסן את Stribild?

אחסן את Stribild בטמפרטורת החדר, 68°F עד 77°F (20°C עד 25°C).

שמור את Stribild במיכל שבו הוא הגיע ושמור את המיכל סגור היטב. אם במיכל יש חבילה קטנה של חומר ייבוש (נקרא חומר ייבוש), אל תסיר אותו. חומר היבש מגן על התרופה מפני לחות.

אין להשתמש ב-Stribild אם החותם המקורי מעל פתח המיכל שבור או חסר.

לזרוק את Stribild שכבר אין צורך או שפג תוקפו (לא מעודכן). לעקוב אחר הנחיות ה-FDA [כיצד להשליך](#) בבטחה תרופה שאינה בשימוש.

הרחק את Stribild וכל התרופות מהישג ידם של ילדים.

## היכן אוכל למצוא מידע נוסף על Stribild?

למידע נוסף על השימוש ב-Stribild באנשים עם HIV, אנא עיין ב-[הנחיות לשימוש בחומרים](#)

[אנטי-רטרו-ויראליים במבוגרים ובני נוער החיים עם HIV וההנחיות לשימוש בחומרים אנטי-רטרו-ויראליים](#)

[בהדבקת HIV בילדים](#).

סיכום תרופה זה של גרסת המטופל מבוסס על התוויות/ות ה-FDA הבאים: [לוח](#). [קטע מידע](#) ייעוץ למטופל בתווית כולל מידע עבור אנשים הנוטלים Stribild.

מחקרים הקשורים לסטריבילד, מ-[ClinicalTrials.gov](#).

רשימה של תרופות ל-HIV שאושרו על ידי ה-FDA, מ-HIVinfo.

## מידע על היצרן

Gilead Sciences, Inc.

מספר ראשי: 800-445-3235 סיוע

למטופל: 800-226-2056

נבדק לאחרונה: 8 באוקטובר 2021

## הדפס

[גרסת המטופל HTML](#)

[תווית ה-FDA: טאבלט PDF](#)