

Source : U.S. National Institutes of Health

CDCから最新の公衆衛生情報を入手する

医薬品情報

発音する：エルビテグラビル/コビススタット/エムトリシタビン/フマル酸テノホビルジソプロキシル ブラン

ド名：ストリビルド

他の名前： EVG / COBI / FTC / TDF、EVG / c / TDF / FTC

ドラッグクラス：併用薬

インテグラーゼ鎖転移阻害剤（エルビテグラビル）

ヌクレオシド逆転写酵素阻害剤（エムトリシタビン、テノホビルDF）薬物

動態エンハンサー（コビススタット）

薬物画像:(クリックして拡大)



Stribildについて知っておくべき最も重要なことは何ですか？

Stribildは、生命を脅かす深刻な副作用を引き起こす可能性があります。これらには、乳酸血中（乳酸アシドーシス）、肝臓問題、腎不全を含む新しいまたは悪化する腎臓の問題、および薬物相互作用。

乳酸アシドーシスの兆候である可能性のある次の症状のいずれかがある場合は、すぐに医療提供者に連絡してください。

脱力感または倦怠感

異常な筋肉痛

息切れまたは速い呼吸

吐き気と嘔吐を伴う腹痛

冷たいまたは青い手と足

めまいまたは立ちくらみ

速いまたは異常な心拍

肝臓の問題の兆候である可能性のある次の症状のいずれかがある場合は、すぐに医療提供者に連絡してください。

肌や白目が黄色くなる（黄疸）。

濃い色の尿

明るい色の排便

数日以上の食欲不振

吐き気または嘔吐

胃/腹部の右側の痛み、痛み、または圧痛

かゆみ

あなたがHIVとB型肝炎ウイルス感染（HBV）そしてあなたのHBVであるStribildを取る 感染 Stribildの服用をやめると、悪化（フレアアップ）する可能性があります。最初に医療提供者に相談せずにStribildの服用をやめないでください。

腎臓の問題が悪化している可能性のある次の症状のいずれかがある場合は、すぐに医療提供者に連絡してください（ファンコニ症候群）、これはテノフォビル含有薬に関連している可能性があります：

消えない、または悪化しない骨の痛み

腕、手、足、足の痛み

骨折

筋肉痛または脱力感

特定の薬と一緒にStribildを服用すると、生命を脅かす深刻な副作用を引き起こす可能性があります。処方薬や市販薬、ビタミン、ハーブサプリメントなど、服用しているすべての薬について医療提供者に伝えてください。

Stribildを服用している間は、医療提供者との約束をすべて守ることが重要です。

Stribildとは何ですか？

Stribildは米国で承認された処方薬です食品医薬品局（FDA）少なくとも77ポンド（35 kg）の体重があり、医療提供者によって決定された特定の要件を満たす12歳以上の成人および子供におけるHIV感染の治療。

Stribildは完全なHIVで治療レジメンそしてすべきいいえ他のHIV薬と一緒に使用する

Stribildには4つの異なる薬が含まれています：エルビテグラビル、コビススタット、エムトリシタビン、とテノホビルジソプロキシルフマル酸塩。

HIV感染者におけるStribildの使用の詳細については、以下を参照してください。HIVとともに生きる成人および青年における抗レトロウイルス薬の使用に関するガイドラインそしてその小児HIV感染症における抗レトロウイルス薬の使用に関するガイドライン。

HIV薬はHIV/AIDSを治すことはできませんが、HIV薬を毎日服用することで、HIV感染者はより長く健康的な生活を送ることができます。HIV薬はまたHIVのリスクを減らしますトランスミッション。HIV薬を服用している場合は、医療提供者からの指示がない限り、服用を減らしたり、スキップしたり、中止したりしないでください。

Stribildを服用する前に、医療提供者に何を伝えればよいですか？

Stribildを服用する前に、医療提供者に次のことを伝えてください。

Stribild (elvitegravir、elvitegravir、コビススタット、エムトリシタビン、またテノホビルジソプロキシルフマル酸塩) または他の薬。

B型肝炎ウイルス感染症 (HBV) などの肝臓の問題がある場合。

腎臓に問題がある場合。

骨に問題がある場合。

他の病状がある場合。

妊娠中または妊娠を予定している場合。妊娠中は体内に十分な量の薬がない可能性があるため、妊娠中はStribildを使用しないでください。妊娠中にStribildを服用することで起こりうるリスクについては、医療提供者に相談してください。妊娠中のStribildの使用の詳細については、以下を参照してください。米国におけるHIV感染の妊婦における抗レトロウイルス薬の使用と周産期のHIV感染を減らすための介入に関する推奨事項。

母乳育児をしている場合、または母乳育児を計画している場合。米国のHIV感染者の場合、ガイドライン母乳育児はお勧めしません。赤ちゃんが生まれる前、またはすでに母乳育児をしている場合は、医療提供者に相談して、赤ちゃんに授乳するための代替オプションについて話し合ってください。

使用している場合ホルモンベースの避妊（ピル、インプラント、または膣リングなど）。医療提供者は、Stribildを服用している間、避妊の追加または代替の形式を使用することを推奨する場合があります。避妊とHIV薬を同時に使用方法の詳細については、HIVinfoをご覧ください。HIVと避妊のインフォグラフィック。

あなたが服用している、または服用する予定のその他の処方薬および非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、およびハーブ製品（セントジョンズワートを含む）について。Stribildは他の薬や製品の働きに影響を与える可能性があり、他の薬や製品はどのように影響を与える可能性があります

Stribildは動作します。Stribildを特定の薬や製品と一緒に服用すると、生命を脅かす深刻な副作用を引き起こす可能性があります。

Stribildはどのように服用すればよいですか？

Stribildはタブレット形式で提供されます。各タブレットには以下が含まれます：

150mgのエルビテグラビル

150mg [コビススタット](#)

200mg [エムトリシタビン](#)

300mg [テノホビルジソプロキシルフマル酸塩](#)

医療提供者の指示に従ってStribildを服用してください。

Stribildを口と食べ物と一緒に服用してください。Stribildを他のHIV薬と一緒に服用しないでください。

Stribildによる治療中に、水酸化アルミニウムと水酸化マグネシウムまたは炭酸カルシウムを含む消化不良の薬（制酸剤）を服用する必要がある場合は、Stribildを服用する少なくとも2時間前または服用してください。

Stribildを飲みすぎた場合は、すぐに医療提供者または地域の毒物管理センター（1-800-222-1222）に連絡するか、最寄りの病院の緊急治療室に行ってください。

Stribildの服用方法の詳細については、[FDA医薬品ラベル](#)。

服用を忘れた場合はどうすればよいですか？

あなたが逃した場合用量ストリビルドの、あなたがそれを覚えたらずぐに逃した用量を服用してください。ただし、次の通常の服用時間になっている場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、次の通常の時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために、同時に2回分を飲まないでください。

Stribildはどのような副作用を引き起こす可能性がありますか？

Stribildは副作用を引き起こす可能性があります。上記のように、いくつかの副作用は深刻な場合があります。吐き気や時折のめまいなど、HIV薬による多くの副作用は管理可能です。上のHIVinfoファクトシートを参照してください [HIV薬と副作用詳細](#)については。

Stribildのその他の考えられる副作用は次のとおりです。

骨の痛み、痛み、菲薄化などの骨の問題（骨減少症）、[骨折につながる](#)可能性があります。

[あなたの変化免疫系（呼ばれる免疫再構築炎症症候群またはIRIS）](#)。IRISは、免疫系が空気を回復し始めるときに時々発生する状態です

HIV薬による治療。免疫系が強くなると、以前は隠れていた感染症に対する反応が高まる可能性があります。

気になる副作用や消えない副作用がある場合は、医療提供者に伝えてください。

これらは、Stribildの考えられるすべての副作用ではありません。Stribildの考えられる副作用の詳細については、[ドラッグラベル](#)または[添付文書](#)または、[医療提供者](#)または[薬剤師](#)に相談してください。

副作用は、1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) でFDAに報告できます。[オンライン](#)。

Stribildはどのように保管する必要がありますか？

Stribildは、20°Cから25°C (68°Fから77°F) の室温で保管してください。

Stribildを入った容器に入れ、容器をしっかりと閉じたままにします。容器に乾燥剤（乾燥剤と呼ばれる）の小さなパケットが入っている場合は、それを取り出さないでください。乾燥剤は薬を湿気から保護します。

容器の開口部の元のシールが壊れているかなくなっている場合は、Stribildを使用しないでください。

不要になった、または期限切れになった（期限切れの）Stribildを破棄します。従う[FDAガイドライン](#)未使用の薬を安全に処分する方法について。

Stribildとすべての薬を子供の手の届かないところに保管してください。

Stribildに関する詳細情報はどこにありますか？

HIV感染者におけるStribildの使用の詳細については、以下を参照してください。[HIVとともに生きる成人および青年における抗レトロウイルス薬の使用に関するガイドライン](#)そしてその[小児HIV感染症における抗レトロウイルス薬の使用に関するガイドライン](#)。

この患者バージョンの薬剤の概要は、次のFDAラベルに基づいています。タブレット。[ラベル](#)の患者カウンセリング情報セクションには、Stribildを服用している人々のための情報が含まれています。

Stribild関連の調査研究、から[ClinicalTrials.gov](#)。

のリスト[FDA承認のHIV薬](#)、[HIVinfo](#)から。

メーカー情報

ギリアドサイエンシズ株式会社

メイン番号：800-445-3235患者

支援：800-226-2056

最終レビュー：2021年10月8日

印刷

[患者バージョンHTML](#)

[FDAラベル：タブレットPDF](#)