

TITLE - COBICISTAT + ELVITEGRAVIR + EMTRICITABINE+ TENOFOVIR / GENVOYA MEDICATION PATIENT INFORMATION IN PORTUGUESE

Source : U.S. National Institutes of Health

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Obtenha as últimas informações de saúde pública do CDC

Informações sobre medicamentos

Pronunciar: Elvitegravir / Cobicistate / Emtricitabina / Fumarato de Tenofovir

Disoproxil **Marca:** Stribild

Outros nomes: EVG/COBI/FTC/TDF, EVG/c/TDF/FTC

Classe de drogas: Medicamentos combinados

Inibidor de Transferência de Fita Integrase (elvitegravir)

Inibidor da Transcriptase Reversa Nucleosídeo (emtricitabina, tenofovir DF)

Intensificador Farmacocinético (cobicistate)

Imagens de medicamentos: (Clique para ampliar)



Quais são as coisas mais importantes a saber sobre Stribild?

Stribild pode causar efeitos colaterais graves e com risco de vida. Estes incluem um acúmulo de ácido láctico No Sangue (acidose láctica), figado problemas renais novos ou agravados, incluindo insuficiência renal, e interações medicamentosas.

Contacte o seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas que possam ser sinais de acidose láctica:

Fraqueza ou cansaço

Dores musculares incomuns

Falta de ar ou respiração rápida

Dor de estômago com náuseas e vômitos

Mãos e pés frios ou azuis

Tonturas ou tonturas

Batimento cardíaco rápido ou anormal

Entre em contato com seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas que possam ser sinais de problemas no fígado:

Amarelecimento da pele ou do branco dos olhos ([icterícia](#))

Urina de cor escura

Movimentos intestinais de cor clara

Perda de apetite por vários dias ou mais

Náusea ou vômito

Dor, dor ou sensibilidade no lado direito do estômago/área abdominal

Coceira

Se você tem HIV e [infecção pelo vírus da hepatite B \(HBV\)](#) e tome Stribild, seu HBV [infecção](#) pode piorar (surto) se parar de tomar Stribild. Não pare de tomar Stribild sem primeiro falar com seu médico.

Contacte o seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas que possam ser sinais de um problema renal agravado (chamado [Síndrome de Fanconi](#)), que pode estar relacionado a medicamentos contendo tenofovir:

Dor óssea que não desaparece ou piora

Dor nos braços, mãos, pernas ou pés

Ossos quebrados

Dor ou fraqueza muscular

Tomar Stribild com certos medicamentos pode causar efeitos secundários graves e potencialmente fatais.

Informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você toma, incluindo medicamentos prescritos e de venda livre, vitaminas e suplementos de ervas.

Enquanto estiver a tomar Stribild, é importante manter todas as suas consultas com o seu médico.

O que é Stribild?

Stribild é um medicamento de prescrição aprovado pelos EUA [Administração de Alimentos e Medicamentos \(FDA\)](#) para o tratamento da infecção por HIV em adultos e crianças com 12 anos de idade ou mais que pesem pelo menos 35 kg (77 libras) e atendam a certos requisitos, conforme determinado por um profissional de saúde.

Stribild é um HIV completo regime de tratamento e deveria não ser usado com outros medicamentos para o HIV

Stribild contém quatro medicamentos diferentes: elvitegravir, cobicistate, emtricitabina, e fumarato de tenofovir desoproxila.

Para obter mais informações sobre o uso de Stribild em pessoas com HIV, consulte o *Diretrizes para o Uso de Antirretrovirais em Adultos e Adolescentes Vivendo com HIV e Diretrizes para o uso de agentes antirretrovirais na infecção pediátrica pelo HIV.*

Os medicamentos para o HIV não podem curar o HIV/AIDS, mas tomar medicamentos para o HIV todos os dias ajuda as pessoas com HIV a viverem vidas mais longas e saudáveis. Medicamentos para o HIV também reduzem o risco de infecção pelo HIV transmissão. Se você estiver tomando medicamentos para o HIV, não reduza, pule ou pare de tomá-los, a menos que seu médico lhe diga para fazê-lo.

O que devo dizer ao meu médico antes de tomar Stribild?

Antes de tomar Stribild, informe o seu médico:

Se tem alergia a qualquer um dos medicamentos para o VIH contidos no Stribild (elvitegravir, cobicistate, emtricitabina, ou fumarato de tenofovir desoproxila) ou quaisquer outros medicamentos.

Se você tem problemas de fígado, incluindo infecção pelo vírus da hepatite B (HBV).

Se você tem problemas renais.

Se você tem problemas ósseos.

Se você tiver outras condições médicas.

Se você está grávida ou planeja engravidar. Stribild não deve ser usado durante a gravidez porque pode não haver quantidade suficiente do medicamento no organismo durante a gravidez. Converse com seu médico sobre os possíveis riscos de tomar Stribild durante a gravidez. Para obter mais informações sobre o uso de Stribild durante a gravidez, consulte o *Recomendações para o uso de medicamentos antirretrovirais em gestantes com infecção pelo HIV e intervenções para reduzir a transmissão perinatal do HIV nos Estados Unidos.*

Se você está amamentando ou planeja amamentar. Para mulheres com HIV nos Estados Unidos, o Diretriz não recomenda a amamentação. Antes de seu bebê nascer, ou se você já estiver amamentando, converse com seu médico para discutir opções alternativas para alimentar seu bebê.

Se você estiver usando hormônio anticoncepcional (como pílulas, implantes ou anéis vaginais). Seu médico pode recomendar que você use formas adicionais ou alternativas de controle de natalidade enquanto estiver tomando Stribild. Para obter mais informações sobre o uso de anticoncepcionais e medicamentos para o HIV ao mesmo tempo, consulte o HIVinfo Infográfico de HIV e controle de natalidade.

Sobre outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos fitoterápicos (incluindo erva de São João) que você está tomando ou planeja tomar. Stribild pode afetar a forma como outros medicamentos ou produtos funcionam, e outros medicamentos ou produtos podem afetar a forma como

Stribild funciona. **Tomar Stribild em conjunto com certos medicamentos ou produtos pode causar efeitos secundários graves e potencialmente fatais.**

Como devo tomar Stribild?

Stribild vem em forma de comprimido. Cada tablete contém:

150 mg de elvitegravir

150 mg [cobicistate](#)

200 mg [emtricitabina](#)

300 mg [fumarato de tenofovir desoproxila](#)

Tome Stribild de acordo com as instruções do seu médico.

Tome Stribild por via oral e com alimentos. Não tome Stribild com outros medicamentos para o HIV.

Se necessitar de tomar um medicamento para a indigestão (antiácido) que contenha hidróxido de alumínio e magnésio ou carbonato de cálcio durante o tratamento com Stribild, tome-o pelo menos 2 horas antes ou depois de tomar Stribild.

Se você tomou muito Stribild, entre em contato com seu médico ou centro de controle de envenenamento local (1-800-222-1222) imediatamente, ou dirija-se ao pronto-socorro do hospital mais próximo.

Para obter mais informações sobre como tomar Stribild, consulte o [orótulo do medicamento FDA](#).

O que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se você perder [um dose](#) de Stribild, tome a dose esquecida assim que se lembrar. Mas se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima dose no horário regular. Não tome duas doses ao mesmo tempo para compensar uma dose esquecida.

Que efeitos colaterais o Stribild pode causar?

Stribild pode causar efeitos colaterais. Alguns efeitos colaterais podem ser graves, conforme observado acima. Muitos efeitos colaterais dos medicamentos para o HIV, como náusea ou tontura ocasional, são administráveis. Veja a ficha informativa do HIVinfo em [Medicamentos para HIV e efeitos colaterais](#) Para maiores informações.

Outros possíveis efeitos colaterais do Stribild incluem:

Problemas ósseos, incluindo dor óssea, endurecimento ou afinamento ([osteopenia](#)), o que pode levar a fraturas.

Mudanças em seu [sistema imunológico](#) (chamado [síndrome inflamatória de reconstituição imune](#) ou ÍRIS). A íris é uma condição que às vezes ocorre quando o sistema imunológico começa a se recuperar após

tratamento com um medicamento anti-HIV. À medida que o sistema imunológico fica mais forte, pode ter uma resposta aumentada a uma infecção anteriormente oculta.

Informe o seu médico se tiver algum efeito colateral que o incomode ou que não desapareça.

Estes não são todos os efeitos colaterais possíveis do Stribild. Para saber mais sobre os possíveis efeitos colaterais do Stribild, [leia o rótulo de medicamento](#) ou bula ou fale com o seu médico ou farmacêutico.

Você pode relatar efeitos colaterais ao FDA em 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) ou [conectados](#).

Como o Stribild deve ser armazenado?

Armazene Stribild em temperatura ambiente, 68°F a 77°F (20°C a 25°C).

Mantenha Stribild no recipiente em que veio e mantenha o recipiente bem fechado. Se o recipiente tiver um pequeno pacote de agente de secagem (chamado de dessecante), não o remova. O dessecante protege o medicamento da umidade.

Não use Stribild se o lacre original sobre a abertura do recipiente estiver quebrado ou faltando.

Jogue fora Stribild que não é mais necessário ou expirou (desatualizado). Seguir [Diretrizes da FDA sobre como descartar](#) com segurança medicamentos não utilizados.

Mantenha Stribild e todos os medicamentos fora do alcance das crianças.

Onde posso encontrar mais informações sobre Stribild?

Para obter mais informações sobre o uso de Stribild em pessoas com HIV, consulte o [Diretrizes para o Uso de Antirretrovirais em Adultos e Adolescentes Vivendo com HIV](#) a [Diretrizes para o uso de agentes antirretrovirais na infecção pediátrica pelo HIV](#).

Este resumo do medicamento da versão do paciente é baseado no(s) seguinte(s) rótulo(s) da FDA: [Tábuas](#). A seção de Informações de Aconselhamento do Paciente do rótulo inclui informações para pessoas que tomam Stribild.

Estudos de pesquisa relacionados ao Stribild, de [ClinicalTrials.gov](#).

Uma lista de [Medicamentos para o HIV aprovados pela FDA](#), do HIVinfo.

Informações do fabricante

Gilead Sciences, Inc.

Número principal: 800-445-3235

Assistência ao paciente: 800-226-2056

Última avaliação: 8 de outubro de 2021

Imprimir

[Versão do pacienteHTML](#)

[Etiqueta FDA: TabletPDF](#)