

# TITLE - COBICISTAT + ELVITEGRAVIR + EMTRICITABINE+ TENOFOVIR / GENVOYA MEDICATION PATIENT INFORMATION IN SPANISH

Disclaimer : Document presented by [www.911GlobalMeds.com](http://www.911GlobalMeds.com)



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Institutes of Health

Obtenga la información de salud pública más reciente de los CDC

## información de drogas

**Pronunciar:**Elvitegravir / Cobicistat / Emtricitabina / Fumarato de disoproxilo de tenofovir **Nombre de la marca:**Stribild

**Otros nombres:** EVG/COBI/FTC/TDF, EVG/c/TDF/FTC

**Clase de drogas:**Medicamentos combinados

Inhibidor de transferencia de cadena de integrasa (elvitegravir)

Inhibidor de la transcriptasa inversa nucleósido (emtricitabina, tenofovir DF)

Potenciador farmacocinético (cobicistat)

**Imagen (s) de drogas:** (Haga clic para ampliar)



## ¿Cuáles son las cosas más importantes que debe saber sobre Stribild?

Stribild puede causar efectos secundarios graves y potencialmente mortales. Estos incluyen una acumulación de ácido láctico en la sangre (acidosis láctica), hígado renales, problemas renales nuevos o que empeoran, incluida la insuficiencia renal, y interacciones con la drogas.

Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas que podrían ser signos de acidosis láctica:

Debilidad o cansancio

Dolor muscular inusual

Dificultad para respirar o respiración rápida

Dolor de estómago con náuseas y vómitos

Manos y pies fríos o azules

Mareos o aturdimiento

Latidos cardíacos rápidos o anormales

**Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas que podrían ser signos de problemas hepáticos:**

Coloración amarillenta de la piel o del blanco de los ojos ([ictericia](#))

orina de color oscuro

Heces de color claro

Pérdida del apetito durante varios días o más

Náuseas o vómitos

Dolor, dolor o sensibilidad en el lado derecho de su estómago/área abdominal

Picor

**Si tiene tanto el VIH como [infección por el virus de la hepatitis B \(HBV\)](#) y toma Stribild, tu HBV [infección](#) puede empeorar (brotar) si deja de tomar Stribild. No deje de tomar Stribild sin antes hablar con su proveedor de atención médica.**

**Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas que podrían ser signos de un empeoramiento de un problema renal (llamado [Síndrome de Fanconi](#)), que puede estar relacionado con medicamentos que contienen tenofovir:**

Dolor de huesos que no desaparece o empeora

Dolor en sus brazos, manos, piernas o pies

Huesos rotos

Dolor o debilidad muscular

**Tomar Stribild con ciertos medicamentos puede causar efectos secundarios graves y potencialmente mortales.** Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Mientras toma Stribild, es importante asistir a todas sus citas con su proveedor de atención médica.

## ¿Qué es Stribild?

Stribild es un medicamento recetado aprobado por los EE. UU. [Administración de Alimentos y Medicamentos \(FDA\)](#) para el tratamiento de la infección por VIH en adultos y niños mayores de 12 años que pesan al menos 35 kg (77 lb) y cumplen con ciertos requisitos, según lo determine un proveedor de atención médica.

Stribild es un VIH completo régimen de tratamiento y debería no usarse con otros medicamentos contra el VIH

Stribild contiene cuatro medicamentos diferentes: elvitegravir, cobicistato, emtricitabina, y fumarato de disoproxilo de tenofovir.

Para obtener más información sobre el uso de Stribild en personas con VIH, consulte el Directrices para el uso de agentes antirretrovirales en adultos y adolescentes que viven con el VIH y el Directrices para el uso de agentes antirretrovirales en la infección pediátrica por VIH.

Los medicamentos contra el VIH no pueden curar el VIH/SIDA, pero tomar medicamentos contra el VIH todos los días ayuda a las personas con VIH a vivir una vida más larga y saludable. Los medicamentos contra el VIH también reducen el riesgo de contraer el VIH transmisión. Si está tomando medicamentos contra el VIH, no los reduzca, omita ni deje de tomarlos a menos que su proveedor de atención médica se lo indique.

## ¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar Stribild?

Antes de tomar Stribild, informe a su proveedor de atención médica:

Si es alérgico a alguno de los medicamentos contra el VIH de Stribild (elvitegravir, cobicistato, emtricitabina, o fumarato de disoproxilo de tenofovir) o cualquier otro medicamento.

Si tiene problemas de hígado, incluida la infección por el virus de la hepatitis B (VHB).

Si tiene problemas de riñón.

Si tiene problemas en los huesos.

Si tiene otras condiciones médicas.

Si está embarazada o planea quedar embarazada. Stribild no debe usarse durante el embarazo porque es posible que no haya suficiente medicamento en el cuerpo durante el embarazo. Hable con su proveedor de atención médica sobre los posibles riesgos de tomar Stribild durante el embarazo. Para obtener más información sobre el uso de Stribild durante el embarazo, consulte el Recomendaciones para el uso de medicamentos antirretrovirales en mujeres embarazadas con infección por el VIH e intervenciones para reducir la transmisión perinatal del VIH en los Estados Unidos.

Si está amamantando o planea amamantar. Para las mujeres con VIH en los Estados Unidos, el Guíano recomienda amamantar. Antes de que nazca su bebé, o si ya está amamantando, hable con su proveedor de atención médica para analizar opciones alternativas para alimentar a su bebé.

Si estás usando hormona control de la natalidad (como píldoras, implantes o anillos vaginales). Su proveedor de atención médica puede recomendarle que use métodos anticonceptivos adicionales o alternativos mientras toma Stribild. Para obtener más información sobre el uso de anticonceptivos y medicamentos contra el VIH al mismo tiempo, consulte el sitio web de infoVIH.

Infografía sobre el VIH y el control de la natalidad.

**Acerca de otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas (incluida la hierba de San Juan) que esté tomando o planea tomar.** Stribild puede afectar la forma en que funcionan otros medicamentos o productos, y otros medicamentos o productos pueden afectar la forma en que

Stribild funciona. **Tomar Stribild junto con ciertos medicamentos o productos puede causar efectos secundarios graves y potencialmente mortales.**

## ¿Cómo debo tomar Stribild?

Stribild viene en forma de tableta. Cada tableta contiene:

150 mg de elvitegravir

150 miligramos [cobicistato](#)

200 miligramos [emtricitabina](#)

300 miligramos [fumarato de disoproxilo de tenofovir](#)

Tome Stribild de acuerdo con las instrucciones de su proveedor de atención médica.

Tome Stribild por vía oral y con alimentos. No tome Stribild con otros medicamentos contra el VIH.

Si necesita tomar un medicamento para la indigestión (antiácido) que contenga hidróxido de aluminio y magnesio o carbonato de calcio durante el tratamiento con Stribild, tómelo al menos 2 horas antes o después de tomar Stribild.

Si ha tomado demasiado Stribild, comuníquese con su proveedor de atención médica o con el centro local de control de envenenamiento (1-800-222-1222) de inmediato, o diríjase a la sala de emergencias del hospital más cercano.

Para obtener más información sobre cómo tomar Stribild, consulte la [Etiqueta de medicamento de la FDA](#).

## ¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Si te pierdes [una dosis](#) de Stribild, tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Pero si es casi la hora de su próxima dosis, omita la dosis olvidada y simplemente tome la siguiente dosis a la hora habitual. No tome dos dosis al mismo tiempo para compensar la dosis olvidada.

## ¿Qué efectos secundarios puede causar Stribild?

Stribild puede causar efectos secundarios. Algunos efectos secundarios pueden ser graves, como se indicó anteriormente. Muchos efectos secundarios de los medicamentos contra el VIH, como náuseas o mareos ocasionales, son controlables. Consulte la hoja informativa de infoVIH en [Medicamentos para el VIH y efectos secundarios para más información](#).

Otros posibles efectos secundarios de Stribild incluyen:

Problemas óseos, que incluyen dolor, ablandamiento o adelgazamiento de los huesos ([osteopenia](#)), lo que puede provocar fracturas.

Cambios en tu [sistema inmune](#) (llamados [síndrome inflamatorio de reconstitución inmune](#) IRIS). IRIS es una condición que a veces ocurre cuando el sistema inmunológico comienza a recuperarse después

tratamiento con un medicamento para el VIH. A medida que el sistema inmunitario se fortalece, puede tener una mayor respuesta a una infección previamente oculta.

Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Stribild. Para obtener más información sobre los posibles efectos secundarios de Stribild, lea el [etiqueta de la droga](#) [Insertar paquete](#) o hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico.

Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) o en [línea](#).

## ¿Cómo se debe almacenar Stribild?

Guarde Stribild a temperatura ambiente, de 68 °F a 77 °F (de 20 °C a 25 °C).

Mantenga Stribild en el envase en el que vino y mantenga el envase bien cerrado. Si el recipiente tiene un paquete pequeño de agente secante (llamado desecante), no lo quite. El desecante protege el medicamento de la humedad.

No use Stribild si el sello original sobre la abertura del envase está roto o falta.

Deseche el Stribild que ya no necesite o esté caducado (obsoleto). Seguir [Directrices de la FDA sobre cómo desechar](#) de forma segura los medicamentos no utilizados.

**Mantenga Stribild y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.**

## ¿Dónde puedo encontrar más información sobre Stribild?

Para obtener más información sobre el uso de Stribild en personas con VIH, consulte el [Directrices para el uso de agentes antirretrovirales en adultos y adolescentes que viven con el VIH](#) y el [Directrices para el uso de agentes antirretrovirales en la infección pediátrica por VIH](#).

Este resumen del medicamento, Versión para el paciente, se basa en las siguientes etiquetas de la FDA: [Tableta](#). La sección Información de asesoramiento para el paciente de la etiqueta incluye información para las personas que toman Stribild.

Estudios de investigación relacionados con Stribild, [de ClinicalTrials.gov](#).

Una lista de [Medicamentos para el VIH aprobados por la FDA](#), de infoVIH.

## Información del fabricante

Ciencias de Gilead, Inc.

Número principal: 800-445-3235

Asistencia al paciente: 800-226-2056

Última revisión: 8 de octubre de 2021

**Imprimir**

[Versión del pacienteHTML](#)

[Etiqueta FDA: TabletaPDF](#)