

TITLE - COBICISTAT + ELVITEGRAVIR + EMTRICITABINE+ TENOFOVIR / GENVOYA MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Institutes of Health

รับข้อมูลด้านสาธารณสุขล่าสุดจาก CDC

ข้อมูลยา

ออกเสียง: Elvitegravir / Cobicistat / Emtricitabine / เทโนโฟเวียร์ Disoproxil Fumarate

ชื่อแบรนด์: Stribid

ชื่ออื่น: EVG / COBI / FTC / TDF, EVG / c / TDF / FTC

ระดับยา: ยาผสม

Integrase Strand Transfer Inhibitor (เอลวิทเทกราเวียร์)

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (emtricitabine, tenofovir DF) สารเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางเภสัชจลนศาสตร์ (cobicistat)

ภาพยา: (คลิกเพื่อดูภาพขยาย)



อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Stribid?

Stribid สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งรวมถึงการสะสมของกรดแลคติก ในเลือด (กรดแลคติก), ตับปัญหา, ปัญหาไตใหม่หรือเลวลง, รวมทั้งไตวาย, และปฏิกิริยาระหว่างยา.

ติดต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณทันที หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้อาจเป็นสัญญาณของกรดแลคติก:

ความอ่อนแอหรือความเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดกล้ามเนื้อผิดปกติ

หายใจถี่หรือหายใจเร็ว

ปวดท้องมีอาการคลื่นไส้อาเจียน

มือและเท้าเย็นหรือน้ำเงิน

อาการเวียนศีรษะหรือหน้ามืด

หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ

ติดต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณทันที หากมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้อาจเป็นสัญญาณของปัญหา:

ผิวเหลืองหรือตาขาว (โรคดีซ่าน)

ปัสสาวะสีเข้ม

การเคลื่อนไหวของลำไส้อ่อน

เบื่ออาหารเป็นเวลาหลายวันหรือนานกว่านั้น

คลื่นไส้หรืออาเจียน

ปวด ปวด หรือกดเจ็บที่ด้านขวาของท้อง/ช่องท้อง

อาการคัน

หากคุณมีทั้งเอชไอวีและการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) และรับ Stribild, HBV . ของคุณ การติดเชื้ออาจแย่ลง (ลูกเป็นไฟ) หากหยุดทาน Stribild อย่าหยุดทาน Stribild โดยไม่ได้พูดคุยกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณก่อน

ติดต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณทันที หากมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้อาจเป็นสัญญาณของปัญหาไตที่แย่ลง (เรียกว่าแฟนโคนิซินโดรม) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับยาที่มี tenofovir:

ปวดกระดูกไม่หายหรือแย่ลง

ปวดแขน มือ ขา หรือเท้า

กระดูกหัก

ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง

การใช้ Stribild ร่วมกับยาบางชนิดอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้แจ้งผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้ รวมทั้งยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และที่ซื้อเองจากร้านขายยา วิตามิน และอาหารเสริมสมุนไพร

ในขณะที่ใช้ Stribild สิ่งสำคัญคือต้องนัดหมายทั้งหมดของคุณกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

Stribild คืออะไร?

Stribild เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติจาก US [สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา \(FDA\)](https://clinicalinfo.hiv.gov/en/drugs/elvitegravir-cobicistat-emtricitabine-tenofovir-disoproxil-fumarate/patient) สำหรับการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีน้ำหนักอย่างน้อย 77 ปอนด์ (35 กก.) และตรงตามข้อกำหนดบางประการตามที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพกำหนด

Stribid เป็นเชื้อ HIV ที่สมบูรณ์ที่สุดการรักษาและควรไม่ใช้ร่วมกับยาเอชไอวีอื่น ๆ

Stribid มียาชนิด: เอลวิเทกราเวียร์, cobicistat, เอมทริซิทาไบน์, และ เทโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Stribid ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โปรดดูที่ แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสในผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีและแนวทางการใช้ยาต้านไวรัสในเด็กติดเชื้อเอชไอวี.

ยาเอชไอวีไม่สามารถรักษาเอชไอวี/เอดส์ได้ แต่การทานยาเอชไอวีทุกวันจะช่วยให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้น ยาเอชไอวียังช่วยลดความเสี่ยงของเอชไอวีการแพร่เชื้อ. หากคุณกำลังใช้ยาเอชไอวี อย่าลด ข้าม หรือหยุดใช้ยาเว้นแต่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพจะบอกคุณ

ฉันควรบอกผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของฉันก่อนรับประทาน Stribid อย่างไร

ก่อนรับประทาน Stribid บอกผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ:

หากคุณแพ้ยา HIV ใดๆ ใน Stribid (elvitegravir, cobicistat, เอมทริซิทาไบน์, หรือ เทโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต) หรือยาอื่นๆ

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับ รวมถึงการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV)

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไต

หากคุณมีปัญหาเรื่องกระดูก

หากคุณมีโรคประจำตัวอื่นๆ

หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ ไม่ควรใช้ Stribid ในระหว่างตั้งครรภ์ เพราะอาจมียาในร่างกายไม่เพียงพอในระหว่างตั้งครรภ์ พูดคุยกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Stribid ระหว่างตั้งครรภ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Stribid ในระหว่างตั้งครรภ์ โปรดดูที่ คำแนะนำสำหรับการใช้ยาต้านไวรัสในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีและการแทรกแซงเพื่อลดการแพร่เชื้อเอชไอวีในปริกำเนิดในสหรัฐอเมริกา.

หากคุณกำลังให้นมลูกหรือวางแผนที่จะให้นมลูก สำหรับผู้หญิงที่ติดเชื้อ HIV ในสหรัฐอเมริกา แนวปฏิบัติไม่แนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนม ก่อนที่ลูกน้อยของคุณจะเกิด หรือถ้าคุณกำลังให้นมลูกอยู่แล้ว ให้พูดคุยกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับทางเลือกอื่นในการให้นมลูกของคุณ

หากคุณกำลังใช้ ฮอร์โมนการคุมกำเนิดแบบอิงตาม (เช่น ยาเม็ด การปลูกถ่าย หรือวงแหวนในช่องคลอด) ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณอาจแนะนำให้ใช้รูปแบบการคุมกำเนิดเพิ่มเติมหรือทางเลือกอื่นในขณะที่ใช้ Stribid สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การคุมกำเนิดและยาเอชไอวีในเวลาเดียวกัน โปรดดูที่ HIVinfo เอชไอวีและการคุมกำเนิด Infographic.

เกี่ยวกับยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รวมถึงสาโทเซนต์จอร์ห์น) ที่คุณกำลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้ Stribid อาจส่งผลต่อวิธีการทำงานของยาหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และยาหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาจส่งผลต่อวิธีการ

Stribild ทำงานการใช้ Stribild ร่วมกับยาหรือผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้

ฉันจะใช้ Stribild ได้อย่างไร?

Stribid มาในรูปแบบแท็บเล็ต แต่ละเม็ดประกอบด้วย:

เอลวิเตกราเวียร์ 150 มก

150 มก. [cobicistat](#)

200 มก. [เอมทริซิทาไบน์](#)

300 มก. [เทโนโฟเวียร์ โดโซพรอกซิล ฟูมาเรต](#)

ใช้ Stribild ตามคำแนะนำของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ

รับประทาน Stribild ทางปากและอาหาร อย่าใช้ Stribild ร่วมกับยาเอชไอวีอื่น ๆ

หากคุณต้องการทานยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ (ยาลดกรด) ที่มีอะลูมิเนียมและแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์หรือแคลเซียมคาร์บอเนตระหว่างการรักษาด้วย Stribild ให้ทานยา Stribild อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรือหลังใช้ยา

หากคุณรับประทาน Stribild มากเกินไป โปรดติดต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพหรือศูนย์ควบคุมพิษในพื้นที่ (1-800-222-1222) ทันที หรือไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Stribild โปรดดูที่ [ฉลากยา](#) อย. _____

ฉันควรทำอย่างไรหากลืมทานยา?

หากคุณพลาด [ปริมาณ](#) ของ Stribild ให้กินยาที่ลืมไปทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้ถึงเวลาที่ต้องทานมือต่อไป ให้ข้ามมือที่ลืมไปและทานมือต่อไปตามเวลาปกติ อย่ารับประทานสองครั้งพร้อมกันเพื่อชดเชยการไม่ได้รับยา

Stribild ทำให้เกิดผลข้างเคียงอะไรได้บ้าง?

Stribild อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียง ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรงตามที่ระบุไว้ข้างต้น ผลข้างเคียงหลายอย่างจากยาเอชไอวี เช่น อาการคลื่นไส้หรือเวียนศีรษะเป็นครั้งคราว สามารถจัดการได้ ดูเอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ HIVinfo บน [ยาเอชไอวีและผลข้างเคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม](#).

ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้อื่น ๆ ของ Stribild ได้แก่ :

ปัญหากระดูก ได้แก่ ปวดกระดูก ซีด หรือพอมบาง ([ภาวะกระดูกพรุน](#)) [ซึ่งอาจนำไปสู่การแตกหัก](#)

การเปลี่ยนแปลงใน [.ของคุณระบบภูมิคุ้มกัน\(เรียกว่าการอักเสบของการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่หรือไอริส\) IRIS](#) เป็นภาวะที่บางครั้งเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันเริ่มฟื้นตัว aer

การรักษาด้วยยาเอชไอวี เมื่อระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น ก็อาจมีการตอบสนองเพิ่มขึ้นต่อการติดเชื้อที่ซ่อนอยู่ก่อนหน้านี้

บอกผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีผลข้างเคียงที่รบกวนจิตใจคุณหรือไม่หายไป

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ Stribild หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของ Stribild โปรดอ่าน [ฉลากยาหรือแพ็คเกจใส่หรือพูดคุยกับ](#)ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพหรือเภสัชกรของคุณ

คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) หรือออนไลน์ [ที่นี่](#).

Stribild ควรเก็บไว้อย่างไร?

เก็บ Stribild ไว้ที่อุณหภูมิห้อง 68 ° F ถึง 77 ° F (20 ° C ถึง 25 ° C)

เก็บ Stribild ไว้ในภาชนะที่เข้ามาและปิดภาชนะให้แน่น หากภาชนะมีสารทำให้แห้งเป็นห่อเล็กๆ (เรียกว่าสารดูดความชื้น) ห้ามนำออก สารดูดความชื้นช่วยปกป้องยาจากความชื้น

อย่าใช้ Stribild หากซิลเด็มเหนือช่องเปิดของภาชนะชำรุดหรือขาดหายไป

ทั้ง Stribild ที่ไม่ต้องการหรือหมดอายุแล้ว (ถ้าสมัย) ทั้งไป ติดตาม [แนวทางของอย.เกี่ยวกับวิธีการทิ้งยาที่ไม่ได้ใช้](#) อย่างปลอดภัย

เก็บ Stribild และยาทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stribild ได้ที่ไหน?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Stribild ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โปรดดูที่ [แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสในผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีและแนวทางการใช้ยาต้านไวรัสในเด็กติดเชื้อเอชไอวี](#).

สรุปยาเวอร์ชันผู้ป่วยนี้อิงตามฉลากของ FDA ต่อไปนี้: [ยาเม็ด](#). ส่วนข้อมูลการให้คำปรึกษาผู้ป่วยบนฉลากมีข้อมูลสำหรับผู้รับประทาน Stribild

การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Stribild จาก [ClinicalTrials.gov](#).

รายการของ [ยาเอชไอวีที่ผ่านการรับรองโดย FDA](#) จาก HIVinfo

ข้อมูลผู้ผลิต

Gilead Sciences, Inc.

หมายเลขหลัก: 800-445-3235 ความ

ช่วยเหลือผู้ป่วย: 800-226-2056

สอบทานล่าสุด: 8 ตุลาคม 2021

พิมพ์

[รุ่นผู้ป่วยHTML](#)

[ฉลากองค์การอาหารและยา: แบบอิเล็กทรอนิกส์ PDF](#)