

TITLE - COBICISTAT + ELVITEGRAVIR + EMTRICITABINE+ TENOFOVIR / GENVOYA MEDICATION PATIENT INFORMATION IN VIETNAMESE

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Institutes of Health

Nhận thông tin sức khỏe cộng đồng mới nhất từ CDC

Thông tin thuốc

Phát âm: Elvitegravir / Cobicistat / Emtricitabine / Tenofovir Disoproxil Fumarate

Thương hiệu: Stribild

Vài cái tên khác: EVG / COBI / FTC / TDF, EVG / c / TDF / FTC

Nhóm thuốc: Thuốc kết hợp

Chất ức chế chuyển chuỗi tích hợp (elvitegravir)

Chất ức chế men sao chép ngược Nucleoside (emtricitabine, tenofovir DF) Chất

tăng cường được động học (cobicistat)

(Các) Hình ảnh Thuốc: (Bấm để phóng to)



Những điều quan trọng nhất cần biết về Stribild là gì?

Stribild có thể gây ra các vết thương nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Chúng bao gồm sự tích tụ của axit lactic trong máu (nhễm axit lactic), Gan các vấn đề, các vấn đề về thận mới hoặc ngày càng trầm trọng hơn, bao gồm cả suy thận, và tương tác thuốc.

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây có thể là dấu hiệu của nhiễm axit lactic:

Suy nhược hoặc mệt mỏi

Đau cơ bất thường

Khó thở hoặc thở nhanh

Đau dạ dày kèm theo buồn nôn và nôn

Tay chân lạnh hoặc xanh

Chóng mặt hoặc choáng váng

Nhịp tim nhanh hoặc bất thường

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây có thể là dấu hiệu của các vấn đề về gan:

Vàng da hoặc lòng trắng mắt của bạn ([vàng da](#))

Nước tiểu sẫm màu

Đi tiêu nhạt màu

Chán ăn trong vài ngày hoặc lâu hơn

Buồn nôn hoặc nôn mửa

Đau, nhức hoặc căng ở bên phải của dạ dày / vùng bụng của bạn

Ngứa

Nếu bạn có cả HIV và [nhiễm vi rút viêm gan B \(HBV\)](#) và lấy Stribild, HBV của bạn [sự nhiễm trùng](#) có thể trở nên tồi tệ hơn ([bùng phát](#)) nếu bạn ngừng dùng Stribild. **Đừng ngừng dùng Stribild mà không nói chuyện trước với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.**

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây có thể là dấu hiệu của một vấn đề về thận đang trở nên tồi tệ hơn (được gọi là [Hội chứng Fanconi](#)), có thể liên quan đến các loại thuốc chứa tenofovir:

Đau xương không biến mất hoặc trở nên tồi tệ hơn

Đau ở cánh tay, bàn tay, chân hoặc bàn chân của bạn

Xương bị gãy

Đau hoặc yếu cơ

Dùng Stribild với một số loại thuốc có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Nói với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về tất cả các loại thuốc bạn dùng, bao gồm thuốc theo toa và thuốc mua không cần toa, vitamin và các chất bổ sung thảo dược.

Trong khi dùng Stribild, điều quan trọng là phải giữ tất cả các cuộc hẹn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Stribild là gì?

Stribild là một loại thuốc kê đơn được Hoa Kỳ chấp thuận [Cục Quản lý Thực phẩm và Dược \(FDA\)](#) để điều trị nhiễm HIV ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên nặng ít nhất 77 lbs (35 kg) và đáp ứng các yêu cầu nhất định, theo quyết định của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Stribild là một HIV hoàn chỉnh phác đồ điều trị và nên không phải được sử dụng với các loại thuốc điều trị HIV khác

Stribild chứa bốn loại thuốc khác nhau: elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, và tenofovir disoproxil fumarate.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng Stribild ở những người nhiễm HIV, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng thuốc kháng vi rút ở người lớn và thanh thiếu niên sống chung với HIV và Hướng dẫn sử dụng thuốc kháng retrovirus trong lây nhiễm HIV ở trẻ em.

Thuốc điều trị HIV không thể chữa khỏi HIV / AIDS, nhưng uống thuốc điều trị HIV mỗi ngày sẽ giúp người nhiễm HIV sống lâu hơn, sống khỏe hơn. Thuốc điều trị HIV cũng làm giảm nguy cơ nhiễm HIV truyền tải. Nếu bạn đang dùng thuốc điều trị HIV, đừng cắt giảm, bỏ qua hoặc ngừng dùng thuốc trừ khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn yêu cầu.

Tôi nên nói gì với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình trước khi dùng Stribild?

Trước khi dùng Stribild, hãy nói với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn:

Nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ loại thuốc HIV nào trong Stribild (elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, hoặc tenofovir disoproxil fumarate) hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác.

Nếu bạn có vấn đề về gan, bao gồm cả nhiễm vi rút viêm gan B (HBV).

Nếu bạn có vấn đề về thận.

Nếu bạn có vấn đề về xương.

Nếu bạn có bất kỳ điều kiện y tế nào khác.

Nếu bạn đang mang thai hoặc dự định có thai. Stribild không nên được sử dụng trong khi mang thai vì có thể không có đủ thuốc trong cơ thể khi mang thai. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về những rủi ro có thể có khi dùng Stribild trong thai kỳ. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng Stribild trong thời kỳ mang thai, vui lòng tham khảo Khuyến nghị về việc sử dụng thuốc kháng vi rút ở phụ nữ mang thai bị nhiễm HIV và các biện pháp can thiệp để giảm lây truyền HIV chu sinh ở Hoa Kỳ.

Nếu bạn đang cho con bú hoặc dự định cho con bú. Đối với phụ nữ nhiễm HIV ở Hoa Kỳ, Hướng dẫn không khuyến khích cho con bú. Trước khi em bé của bạn được sinh ra, hoặc nếu bạn đang cho con bú, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để thảo luận về các lựa chọn thay thế để cho con bạn bú.

Nếu bạn đang sử dụng học môn- Kiểm soát sinh sản dựa trên cơ sở (chẳng hạn như thuốc viên, que cấy hoặc vòng âm đạo). Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể khuyến nghị bạn sử dụng các hình thức kiểm soát sinh sản bổ sung hoặc thay thế trong khi dùng Stribild. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng đồng thời biện pháp tránh thai và thuốc điều trị HIV, hãy xem HIVinfo Đồ họa thông tin về HIV và Kiểm soát Sinh sản.

Giới thiệu về các loại thuốc kê đơn và không kê đơn khác, vitamin, chất bổ sung dinh dưỡng và các sản phẩm thảo dược (bao gồm cả St. John's wort) mà bạn đang dùng hoặc dự định dùng. Stribild có thể chỉ ra cách thức hoạt động của các loại thuốc hoặc sản phẩm khác và các loại thuốc hoặc sản phẩm khác có thể chỉ ra cách

Stribild hoạt động. **Dùng Stribild cùng với một số loại thuốc hoặc sản phẩm nhất định có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.**

Tôi nên sử dụng Stribild như thế nào?

Stribild có dạng viên nén. Mỗi bảng tương niệm chứa đựng:

150 mg elvitegravir

150 mg [cobicistat](#)

200 mg [emtricitabine](#)

300 mg [tenofovir disoproxil fumarate](#)

Hãy Stribild theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Uống Stribild bằng miệng và cùng với thức ăn. Không dùng Stribild với các loại thuốc điều trị HIV khác.

Nếu bạn cần dùng thuốc trị chứng khó tiêu (thuốc kháng axit) có chứa nhôm và magiê hydroxit hoặc canxi cacbonat trong khi điều trị bằng Stribild, hãy uống thuốc ít nhất 2 giờ trước hoặc trước khi bạn dùng Stribild.

Nếu bạn đã uống quá nhiều Stribild, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc trung tâm kiểm soát chất độc địa phương (1- 800-222-1222) ngay lập tức, hoặc đến phòng cấp cứu bệnh viện gần nhất.

Để biết thêm thông tin về cách lấy Stribild, hãy xem [Nhãn thuốc FDA](#).

Tôi nên làm gì nếu tôi quên một liều thuốc?

Nếu bạn bỏ lỡ [một liều lượng](#) của Stribild, hãy dùng liều đã quên ngay khi bạn nhớ ra. Nhưng nếu gần đến lúc dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên và chỉ dùng liều tiếp theo vào thời gian bình thường. Không dùng hai liều cùng một lúc để bù cho liều đã quên.

Stribild có thể gây ra những phản ứng phụ nào?

Stribild có thể gây ra các vết nứt bên. Một số tác động phụ có thể nghiêm trọng như đã nêu ở trên. Nhiều tác dụng phụ từ thuốc điều trị HIV, chẳng hạn như buồn nôn hoặc chóng mặt thường xuyên, có thể kiểm soát được. Xem tờ thông tin về HIV [trên Thuốc điều trị HIV và Tác dụng phụ](#) để biết thêm thông tin.

Các phụ bản khác có thể có của Stribild bao gồm:

Các vấn đề về xương, bao gồm đau xương, chai sạn hoặc gãy ([chứng loãng xương](#)), có thể dẫn đến gãy xương.

Những thay đổi [trong của ban](#) hệ miễn dịch ([triệu tập hội chứng viêm phục hồi miễn dịch](#) hoặc IRIS). IRIS là một tình trạng đôi khi xảy ra khi hệ thống miễn dịch bắt đầu phục hồi

điều trị bằng thuốc điều trị HIV. Khi hệ thống miễn dịch trở nên mạnh hơn, nó có thể có phản ứng gia tăng đối với bệnh nhiễm trùng đã ẩn trước đó.

Hãy cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn biết nếu bạn có bất kỳ biểu hiện phụ nào làm phiền bạn hoặc điều đó không biến mất.

Đây không phải là tất cả các phụ bản có thể có của Stribild. Để tìm hiểu thêm về các phương diện phụ có thể có của Stribild, hãy [đọc nhãn thuốc hoặc gói chèn](#) hoặc [nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ của bạn](#).

Bạn có thể báo cáo các tác động phụ cho FDA theo số 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) hoặc [Trực tuyến](#).

Stribild nên được lưu trữ như thế nào?

Bảo quản Stribild ở nhiệt độ phòng, 68 ° F đến 77 ° F (20 ° C đến 25 ° C).

Giữ Stribild trong hộp chứa mà nó đã đến và đậy chặt hộp. Nếu hộp chứa có một gói nhỏ chất làm khô (được gọi là chất hút ẩm), không được lấy ra. Chất hút ẩm bảo vệ thuốc khỏi độ ẩm.

Không sử dụng Stribild nếu con dấu ban đầu trên nắp hộp bị hỏng hoặc bị mất.

Vứt bỏ Stribild không còn cần thiết hoặc đã hết hạn sử dụng (quá hạn sử dụng). Theo dõi [Hướng dẫn của FDA về cách vứt bỏ thuốc không sử dụng một cách an toàn](#).

Giữ Stribild và tất cả các loại thuốc ngoài tầm với của trẻ em.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về Stribild ở đâu?

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng Stribild ở những người nhiễm HIV, vui lòng tham khảo [Hướng dẫn sử dụng thuốc kháng vi rút ở người lớn và thanh thiếu niên sống chung với HIV](#) và [Hướng dẫn sử dụng thuốc kháng retrovirus trong lây nhiễm HIV ở trẻ em](#).

Bản tóm tắt về thuốc Phiên bản dành cho Bệnh nhân này dựa trên (các) nhãn sau của [FDA: Máy tính bảng](#).

Phần Thông tin Tư vấn Bệnh nhân của nhãn bao gồm thông tin cho những người dùng Stribild.

Các nghiên cứu liên quan đến Stribild, từ [ClinicalTrials.gov](#).

Một danh sách về [Thuốc điều trị HIV được FDA chấp thuận](#), từ HIVinfo.

Thông tin Nhà sản xuất

Gilead Sciences, Inc.

Số chính: 800-445-3235 Hỗ trợ

bệnh nhân: 800-226-2056

Đánh giá lần cuối: ngày 8 tháng 10 năm 2021

In

[Phiên bản dành cho bệnh nhânHTML](#)

[Nhãn FDA: Máy tính bảngPDF](#)