

TITLE - COBICISTAT + ELVITEGRAVIR + EMTRICITABINE+ TENOFOVIR / GENVOYA MEDICATION PATIENT INFORMATION IN CHINESE

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Institutes of Health

从 CDC 获取最新的公共卫生信息

药品信息

发音: Elvitegravir / Cobicistat / Emtricitabine / Tenofovir Disoproxil Fumarate 品

牌: 斯特里比尔德

其他名称: EVG / COBI / FTC / TDF, EVG / c / TDF / FTC

药物类别: 联合用药

整合酶链转移抑制剂 (elvitegravir)

核苷类逆转录酶抑制剂 (恩曲他滨、替诺福韦 DF) 药代动力学增强剂
(cobicistat)

药物图片: (点击放大)



关于 Stribild，最重要的事情是什么？

Stribild 会引起严重的、危及生命的副作用。这些包括积累乳酸在血液中 (乳酸性酸中毒), 肝脏 问题, 新的或恶化的肾脏问题, 包括肾衰竭, 以及药物相互作用。

如果您有以下任何可能是乳酸性酸中毒迹象的症状, 请立即联系您的医疗保健提供者:

虚弱或疲倦

不寻常的肌肉疼痛

呼吸急促或呼吸急促

胃痛伴有恶心和呕吐

手脚冰凉或青紫

头晕或头晕目眩

心跳加快或异常

如果您有以下任何可能是肝脏问题迹象的症状，请立即联系您的医疗保健提供者：

皮肤或眼白发黄（黄疸）

深色尿液

浅色大便

食欲不振数天或更长时间

恶心或呕吐

胃/腹部右侧疼痛、疼痛或压痛

瘙痒

如果您同时感染 HIV 和乙型肝炎病毒感染(HBV) 并服用 Stribild，您的 HBV 感染如果您停止服用 Stribild，可能会变得更糟（突然发作）。在未与您的医疗保健提供者交谈之前，不要停止服用 Stribild。

如果您有以下任何可能是肾脏问题恶化迹象的症状，请立即联系您的医疗保健提供者（称为范可尼综合症），这可能与含替诺福韦的药物有关：

不会消失或恶化的骨痛

手臂、手、腿或脚疼痛

骨折

肌肉疼痛或虚弱

与某些药物一起服用 Stribild 可能会导致严重的、危及生命的副作用。告诉您的医疗保健提供者您服用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。

在服用 Stribild 时，重要的是要与您的医疗保健提供者保持所有约会。

什么是斯特里比尔德？

Stribild 是美国批准的处方药食品和药物管理局(FDA) 用于治疗成人和 12 岁及以上体重至少 77 磅（35 公斤）并符合医疗保健提供者确定的某些要求的儿童的 HIV 感染。

Stribild 是一个完整的 HIV [治疗方案并且应该不是](#)与其他 HIV 药物一起使用

Stribild 包含四种不同的药物：elvitegravir, [考比司他](#), [恩曲他滨](#), 和 [富马酸替诺福韦酯](#)。

有关在 HIV 感染者中使用 Stribild 的更多信息，请参阅 [成人和青少年 HIV 感染者使用抗逆转录病毒药物指南](#)和 [小儿 HIV 感染中使用抗逆转录病毒药物的指南](#)。

HIV 药物无法治愈 HIV/AIDS，但每天服用 HIV 药物可以帮助 HIV 感染者活得更久、更健康。艾滋病药物还可以降低感染艾滋病毒的风险 [传送](#)。如果您正在服用 HIV 药物，[除非](#)您的医疗保健提供者告诉您，否则不要减少、跳过或停止服用它们。

在服用 Stribild 之前，我应该告诉我的医疗保健提供者什么？

在服用 Stribild 之前，请告诉您的医疗保健提供者：

如果您对 Stribild 中的任何 HIV 药物（elvitegravir、[考比司他](#)、[恩曲他滨](#)，或者 [富马酸替诺福韦酯](#)）或任何其他药物。

如果您有肝脏问题，包括乙型肝炎病毒感染 (HBV)。

如果您有肾脏问题。

If you have bone problems.

If you have any other medical conditions.

If you are pregnant or plan to become pregnant. Stribild should not be used during pregnancy because there may not be enough of the drug in the body during pregnancy. Talk to your health care provider about possible risks with taking Stribild during pregnancy. For more information on the use of Stribild during pregnancy, please refer to the [Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs in Pregnant Women with HIV Infection and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States](#).

If you are breastfeeding or plan to breastfeed. For women with HIV in the United States, the [Guideline](#) 不建议母乳喂养。在您的宝宝出生之前，或者如果您已经在母乳喂养，请咨询您的医疗保健提供者，讨论喂养宝宝的替代方案。

如果您正在使用 [激素基于](#) 避孕措施（如药丸、植入物或阴道环）。您的医疗保健提供者可能会建议您在服用 Stribild 时使用其他或替代形式的避孕措施。有关同时使用避孕药和 HIV 药物的更多信息，请查看 [HIVinfo 艾滋病毒和避孕信息图](#)。

关于您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品（包括圣约翰草）。 Stribild 可能会影响其他药物或产品的作用方式，而其他药物或产品可能会影响其他药物或产品的作用方式

斯特里比尔德的作品。将 **Stribild** 与某些药物或产品一起服用可能会导致严重的、危及生命的副作用。

我应该如何服用 Stribild?

Stribild 以平板电脑形式出现。每个平板电脑包含：

150毫克艾维拉韦

150 毫克考比司他

200 毫克恩曲他滨

300 毫克富马酸替诺福韦酯

根据您的医疗保健提供者 *s* 的指示服用 Stribild。

口服和与食物一起服用 Stribild。不要将 Stribild 与其他 HIV 药物一起服用。

如果您在使用 Stribild 治疗期间需要服用含有氢氧化铝和氢氧化镁或碳酸钙的消化不良药物（抗酸剂），请在服用 Stribild 之前至少 2 小时服用或先服用。

如果您服用过多 Stribild，请立即联系您的医疗保健提供者或当地毒物控制中心 (1-800-222-1222)，或前往最近的医院急诊室。

有关如何服用 Stribild 的更多信息，请参阅 [FDA 药品标签](#)。

如果忘记服药怎么办？

如果你错过了一个剂量 Stribild，一旦你记得它就服用错过的剂量。但是，如果您的下一次服药时间快到了，请跳过错过的服药，并在常规时间服用下一次服药。不要同时服用两剂来弥补错过的剂量。

Stribild 会引起哪些副作用？

Stribild 可能会引起副作用。如上所述，某些副作用可能很严重。HIV 药物的许多副作用，例如恶心或偶尔的头晕，是可以控制的。请参阅 HIVinfo 情况说明书 [HIV 药物和副作用](#) 了解更多信息。

Stribild 其他可能的副作用包括：

骨骼问题，包括骨痛、疼痛或变薄（骨质减少），这可能会导致骨折。

你的变化免疫系统（称为免疫重建炎症综合征或虹膜）。IRIS 是一种有时会在免疫系统开始恢复时发生的情况

用 HIV 药物治疗。随着免疫系统变得更强大，它可能对以前隐藏的感染产生更强的反应。

如果您有任何困扰您或不会消失的副作用，请告诉您的医疗保健提供者。

这些并不是 Stribild 的所有可能的副作用。要了解有关 Stribild 可能的副作用的更多信息，请阅读药品标签或者包装说明书或与您的医疗保健提供者或药剂师交谈。

您可以通过 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) 或在线的。

Stribild 应该如何储存？

在室温下储存 Stribild，68°F 至 77°F（20°C 至 25°C）。

将 Stribild 放在它进来的容器中，并保持容器密闭。如果容器中有一小包干燥剂（称为干燥剂），请勿将其取出。干燥剂可保护药物不受潮。

如果容器开口上的原始密封破损或丢失，请勿使用 Stribild。

扔掉不再需要或过期（过期）的 Stribild。跟随 FDA 指南关于如何安全处理未使用的药物。

将 Stribild 和所有药物放在儿童接触不到的地方。

我在哪里可以找到有关 Stribild 的更多信息？

有关在 HIV 感染者中使用 Stribild 的更多信息，请参阅 成人和青少年 HIV 感染者使用抗逆转录病毒药物指南和 小儿 HIV 感染中使用抗逆转录病毒药物的指南。

本患者版药物摘要基于以下 FDA 标签：药片。标签的患者咨询信息部分包括服用 Stribild 的人的信息。

与 Stribild 相关的研究，来自 临床试验.gov。

的列表 FDA 批准的 HIV 药物，来自 HIVinfo。

制造商信息

吉利德科学公司

主要号码：800-445-3235 患者

援助：800-226-2056

上次审核时间：2021 年 10 月 8 日

打印

[患者版HTML](#)

[FDA 标签: 平板电脑PDF格式](#)