

TITLE - COBICISTAT + ELVITEGRAVIR + EMTRICITABINE+ TENOFOVIR / GENVOYA MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FRENCH

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Institutes of Health

Obtenez les dernières informations de santé publique du CDC

Informations sur les médicaments

Prononcer: Elvitégravir / Cobicistat / Emtricitabine / Fumarate de ténofovir disoproxil

Marque: Stribilde

Autres noms: EVG / COBI / FTC / TDF, EVG / c / TDF / FTC

Classe de drogue : Médicaments combinés

Inhibiteur de transfert de brin Integrase (elvitégravir)

Inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (emtricitabine, ténofovir DF)

Renforcement pharmacocinétique (cobicistat)

Image(s) du médicament : (Cliquez pour agrandir)



Quelles sont les choses les plus importantes à savoir sur Stribild ?

Stribild peut provoquer des effets secondaires graves, potentiellement mortels. Ceux-ci comprennent une accumulation de acide lactique Dans le sang (acidose lactique), le foie problèmes rénaux nouveaux ou qui s'aggravent, y compris l'insuffisance rénale, et interactions médicamenteuses.

Communiquez immédiatement avec votre fournisseur de soins de santé si vous présentez l'un des symptômes suivants qui pourraient être des signes d'acidose lactique :

Faiblesse ou fatigue

Douleur musculaire inhabituelle

Essoufflement ou respiration rapide

Mal de ventre avec nausées et vomissements

Mains et pieds froids ou bleus

Vertiges ou étourdissements

Rythme cardiaque rapide ou anormal

Communiquez immédiatement avec votre fournisseur de soins de santé si vous présentez l'un des symptômes suivants qui pourraient être des signes de problèmes de foie :

Jaunissement de votre peau ou du blanc de vos yeux ([jaunisse](#))

Urine de couleur foncée

Selles de couleur claire

Perte d'appétit pendant plusieurs jours ou plus

Nausées ou vomissements

Douleur, courbatures ou sensibilité du côté droit de votre estomac/région abdominale

Démangeaison

Si vous avez à la fois le VIH et [infection par le virus de l'hépatite B \(VHB\)](#) et prenez Stribild, votre VHB [infection](#) peut empirer (poussée) si vous arrêtez de prendre Stribild. N'arrêtez pas de prendre Stribild sans en parler d'abord à votre fournisseur de soins de santé.

Communiquez immédiatement avec votre fournisseur de soins de santé si vous présentez l'un des symptômes suivants qui pourraient être des signes d'aggravation d'un problème rénal (appelé [Syndrome de Fanconi](#)), qui peuvent être liés à des médicaments contenant du ténofovir :

Douleur osseuse qui ne disparaît pas ou s'aggrave

Douleur dans les bras, les mains, les jambes ou les pieds

OS cassés

Douleur ou faiblesse musculaire

La prise de Stribild avec certains médicaments peut provoquer des effets secondaires graves, potentiellement mortels. Informez votre fournisseur de soins de santé de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sur ordonnance et en vente libre, les vitamines et les suppléments à base de plantes.

Pendant que vous prenez Stribild, il est important de respecter tous vos rendez-vous avec votre fournisseur de soins de santé.

Qu'est-ce que le Stribild ?

Stribild est un médicament sur ordonnance approuvé par les États-Unis [Administration des aliments et des médicaments \(FDA\)](#) pour le traitement de l'infection par le VIH chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus qui pèsent au moins 77 lb (35 kg) et répondent à certaines exigences, telles que déterminées par un fournisseur de soins de santé.

Stribild est un VIH complet régime de traitement **ne pas** être utilisé avec d'autres médicaments anti-VIH

Stribild contient quatre médicaments différents : elvitégravir, cobicistat, emtricitabine, et fumarate de ténofovir disoproxil.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Stribild chez les personnes vivant avec le VIH, veuillez consulter le Lignes directrices pour l'utilisation d'agents antirétroviraux chez les adultes et les adolescents vivant avec le VIH et le Lignes directrices pour l'utilisation d'agents antirétroviraux dans l'infection à VIH pédiatrique.

Les médicaments contre le VIH ne peuvent pas guérir le VIH/SIDA, mais la prise quotidienne de médicaments contre le VIH aide les personnes vivant avec le VIH à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Les médicaments contre le VIH réduisent également le risque de contracter le VIH transmission. Si vous prenez des médicaments anti-VIH, ne réduisez pas, ne sautez pas ou n'arrêtez pas de les prendre à moins que votre fournisseur de soins de santé ne vous le dise.

Que dois-je dire à mon fournisseur de soins de santé avant de prendre Stribild ?

Avant de prendre Stribild, dites à votre fournisseur de soins de santé :

Si vous êtes allergique à l'un des médicaments anti-VIH contenus dans Stribild (elvitégravir, cobicistat, emtricitabine, ou alors fumarate de ténofovir disoproxil) ou tout autre médicament.

Si vous avez des problèmes de foie, y compris une infection par le virus de l'hépatite B (VHB).

Si vous avez des problèmes rénaux.

Si vous avez des problèmes osseux.

Si vous avez d'autres conditions médicales.

Si vous êtes enceinte ou envisagez de devenir enceinte. Stribild ne doit pas être utilisé pendant la grossesse car il se peut qu'il n'y ait pas assez de médicament dans le corps pendant la grossesse. Parlez à votre fournisseur de soins de santé des risques possibles liés à la prise de Stribild pendant la grossesse. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Stribild pendant la grossesse, veuillez consulter le Recommandations pour l'utilisation de médicaments antirétroviraux chez les femmes enceintes infectées par le VIH et interventions visant à réduire la transmission périnatale du VIH aux États-Unis.

Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter. Pour les femmes vivant avec le VIH aux États-Unis, le Ligne directrice recommande pas l'allaitement. Avant la naissance de votre bébé, ou si vous allaitez déjà, parlez à votre fournisseur de soins de santé pour discuter d'autres options pour nourrir votre bébé.

Si vous utilisez hormone contraceptifs à base de contraceptifs (comme les pilules, les implants ou les anneaux vaginaux). Votre fournisseur de soins de santé peut vous recommander d'utiliser des formes de contraception supplémentaires ou alternatives pendant que vous prenez Stribild. Pour plus d'informations sur l'utilisation simultanée de contraceptifs et de médicaments anti-VIH, consultez l'info-VIH infographie sur le VIH et le contrôle des naissances.

À propos des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes (y compris le millepertuis) que vous prenez ou prévoyez de prendre. Stribild peut affecter la façon dont d'autres médicaments ou produits agissent, et d'autres médicaments ou produits peuvent affecter la façon dont

Stribild fonctionne. **La prise de Stribild avec certains médicaments ou produits peut provoquer des effets secondaires graves, potentiellement mortels.**

Comment dois-je prendre Stribild ?

Stribild se présente sous forme de comprimés. Chaque tablette contient:

150 mg d'elvitégravir

150mg [cobicistat](#)

200mg [emtricitabine](#)

300mg [fumarate de ténofovir disoproxil](#)

Prenez Stribild selon les instructions de votre fournisseur de soins de santé.

Prenez Stribild par voie orale et avec de la nourriture. Ne prenez pas Stribild avec d'autres médicaments anti-VIH.

Si vous devez prendre un médicament contre l'indigestion (antiacide) contenant de l'hydroxyde d'aluminium et de magnésium ou du carbonate de calcium pendant le traitement par Stribild, prenez-le au moins 2 heures avant ou après la prise de Stribild.

Si vous avez pris trop de Stribild, contactez immédiatement votre fournisseur de soins de santé ou le centre antipoison local (1-800-222-1222) ou rendez-vous à l'urgence de l'hôpital le plus proche.

Pour plus d'informations sur la façon de prendre Stribild, consultez le [Étiquette de médicament de la FDA](#).

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Si vous manquez [une dose](#) de Stribild, prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Mais s'il est presque l'heure de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et prenez simplement votre prochaine dose à l'heure habituelle. Ne prenez pas deux doses en même temps pour compenser une dose oubliée.

Quels effets secondaires le Stribild peut-il provoquer ?

Stribild peut provoquer des effets secondaires. Certains effets secondaires peuvent être graves, comme indiqué ci-dessus. De nombreux effets secondaires des médicaments anti-VIH, tels que des nausées ou des étourdissements occasionnels, sont gérables. Voir la fiche d'information HIVinfo sur [Médicaments anti-VIH et effets secondaires pour plus d'informations](#).

Les autres effets secondaires possibles de Stribild incluent :

Problèmes osseux, y compris douleurs osseuses, hypertrophie ou amaigrissement ([ostéopénie](#)), ce qui peut entraîner des fractures.

Des changements dans votre [système immunitaire](#) (appelés [syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire](#) ou IRIS). L'IRIS est une condition qui survient parfois lorsque le système immunitaire commence à se rétablir après

traitement avec un médicament anti-VIH. À mesure que le système immunitaire se renforce, il peut avoir une réponse accrue à une infection auparavant cachée.

Dites à votre fournisseur de soins de santé si vous avez un effet secondaire qui vous dérange ou qui ne disparaît pas.

Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles de Stribild. Pour en savoir plus sur les effets secondaires possibles de Stribild, lisez le [étiquette de médicament](#) ou [alors notice d'emballage](#) ou [parlez-en](#) à votre fournisseur de soins de santé ou à votre pharmacien.

Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) ou en [ligne](#).

Comment Stribild doit-il être conservé ?

Conservez Stribild à température ambiante, entre 68 °F et 77 °F (20 °C et 25 °C).

Conservez Stribild dans le récipient d'origine et gardez le récipient bien fermé. Si le récipient contient un petit paquet d'agent de séchage (appelé déshydratant), ne le retirez pas. Le déshydratant protège le médicament de l'humidité.

Ne pas utiliser Stribild si le sceau d'origine sur l'ouverture du récipient est brisé ou manquant.

Jetez le Stribild qui n'est plus nécessaire ou qui a expiré (obsolète). Suivez [Directives de la FDA comment se débarrasser](#) en toute sécurité des médicaments inutilisés.

Gardez Stribild et tous les médicaments hors de portée des enfants.

Où puis-je trouver plus d'informations sur Stribild ?

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Stribild chez les personnes vivant avec le VIH, veuillez consulter [le Lignes directrices pour l'utilisation d'agents antirétroviraux chez les adultes et les adolescents vivant avec le VIH](#) et [le Lignes directrices pour l'utilisation d'agents antirétroviraux dans l'infection à VIH pédiatrique](#).

Ce résumé des médicaments de la version patient est basé sur les étiquettes suivantes de la FDA : [Tablette](#). La section Informations sur les conseils aux patients de l'étiquette comprend des informations destinées aux personnes prenant Stribild.

Des études de recherche liées à Stribild, de [ClinicalTrials.gov](#).

Une liste de [Médicaments contre le VIH approuvés par la FDA](#), de HIVinfo.

Informations sur le fabricant

Gilead Sciences, Inc.

Numéro principal : 800-445-3235

Assistance aux patients : 800-226-2056

Dernière révision : 8 octobre 2021

Imprimer

[Version PatienteHTML](#)

[Étiquette FDA : TablettePDF](#)