



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

การศึกษาผู้ป่วยและผู้ดูแล

เออร์โกลอยด์ เมซี[®]lates

ข้อมูลนี้จาก Lexicomp อธิบายสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับยานี้ รวมถึงสิ่งที่ใช้สำหรับ วิธีการใช้ ผลข้างเคียง และเวลาที่จะโทรหาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center

ชื่อยี่ห้อ: Canada

ไฮเดิร์ก อีเม

ยานี้ใช้ทำอะไร?

- ใช้ในการรักษาภาวะสมองเสื่อม

ฉันต้องบอกแพทย์ก่อนใช้ยานี้อย่างไร?

- หากคุณมีอาการแพ้ต่อ ergoloid mesylates หรือส่วนอื่นๆ ของยานี้
- หากคุณแพ้ยานี้ ส่วนใดส่วนหนึ่งของยานี้ ; หรือยา อาหาร หรือสารอื่นๆ บอกแพทย์เกี่ยวกับอาการแพ้และสัญญาณที่คุณมี
- หากคุณมีอาการป่วยทางจิต

นี่ไม่ใช่รายการยาทั้งหมดหรือปัญหาสุขภาพที่ทำปฏิกิริยากับยานี้

แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดของคุณ (ใบสั่งยาหรือ OTC ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ วิตามิน) และปัญหาสุขภาพ คุณต้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยสำหรับคุณที่จะใช้ยานี้กับยาและปัญหาสุขภาพทั้งหมดของคุณ ห้ามเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ปรึกษาแพทย์

ฉันต้องรู้หรือทำอะไรในขณะที่ใช้ยานี้

- บอกผู้ให้บริการดูแลสุขภาพทั้งหมดของคุณว่าคุณใช้ยานี้ ซึ่งรวมถึงแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ของคุณ
- อาจใช้เวลาสองสามสัปดาห์จึงจะเห็นผลเต็มที่
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร คุณจะต้องพูดถึงประโยชน์และความเสี่ยงที่มีต่อคุณและลูกน้อย

มีผลข้างเคียงอะไรบ้างที่ฉันต้องโทรหาแพทย์ทันที?

คำเตือน/ข้อควรระวัง:แม้ว่าจะหายาก แต่บางคนอาจมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงและบางครั้งอาจถึงตายได้เมื่อกานยา บอกแพทย์หรือรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที หากคุณมีอาการหรืออาการแสดงต่อไปนี้ที่อาจเกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงที่เลวร้ายมาก:

- สัญญาณของปฏิกิริยาภูมิแพ้ เช่น ผื่น; ลมพิษ; อาการคัน ; ผิวดแดง บวม พุพอง หรือลอก โดยมีหรือไม่มีไข้ หายใจดังเสียงฮืด ๆ ; ความรัดกุมในหน้าอกหรือลำคอ หายใจลำบาก กลืน หรือพูดคุย ; เสียงแหบผิดปกติ หรือบวมที่ปาก ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอ

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ของยานี้มีอะไรบ้าง?

ยาทั้งหมดอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลายคนไม่มีผลข้างเคียงหรือมีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โทรเรียกแพทย์ของคุณหรือรับความช่วยเหลือทางการแพทย์หากมีผลข้างเคียงหรือผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่รบกวนคุณหรือไม่หายไป:

- อาการปวดท้อง.
- ปวดท้องหรืออาเจียน

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผลข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดติดต่อแพทย์ของคุณ โทรหาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำทางการแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียง

คุณอาจรายงานผลข้างเคียงต่อหน่วยงานด้านสุขภาพแห่งชาติของคุณ

คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 1-800-332-1088 นอกจากนี้คุณยังสามารถรายงาน

ผลข้างเคียงที่<https://www.fda.gov/medwatch>.

ยานี้กินดีที่สุดในอย่างไร?

ใช้ยานี้ตามคำสั่งของแพทย์ อ่านข้อมูลทั้งหมดที่ส่งถึงคุณ ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดอย่างใกล้ชิด

- รับประทานอาหารพร้อมหรือไม่มีอาหาร

จะทำอย่างไรถ้าฉันพลาดยา?

- ทานยาที่ไม่ได้รับทันทีที่คุณนึกถึง
- หากใกล้ถึงเวลาสำหรับมือต่อไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและกลับไปเป็นเวลาปกติของคุณ
- อย่ารับประทาน 2 โดสในเวลาเดียวกันหรือเพิ่มโดส

ฉันจะเก็บและ/หรือทิ้งยานี้ได้อย่างไร?

- เก็บที่อุณหภูมิห้อง
- เก็บในที่แห้ง ห้ามเก็บในห้องน้ำ
- เก็บยาทั้งหมดไว้ในที่ปลอดภัย เก็บยาทั้งหมดให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
- ทิ้งยาที่ไม่ได้ใช้หรือหมดอายุ อย่าทิ้งชักโครกหรือเทลงท่อระบายน้ำเว้นแต่คุณจะได้รับคำสั่งให้ทำเช่นนั้น ตรวจสอบกับเภสัชกรของคุณหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยา อาจมีโปรแกรมรับยาคืนในพื้นที่ของคุณ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยาทั่วไป

- หากอาการหรือปัญหาสุขภาพของคุณไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ
- อย่าแบ่งปันยาของคุณกับผู้อื่นและอย่าใช้ยาของคนอื่น
- ยาบางชนิดอาจมีแผ่นพับข้อมูลผู้ป่วยอื่น หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดพูดคุยกับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ

- ยาบางชนิดอาจมีแผ่นพับข้อมูลผู้ป่วยอื่น ตรวจสอบกับเภสัชกรของคุณ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดพูดคุยกับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ
- หากคุณคิดว่าการให้ยาเกินขนาด ให้โทรติดต่อศูนย์ควบคุมพิษของคุณหรือรับการรักษาพยาบาลทันที พร้อมทั้งจะบอกหรือแสดงว่าถ่ายอะไรไป เท่าไหร่ และเมื่อไรเกิดขึ้น

การใช้ข้อมูลผู้บริโภคและการปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั่วไปนี้เป็นข้อมูลสรุปการวินิจฉัย การรักษา และ/หรือยาอย่างจำกัด ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ครอบคลุมและควรใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและ/หรือประเมินทางเลือกในการวินิจฉัยและการรักษาที่เป็นไปได้ ไม่รวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเงื่อนไข การรักษา ยา ผลข้างเคียง หรือความเสี่ยงที่อาจใช้กับผู้ป่วยรายใดรายหนึ่ง ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคำแนะนำทางการแพทย์หรือทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยหรือการรักษาของผู้ให้บริการด้านสุขภาพโดยพิจารณาจากการตรวจและประเมินสถานการณ์เฉพาะของผู้ป่วย ผู้ป่วยต้องพูดคุยกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อขอข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับสุขภาพ คำถามทางการแพทย์ และทางเลือกในการรักษา รวมถึงความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวกับการใช้ยา ข้อมูลนี้ไม่รับรองการรักษาหรือยาใดๆ ว่าปลอดภัย มีประสิทธิภาพ หรือได้รับการอนุมัติสำหรับการรักษาผู้ป่วยรายใดรายหนึ่ง UpToDate, Inc. และบริษัทในเครือขอปฏิเสธการรับประกันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้หรือการใช้งานข้อมูลดังกล่าว การใช้ข้อมูลนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานซึ่งมีอยู่ที่

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-efficiness-terms>.

วันที่ตรวจสอบล่าสุด

2019-09-26

ลิขสิทธิ์

© 2022 UpToDate, Inc. และบริษัทในเครือและ/หรือผู้อนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อสมาชิกทีมดูแลสุขภาพของคุณโดยตรง หากคุณเป็นผู้ป่วยที่ MSK และต้องติดต่อผู้ให้บริการหลังเวลา 17.00 น. ในช่วงสุดสัปดาห์หรือในวันหยุด โปรดโทรไปที่ 212-639-2000

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mskcc.org/pe เพื่อค้นหาห้องสมุดเสมือนของเรา

Erg oloid Mesylates - ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565

Al Ir ig h ts เป็นเจ้าของและสงวนไว้โดย Memor ial Sloan Ketter ing Cancer Center