



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

사이클란델레이트

일반적인 이름: 사이클란델레이트 (*syel LAN 드 레이트*)

상표명: 사이클로파스몰 **약물 등급:** 말초혈관확장제

사이클란델레이트란?

Cyclandelate는 혈관 확장제라고 불리는 약물 종류에 속합니다. Cyclandelate는 정맥과 동맥을 이완시켜 더 넓게 만들고 혈액이 더 쉽게 통과할 수 있도록 합니다.

이러한 조치는 다리 경련, 동맥경화증(동맥 경화), 레이노 현상 및 정맥 및 동맥의 혈류 불량과 관련된 기타 상태와 같은 상태의 증상을 치료하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Cyclandelate는 미국에서 상업적으로 이용 가능하지 않습니다.

Cyclandelate는 이 약물 가이드에 나열된 것 이외의 목적으로도 사용할 수 있습니다.

cyclandelate에 대해 알아야 할 가장 중요한 정보는 무엇입니까?

Cyclandelate는 미국에서 상업적으로 이용 가능하지 않습니다. 위장의 불편함을 줄이기 위해 음식이나 제산제와 함께 시클란델레이트를 섭취하십시오.

사이클란델레이트를 복용하기 전에 의료 제공자와 무엇을 상의해야 합니까?

이 약을 복용하기 전에 다음과 같은 경우 의사에게 알려주세요.

- 심각한 관상 동맥 질환;
- 말초 또는 뇌혈관 질환;
- 녹내장, 또는
- 출혈 또는 혈액 문제.

임산부나 수유부가 사용하는 시클란델레이트의 안전성은 확립되지 않았습니다. 임신 중이거나 아기에게 모유 수유 중인 경우 먼저 의사와 상의하지 않고 시클란델레이트를 복용하지 마십시오.

시클란델레이트는 어떻게 복용해야 하나요?

의사의 지시에 따라 정확히 시클란델레이트를 복용하십시오. 이 지시 사항을 이해하지 못하면 약사, 간호사 또는 의사에게 설명을 요청하십시오.

물 한 컵과 함께 각 복용량을 복용하십시오.

위장의 불편함을 줄이기 위해 음식이나 제산제와 함께 시클란델레이트를 섭취하십시오.

Cyclandelate는 일반적으로 식사 전과 취침 시간에 하루에 2-4회 복용합니다. 의사의 지시를 따르십시오.

습기와 열을 피해 실온에서 보관하십시오.

복용량을 놓치면 어떻게 됩니까?

기억하는 즉시 놓친 복용량을 복용하십시오. 그러나 다음 복용 시간이 거의 다 되었다면 놓친 복용량을 건너뛰고 다음 정기 복용량만 복용하십시오. 이 약을 두 번 복용하지 마십시오.

과다 복용하면 어떻게 됩니까?

응급 의료 처치를 받으십시오.

사이클란델레이트 과다 복용의 증상에는 현기증, 쇠약, 실신, 두통 및 희미한 심장 박동이 있습니다.

시클란델레이트를 복용하는 동안 무엇을 피해야 합니까?

cyclandelate로 치료하는 동안 음식, 음료 또는 활동에 대한 제한은 없습니다. 의사로부터 받은 특별 지침을 따르십시오.

사이클란델레이트 부작용

알레르기 반응(호흡 곤란, 목이 막힘, 입술, 혀 또는 얼굴의 부기, 두드러기)이 나타나면 시클란델레이트 복용을 중단하고 응급 의료 처치를 받으십시오.

기타 덜 심각한 부작용이 발생할 가능성이 더 높을 수 있습니다. 계속해서 사이클란델레이트를 복용하고 다음과 같은 경우 의사와 상담하십시오.

- 속쓰림, 위장 장애 또는 트림;
- 홍조;
- 두통;
- 빠른 심장 박동; 또는
- 약점.

여기에 나열된 것 이외의 부작용도 발생할 수 있습니다. 비정상적으로 보이거나 특히 귀찮은 부작용에 대해 의사와 상담하십시오.

어떤 다른 약물이 cyclandelate에 영향을 줍니까?

고혈압 및 기타 심장 질환을 치료하는 데 사용되는 약물은 시클란델레이트의 효과를 증가시킬 수 있습니다. 특별한 모니터링이 필요할 수 있습니다.

여기에 나열된 것 이외의 약물도 시클란델레이트와 상호 작용하거나 상태에 영향을 줄 수 있습니다. 처방전이나 비처방약을 복용하기 전에 의사와 약사와 상의하십시오.

❶ Cyclandelate 약물 상호 작용(자세한 내용)

추가 정보

- 귀하의 약사는 귀하가 읽을 수 있는 건강 전문가용으로 작성된 cyclandelate에 대한 추가 정보를 가지고 있습니다.

내 약은 어떻게 생겼습니까?

Cyclandelate는 이전에 Cyclan 및 Cyclospasmol이라는 상표명으로 200mg 및 400mg 캡슐로 처방전이 가능했습니다. Cyclandelate는 이전에 일반 정제 제형으로도 사용 가능했습니다. 특히 이 약이 처음인 경우 약사에게 이 약에 대해 궁금한 점이 있으면 문의하십시오.

기억하십시오. 이 약과 다른 모든 약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 절대로 다른 사람과 약을 공유하지 말고, 이 약을 처방된 표시에만 사용하십시오.

이 페이지에 표시된 정보가 귀하의 개인 상황에 적용되는지 확인하려면 항상 의료 제공자와 상의하십시오.

저작권 1996-2022 Cerner Multum, Inc. 버전: 3.04. 수정 날짜: 2/13/04 오후 4:00:53