Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a615044.html

Daclatasvir

binibigkas bilang (dak lat' bilang vir)

Paunawa:

Hindi na available ang Daclastasvir sa United States.

MAHALAGANG BABALA:

Maaaring nahawaan ka na ng hepatitis B (isang virus na nakahahawa sa atay at maaaring magdulot ng matinding pinsala sa atay) ngunit wala kang anumang mga sintomas ng sakit. Sa kasong ito, ang pag-inom ng daclatasvir ay maaaring tumaas ang panganib na ang iyong impeksyon ay magiging mas seryoso o nagbabanta sa buhay at magkakaroon ka ng mga sintomas. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon ng impeksyon sa hepatitis B virus. Mag-uutos ang iyong doktor ng pagsusuri sa dugo upang makita kung mayroon ka o nagkaroon na ng impeksyon sa hepatitis B. Susubaybayan ka rin ng iyong doktor para sa mga palatandaan ng impeksyon sa hepatitis B sa panahon at sa loob ng ilang buwan pagkatapos ng iyong paggamot. Kung kinakailangan, maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng gamot upang gamutin ang impeksyong ito bago at sa panahon ng iyong paggamot sa daclatasvir. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas sa panahon o pagkatapos ng iyong paggamot, tawagan kaagad ang iyong doktor: labis na pagkapagod,

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Maaaring mag-order ang iyong doktor ng ilang mga pagsusuri bago, habang, at pagkatapos ng iyong paggamot upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa daclatasvir.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa (mga) panganib ng pag-inom ng daclatasvir.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Daclatasvir kasama ng isa pang gamot (sofosbuvir [Solvadi]) upang gamutin ang isang partikular na uri ng talamak na hepatitis C (isang patuloy na impeksyon sa viral na pumipinsala sa atay). Ang Daclatasvir ay nasa isang klase ng mga antiviral na gamot na tinatawag na hepatitis C virus (HCV) NS5A inhibitors. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa virus na nagdudulot ng hepatitis C mula sa pagkalat sa loob ng katawan. Hindi alam kung pinipigilan ng daclatasvir ang pagkalat ng hepatitis C sa ibang tao.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Daclatasvir bilang isang tablet na dapat inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha nang may pagkain o walang pagkain isang beses sa isang araw. Ang Daclatasvir ay dapat inumin kasama ng sofosbuvir, kadalasan sa loob ng 12 linggo. Uminom ng daclatasvir sa halos parehong oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Kunin ang daclatasvir nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Ipagpatuloy ang pag-inom ng daclatasvir kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-inom ng daclatasvir o sofosbuvir nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng daclatasvir,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa daclatasvir, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa daclatasvir tablets. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.
- sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril), phenytoin (Dilantin, Phenytek), rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, Rifater), o St. John's wort. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng daclatasvir kung umiinom ka ng isa o higit pa sa mga gamot na ito.
- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: amiodarone (Nexterone, Pacerone); ilang antibiotic tulad ng clarithromycin (Biaxin, sa Prevpac), nafcillin, rifapentine (Priftin), at telithromycin (Ketek); ilang mga antifungal tulad ng itraconazole (Onmel, Sporanox), ketoconazole, posaconazole (Noxafil), at voriconazole (Vfend); bosentan (Tracleer); buprenorphine at naloxone (Suboxone, Zubsolv); ilang mga gamot sa pagpapababa ng kolesterol (statins) tulad ng atorvastatin (Lipitor, sa Caduet), fluvastatin (Lescol), pitavastatin (Livalo), pravastatin (Pravachol), rosuvastatin (Crestor), at simvastatin (Flolipid, Zocor, sa Vytorin); gamot na naglalaman ng cobicistat (Stribild); dabigatran (Pradaxa); dexamethasone; digoxin (Lanoxin); efavirenz (Sustiva, sa Atripla), etravirine (Intelence); ilang HIV protease inhibitors gaya ng atazanavir (Reyataz, sa Evotaz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, sa Kaletra, Technivie, Viekira Pak), at saquinavir (Invirase); modafinil (Provigil); nefazodone; nevirapine (Viramune); at warfarin (Coumadin, Jantoven). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa daclatasvir, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, sa Kaletra, Technivie, Viekira Pak), at saquinavir (Invirase); modafinil (Provigil); nefazodone; nevirapine (Viramune); at warfarin (Coumadin, Jantoven). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa daclatasvir, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, sa Kaletra, Technivie, Viekira Pak), at saquinavir (Invirase); modafinil (Provigil); nefazodone; nevirapine (Viramune); at warfarin (Coumadin, Jantoven). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa daclatasvir, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito.
- sabihin sa iyong doktor kung nagkaroon ka ng liver transplant, anumang uri ng sakit sa atay maliban sa hepatitis C, o sakit sa puso.
- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng daclatasvir, tawagan ang iyong doktor.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung naaalala mo ang napalampas na dosis sa araw na dapat mong inumin ito, kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito sa araw na iyon. Gayunpaman, kung hindi mo naaalala ang napalampas na dosis hanggang sa susunod na araw, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dalawang dosis sa parehong araw.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Daclatasvir. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

- sakit ng ulo
- pagtatae

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung umiinom ka rin ng amiodarone at nararanasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito o ang mga nasa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

- malapit nang mawalan ng malay o himatayin
- pagkahilo o pagkahilo
- kahinaan o hindi maganda ang pakiramdam
- kinakapos na paghinga
- pananakit ng dibdib
- mga problema sa memorya
- pagkalito

Ang Daclatasvir ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332-1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga safety cap

at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon – isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

- Daklinza®

Huling Binago - 07/15/2020

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022