Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a615044.html

Daclatasvir

prononcé comme (dak lat' comme vir)

Avis:

Daclastasvir n'est plus disponible aux États-Unis.

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Vous pouvez déjà être infecté par l'hépatite B (un virus qui infecte le foie et peut causer de graves dommages au foie) mais ne présentez aucun symptôme de la maladie. Dans ce cas, la prise de daclatasvir peut augmenter le risque que votre infection s'aggrave ou mette votre vie en danger et que vous développiez des symptômes. Informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une infection par le virus de l'hépatite B. Votre médecin vous prescrira un test sanguin pour voir si vous avez ou avez déjà eu une infection à l'hépatite B. Votre médecin vous surveillera également pour déceler tout signe d'infection par le virus de l'hépatite B pendant et pendant plusieurs mois après votre traitement. Si nécessaire, votre médecin pourra vous donner des médicaments pour traiter cette infection avant et pendant votre traitement par daclatasvir. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants pendant ou après votre traitement, appelez immédiatement votre médecin : fatigue excessive,

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin peut prescrire certains tests avant, pendant et après votre traitement pour vérifier la réponse de votre corps au daclatasvir.

Discutez avec votre médecin des risques liés à la prise de daclatasvir.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le daclatasvir est utilisé avec un autre médicament (le sofosbuvir [Solvadi]) pour traiter un certain type d'hépatite C chronique (une infection virale en cours qui endommage le foie). Le daclatasvir appartient à une classe de médicaments antiviraux appelés inhibiteurs de la NS5A du virus de l'hépatite C (VHC). Il agit en empêchant le virus responsable de l'hépatite C de se propager à l'intérieur du corps. On ne sait pas si le daclatasvir prévient la propagation de l'hépatite C à d'autres personnes.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le daclatasvir se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il est généralement pris avec ou sans nourriture une fois par jour. Le daclatasvir doit être pris en association avec le sofosbuvir, généralement pendant 12 semaines. Prenez le daclatasvir à peu près à la même heure chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez le daclatasvir exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Continuez à prendre du daclatasvir même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre du daclatasvir ou du sofosbuvir sans en parler à votre médecin.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre du daclatasvir,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au daclatasvir, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients contenus dans les comprimés de daclatasvir. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.
- informez votre médecin si vous prenez de la carbamazépine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril), de la phénytoïne (Dilantin, Phenytek), de la rifampicine (Rifadin, Rimactane, dans Rifamate, Rifater) ou du millepertuis. Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre le daclatasvir si vous prenez un ou plusieurs de ces médicaments.
- informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : amiodarone (Nexterone, Pacerone); certains antibiotiques tels que la clarithromycine (Biaxin, dans Prevpac), la nafcilline, la rifapentine (Priftin) et la télithromycine (Ketek); certains antifongiques tels que l'itraconazole (Onmel, Sporanox), le kétoconazole, le posaconazole (Noxafil) et le voriconazole (Vfend); bosentan (Tracler); buprénorphine et naloxone (Suboxone, Zubsolv); certains médicaments hypocholestérolémiants (statines) tels que l'atorvastatine (Lipitor, dans Caduet), la fluvastatine (Lescol), la pitavastatine (Livalo), la pravastatine (Pravachol), la rosuvastatine (Crestor) et la simvastatine (Flolipid, Zocor, dans Vytorin); médicament contenant du cobicistat (Stribild); dabigatran (Pradaxa); dexaméthasone; digoxine (Lanoxine); éfavirenz (Sustiva, dans Atripla), étravirine (Intelence); certains inhibiteurs de la protéase du VIH tels que l'atazanavir (Reyataz, dans Evotaz), l'indinavir (Crixivan), le nelfinavir (Viracept), le ritonavir (Norvir, dans Kaletra, Technivie, Viekira Pak) et le saquinavir (Invirase); modafinil (Provigil); néfazodone; névirapine (Viramune); et la warfarine (Coumadin, Jantoven). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le daclatasvir, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, dans Kaletra, Technivie, Viekira Pak) et saquinavir (Invirase); modafinil (Provigil); néfazodone; névirapine (Viramune); et la warfarine (Coumadin, Jantoven). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le daclatasvir, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, dans Kaletra, Technivie, Viekira Pak) et saquinavir (Invirase); modafinil (Provigil); néfazodone; névirapine (Viramune); et la warfarine (Coumadin, Jantoven). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le daclatasvir, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste.
- informez votre médecin si vous avez subi une greffe du foie, tout type de maladie du foie autre que l'hépatite C ou une maladie cardiaque.
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez du daclatasvir, appelez votre médecin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Si vous vous souvenez de la dose oubliée le jour où vous deviez la prendre, prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez ce jour-là. Cependant, si vous ne vous souvenez de la dose oubliée que le lendemain, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas deux doses le même jour.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Daclatasvir peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- mal de crâne
- diarrhée

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous prenez également de l'amiodarone et que vous présentez l'un de ces symptômes ou ceux de la rubrique AVERTISSEMENT IMPORTANT, appelez immédiatement votre médecin :

- près de s'évanouir ou de s'évanouir
- étourdissements ou étourdissements
- faiblesse ou ne pas se sentir bien
- essoufflement
- douleur thoracique
- problèmes de mémoire
- confusion

Daclatasvir peut provoquer d'autres effets indésirables. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA). (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité

et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit qui est haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Daklinza®

Dernière révision - 15/07/2020

Apprenez à citer cette page

Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022