Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : sovodak.com

포장 전단지: 환자를 위한 정보
소보닥®
(다클라타스비르 60mg / 소포스부비르 400mg 필름코팅정)

이 약을 복용하기 전에 이 안내서를 주의 깊게 읽으십시오. 중요한 정보가 포함되어 있습니다.

이 전단지를 보관하십시오. 다시 읽어야 할 수도 있습니다.
추가 질문이 있는 경우 의사에게 문의하거나 제약사.
이 약은 당신에게만 처방되었습니다. 다른 사람에게 전달하지 마십시오. 질병의 징후가 귀하와 동일하더라도 해를 끼칠 수 있습니다.
부작용이 관찰되면 의사 또는 약사와 상담하십시오. 여기에는 이 전단지에 나열되지 않은 가능한 모든 부작용이 포함됩니다. 섹션 4를 참조하십시오.

이 전단지에는 무엇이 들어 있습니까?

1. 소보닥이란®무엇에 사용되는지
2. SOVODAK을 복용하기 전에 알아야 할 사항®
3. 소보닥 복용법®
4. 가능한 부작용
5. 소보닥 보관방법®
6. 팩의 내용물 및 기타 정보

1. 소보닥이란®무엇에 사용되는지 소보닥®활성 성분 Daclatasvir 60mg 및 Sofosbuvir 400mg(노란색 정제)을 포함합니다. C형 간염 바이러스에 의해 유발되는 간에 영향을 미치는 전염병인 C형 간염 성인을 치료하는 데 사용됩니다.

이 약은 C형 간염 바이러스가 새로운 세포를 증식하고 감염시키는 것을 막음으로써 작동합니다. 이렇게 하면 체내 C형 간염 바이러스의 양이 줄어들고 일정 기간 동안 혈액에서 바이러스가 제거됩니다.

SOVODAK과 함께 복용할 다른 의약품에 대한 패키지 전단지도 읽는 것이 매우 중요합니다.®. 귀하의 약에 대해 질문이 있는 경우 의사 또는 약사에게 문의하십시오.

2. SOVODAK을 복용하기 전에 알아야 할 사항®
소보닥을 복용하지 마십시오®
복용하는 경우**아미오다론**(불규칙한 심장 박동을 치료하는 데 사용되는 약물).
Sofosbuvir, Daclatasvir 또는 이 약의 다른 성분에 알레르기가 있는 경우(이 전단지의 섹션 6에 나열됨)

St. John's wort가 함유된 약을 복용하는 경우 *(Hypericum perforatum*, 허브 제제). 임신 중이거나 수유 중인 경우

경고 및 주의 사항
SOVODAK을 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상담하십시오.®. 다음 중 하나에 해당하는 경우 의사에게 알리십시오.
인간 면역 결핍 바이러스(HIV)에 감염되었거나 B형 간염에 감염된 경우,
간 또는 다른 장기 이식을 받았거나 받기를 기다리고 있는 경우,

간이 손상되어 제대로 기능하지 않는 경우(대상성 간 질환),

신장 문제가 있습니다. 의사나 약사와 상의하세요.

심각한 신장 문제가 있거나 SOVODAK의 효과로 혈액 투석을 받고 있는 경우®심각한 신장 문제가 있는 환자의 경우 완전히 테스트되지 않았습니다.

혈액 검사
의사는 SOVODAK 치료 전, 치료 중 및 치료 후에 혈액을 검사할 것입니다.®. 의사가 다음을 수행할 수 있습니다.

SOVODAK과 함께 복용해야 하는 다른 약을 결정하십시오.®그리고 얼마나 오랫동안.
치료가 효과가 있었고 C형 간염 바이러스에 감염되지 않았는지 확인하십시오.

어린이 및 청소년
소보닥®18세 미만의 환자에게는 권장되지 않습니다. 소보닥®아직 어린이와 청소년에 대해 연구되지 않았습니다.

기타 의약품 및 SOVODAK®
다른 약을 복용 중이거나 최근에 복용했거나 복용할 가능성이 있는 경우 의사나 약사에게 알리십시오. 이것은 SOVODAK 때문입니다.® 일부 의약품의 작동 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 일부 의약품은 SOVODAK 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.®
공장. 의사는 SOVODAK의 복용량을 조정해야 할 수도 있습니다®또는 귀하의 다른 의약품. 당신은 SOVODAK을 복용하지 못할 수 있습니다®특정 의약품과 함께.
하지 마라소보닥을 먹다®당신이 복용하는 경우**아미오다론** (심장 부정맥, 심장 박동 불규칙을 치료하는 데 사용) 중단한 지 6개월 미만인 경우에도 마찬가지입니다.
다음 약을 복용하는 경우 의사에게 알리십시오. 의사는 약의 복용량을 변경하거나 추가 안전 조치를 시행하기를 원할 수 있습니다.

페니토인, 카르바마제핀, 옥스카르바제핀 또는 페노바르비탈(간질 발작 치료에 사용)
리팜피신, 리파부틴 또는 리파펜틴(결핵 치료에 사용되는 항생제)

덱사메타손(알레르기 및 염증성 질환 치료에 사용되는 스테로이드),
약St. John's wort(*천공과*, 허브 제제),

Tipranavir, atazanavir, saquinavir, ritonavir, darunavir 또는 indinavir, (HIV 감염 치료에 사용),
보세프레비르 또는 텔라프레비르(C형 간염 치료에 사용), 클라리트로마이신, 텔리트로마이신 또는 에리트로마이신(세균 감염 치료에 사용),
다비가트란 에텍실레이트(혈전 예방에 사용), 케토코나졸, 이트라코나졸, 포사코나졸 또는 보리코나졸(진균 감염 치료에 사용),

디곡신(불규칙한 심장 박동 및 심부전 치료에 사용),
Verapamil, diltiazem, nifedipine 또는 amlodipine(혈압을 낮추는 데 사용),
로수바스타틴, 아토르바스타틴, 플루바스타틴, 심바스타틴, 피타바스타틴 또는 프라바스타틴(혈중 콜레스테롤을 낮추는 데 사용), 경구 피임약.

임신과 피임
임신 중이거나 임신 중이거나 임신할 계획이 있는 경우 의사에게 알리십시오. 임신한 경우 SOVODAK 복용을 중단하십시오.®즉시 의사에게 알리십시오.

임신 중이라면 SOVODAK을 복용해서는 안 됩니다.®. 소보닥®때때로 리바비린과 함께 사용됩니다. 리바비린은 태아를 해칠 수 있습니다. 따라서 매우

귀하(또는 귀하의 파트너)가 리바비린 치료 중에 임신하지 않는 것이 중요합니다.
귀하 또는 귀하의 파트너는 치료 중 및 치료 후에 효과적인 피임법을 사용해야 합니다. 그것은 매우 중요하다 리바비린의 "임신" 섹션을 읽었습니다. 매우 조심스럽게 전단지를 포장하십시오. 귀하에게 적합한 효과적인 피임법에 대해 의사에게 문의하십시오.

귀하 또는 귀하의 파트너가 SOVODAK 기간 동안 임신한 경우◈ 치료를 받거나 그 다음 달에 즉시 의사에게 연락해야 합니다.

모유 수유
활성 물질인 Sofosbuvir와 Daclatasvir가 사람의 모유로 전달되는지 여부는 알려져 있지 않습니다. SOVODAK 치료 중 모유 수유를 해서는 안 됩니다.◈.

운전 및 기계 사용
일부 환자는 SOVODAK을 복용하는 동안 현기증, 집중하기 어려움, 시력 문제를 보고했습니다.◈
C형 간염 감염 때문입니다. 이러한 부작용이 있는 경우 도구나 기계를 운전하거나 사용하지 마십시오.

소보닥◈유당 함유
일부 설탕(예: 유당)에 대한 과민증이 있다는 의사의 말을 들었다면 SOVODAK을 복용하기 전에 의사와 상담하십시오◈.

3. 소보닥 복용법◈
의사가 지시한 대로 항상 이 약을 복용하십시오. 확실하지 않은 경우 의사 또는 약사에게 문의하십시오.

권장 복용량
권장 복용량은**1일 1회 1정**소보닥◈. 정제를 통째로 삼키십시오. 정제는 매우 불쾌한 맛이 있으므로 씹거나 부수지 마십시오. 소보닥◈

식사와 함께 또는 식사 없이 복용할 수 있습니다.
일부 다른 의약품은 SOVODAK과 상호 작용할 수 있습니다.◈, SOVODAK 수치에 영향◈당신의 몸에. 이러한 약을 복용하는 경우 의사는 SOVODAK의 일일 복용량을 변경하기로 결정할 수 있습니다.◈ 치료가 귀하에게 안전하고 효과적인지 확인합니다.

SOVODAK 이후로◈C 형 간염 감염에 대해 다른 의약품과 함께 사용할 수 있습니다. 이러한 의약품의 패키지 전단지를 읽으십시오. 질문이 있으면 의사나 약사에게 문의하십시오.

SOVODAK을 복용하는 데 얼마나 걸립니까?◈
SOVODAK을 복용하십시오.◈의사가 복용하도록 지시한 한.

SOVODAK 치료 기간◈12주 또는 24주가 됩니다. 치료 기간은 이전에 C형 간염 치료를 받았는지 여부, 간의 상태 및 SOVODAK과 함께 복용할 기타 약에 따라 다릅니다.◈.

SOVODAK을 더 복용하면◈당신이해야보다
실수로 SOVODAK을 더 복용하는 경우◈의사가 권장한 것보다 더 많은 정제를 복용하는 경우 즉시 의사에게 연락하거나 가까운 병원에 연락하여 조언을 받으십시오. 복용한 것을 쉽게 설명할 수 있도록 정제 병을 휴대하십시오.

SOVODAK 복용을 잊은 경우◈
이 약의 복용량을 놓치지 않는 것이 중요합니다.
SOVODAK 복용량을 놓친 경우◈, 놓친 복용량을 다음과 같이 복용하십시오. 같은 날에 기억하는 즉시. 다만, 잊은 용량이 같은 날 내에 기억나지 않는 경우에는 그 용량을 건너뛰고 적절한 시간에 다음 용량을 투여한다. 1일 1회 또는 2회 이상 복용하지 마십시오.

SOVODAK 복용을 중단하는 경우◈
SOVODAK을 계속 복용하는 것이 중요합니다.◈전체 치료 기간 동안. 그렇지 않으면 약이 C형 간염 바이러스에 효과가 없을 수 있습니다.
SOVODAK 복용을 중단하지 마십시오◈~하지 않는 한의사가 그만하라고 합니다.
이 약의 사용에 대해 추가 질문이 있는 경우 의사 또는 약사에게 문의하십시오.

4. 가능한 부작용
모든 약과 마찬가지로 이 약도 부작용을 일으킬 수 있지만 모든 사람이 겪는 것은 아닙니다. 부작용이 있는 경우 일반적으로 경미하고 견딜 수 있습니다.
가장 흔한 부작용은 피험자의 10% 이상에서 보고된 두통과 피로입니다. 덜 일반적인 다른 부작용으로는 메스꺼움, 설사 및 불면증이 있습니다.
리바비린을 SOVODAK과 함께 복용하는 경우◈, 부작용에 대해서는 리바비린의 약물 삽입물을 참조하십시오.

부작용 보고
부작용이 있는 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오. 여기에는 이 전단지에 나열되지 않은 가능한 모든 부작용이 포함됩니다.

5. 소보닥 보관방법◈
이 약은 어린이의 눈과 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 상점
SOVODAK◈빛과 습기로부터 보호, 실내
30°C 이하의 온도
포장 상자에 표시된 유효 기간이 지난 후에는 이 약을 사용하지 마십시오.병"EXP" 이후. 만료 날짜는 해당 월의 마지막 날입니다.

원래 병에 보관하십시오.
병 입구의 밀봉이 파손되었거나 없는 경우 사용하지 마십시오.

폐수나 생활쓰레기로 약품을 버리지 마세요. 더 이상 사용하지 않는 약을 버리는 방법은 약사에게 문의하십시오. 이러한 조치는 환경을 보호하는 데 도움이 됩니다.

6. 팩 내용물 및 기타 정보 What SOVODAK◈포함

각 필름코팅정은 Daclatasvir(이염산염) 60mg과 Sofosbuvir 400mg을 함유하고 있습니다.
다른 재료들:
- *태블릿 코어:*미정질 셀룰로오스, 만니톨, 크로스카멜로스 나트륨, 이산화규소(E551) 및 마그네슘 스테아레이트.
- *필름 코팅*: 활석, 이산화티타늄, PEG, PG, HPMC, 카올린, 유당, 철- 산화물 황색 77492, 황색 부족 18965, 선셋 황색 15985.

라이센스 보유자: Fan Avaran Rojan Mohaghegh Darou Co. (ROJAN), 테헤란, 이란
참고문헌: BNF 68; 의약품의 선택 및 사용에 관한 권한, 2014년 9월-2015년 3월, 페이지 430-431.