

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616036.html>

הזרקת Daclizumab (da kliz' ue mab) מבוסא בתור

הודעה:

הזרקת Daclizumab אינה זמינה עוד. אם אתה משתמש כעת בדקליזומאב, עליך להתקשר לרופא שלך כדי לדון במעבר לטיפול אחר.

אזהרה חשובה:

ספר לרופא ולרוקח שלך על כל התרופות שאתה נוטל כדי שיוכלו לבדוק אם כל אחת מהתרופות שלך עלולה להגביר את הסיכון שתפתח נזק לכבד במהלך הטיפול שלך בדקליזומאב. הרופא שלך יעקוב אחריך לאיתור סימנים לבעיות כבד במהלך ובמשך 6 חודשים לאחר הטיפול שלך בדקליזומאב. אם אתם חווים אחד מהתסמינים הבאים, התקשרו לרופא מיד: בחילות, הקאות, עייפות קיצונית, דימום או חבורות חריגות, חוסר אנרגיה, אובדן תיאבון. daclizumab עלול לגרום לנזק כבד חמור או מסכן חיים. הסיכון לנזק לכבד עלול להיות מוגבר אצל אנשים הנוטלים תרופות אחרות הידועים כגורמות לנזק לכבד, ובאנשים שכבר סובלים ממחלת כבד. ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת מבעיות כבד או דלקת כבד. הרופא שלך עשוי לומר לך לא להשתמש בהזרקת Daclizumab

עלול לגרום להפרעות חמורות במערכת החיסון (מצבים המתרחשים כאשר המערכת החיסונית תוקפת תאים בריאים בגוף). ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת מבעיות עור, כולל אקזמה או פסוריאזיס. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים, התקשר לרופא מיד: אדמומיות, גירוד או קשקשים בעור; בלוטות נפוחות בצוואר, בבתי השחי או במפשעה; שלשול; צואה מדממת; כאב בטן; או כל סימפטום חדש ובלתי מוסבר המשפיע על כל חלק בגופך Daclizumab

בגלל הסיכונים עם תרופה זו, הזרקת daclizumab זמינה רק באמצעות תוכנית הפצה מוגבלת מיוחדת. תוכנית הוקמה על ידי היצרן של daclizumab כדי לוודא שאנשים לא משתמשים בהזרקת daclizumab ללא הניטור הדרוש שנקראת (REMS) Program (Zinbryta Risk Evaluation and Mitigation Strategies). הרופא שלך ושלך

הרוקח חייב להיות רשום בתוכנית Zinbryta REMS. בקש מהרופא שלך מידע נוסף על תוכנית זו וכיצד תקבל את התרופה שלך.

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. הרופא שלך יזמין בדיקות מסוימות לפני, במהלך ובמשך 6 חודשים לאחר המנה האחרונה שלך כדי לבדוק את תגובת הגוף שלך להזרקת daclizumab.

הרופא או הרוקח שלך יספקו לך את גיליון המידע של היצרן למטופל (מדריך התרופות) כאשר תתחיל טיפול בהזרקת daclizumab ובכל פעם שתמלא מחדש את המרשם שלך. קרא את המידע בעיון ושאל את הרופא או הרוקח אם יש לך שאלות כלשהן. אתה יכול גם לבקר באתר מינהל המזון והתרופות (FDA).

[<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>] /DrugSafety/ucm085729.htm לקבלת מדריך התרופות. (<http://www.fda.gov/Drugs>)

שוחח עם הרופא שלך על הסיכונים בקבלת זריקת דאקליזומאב.

היי האם נרשמה תרופה זו?

הוא בקבוצה של תרופות הנקראות אימונומודולטורים. חושבים שהוא פועל על ידי הפחתת דלקת והפחתת פעולתם של תאי חיסון שעלולים לגרום לנזק עצבי Daclizumab. משמש בדרך כלל על ידי אנשים שלא נעזרו בשתי תרופות אחרות לפחות עבור טרשת נפוצה Daclizumab). מחלה שבה העצבים אינם פועלים כראוי ואנשים עלולים לחוות חולשה, חוסר תחושה, אובדן קואורדינציה בשרירים ובעיות בראייה, דיבור ושליטה בשלפוחית השתן (MS) משמש למניעת אפיזודות של תסמינים ולהאטת החמרה של נכות אצל אנשים שיש להם צורות התקפיות-הפוכות (מהלך מחלה שבה התסמינים מתלקחים מעת לעת) של טרשת נפוצה Daclizumab

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

מגיע כתמיסה (נוזל) במזרק מלא מראש להזרקה תת עורית (מתחת לעור). זה מוזרק בדרך כלל פעם בחודש. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. השתמש בדקליזומאב בדיוק לפי ההוראות. אין להשתמש יותר או פחות ממנו או להשתמש בו לעתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא שלך Daclizumab

תקבל את המנה הראשונה של דאקליזומאב במשרד הרופא שלך. לאחר מכן, אתה יכול להזריק דקליזומאב בעצמך או לבקש מחבר או קרוב משפחה לבצע את ההזרקות. לפני שאתה משתמש בדקליזומאב בעצמך בפעם הראשונה, קרא את ההוראות הכתובות המצורפות אליו. בקש מהרופא או הרוקח שלך להראות לך או לאדם אשר יזריק את התרופה כיצד להזריק אותה.

אתה יכול להזריק דקליזומאב בחלק האחורי של הזרועות העליונות, באזור הבטן או בירכיים. אל תזריק את התרופה לעור מגורה, חבול, אדמומי, נגוע, מצולק או מקועקע.

לעולם אל תשתמש שוב או תשתף מחטים או מזרקים מלאים מראש של תרופות. לזרוק מזרקים משומשים במיכל עמיד לנקב. שוחח עם הרופא או הרוקח על אופן השלכת המיכל העמיד לנקב.

השימושים בתרופה זו

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

לפני השימוש בהזרקת daclizumab,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי לדקליזומאב, לכל תרופה אחרת או לכל אחד מהמרכיבים בהזרקת דאקליזומאב. שאל את הרוקח שלך או עיין במדריך התרופות לקבלת רשימה של המרכיבים.
- ספר לרופא ולרוקח אילו עוד תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה נוטל או מתכוון לקחת. ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המינונים של התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי.
- ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת אי פעם בשחפת או אם יש לך זיהום. כמו כן, ספר לרופא שלך אם סבלת או סבלת מדיכאון או אם אי פעם חשבת על או ניסית להתאבד.
- ספר לרופא שלך אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אם אתה נכנס להריון בזמן השימוש בדקליזומאב, התקשר לרופא שלך.
- אתה צריך לדעת שאתה עלול להיות מדוכא או אובדני (חושב על פגיעה או התאבדות או תכנון או ניסיון לעשות זאת) בזמן שאתה משתמש בהזרקת daclizumab. אתה, משפחתך או המטפל שלך צריכים להתקשר לרופא שלך מיד אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים: דיכאון חדש או מחמיר, דיבור או חשיבה על רצון לפגוע בעצמך או לשים קץ לחיך, או כל שינוי חריג אחר בהתנהגות או במצב הרוח. ודא שהמשפחה או המטפל שלך יודעים אילו תסמינים עלולים להיות חמורים, כך שהם יכולים להתקשר לרופא אם אינך מסוגל לפנות לטיפול בעצמך.
- אין לך חיסונים כלשהם במהלך הטיפול בדקליזומאב או עד 4 חודשים לאחר המנה הסופית מבלי לדבר עם הרופא שלך.

האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

אם אתה מתגעגע למנה של זריקת דאקליזומאב, הזריק את המנה שהחמצת ברגע שאתה זוכר זאת. עם זאת, אם חלפו יותר משבועיים לאחר המנה שהוחמצת, דלג על המנה שהוחמצת והמשיכו בלוח הזמנים הרגיל של המינון. אין להזריק מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה. התקשר לרופא שלך אם אתה מחמיץ מנה ויש לך שאלות לגבי מה לעשות.

התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

הזרקת Daclizumab עלולה לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף:

- אקנה
- כאב בפה

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הללו או מאלה המפורטים בסעיף אזהרה חשובה, והתקשר לרופא שלך מיד או קבל טיפול רפואי חירום:

- פריחה
- כוורות
- עקצוץ
- קשיי נשימה או בליעה
- נפיחות של העיניים, הפנים, הפה, הלשון או הגרון
- דיכאון חדש או מחמיר
- שינויים במצב הרוח או בהתנהגות
- לחשוב על פגיעה או התאבדות או תכנון או ניסיון לעשות זאת
- נזלת, שיעול, כאב גרון, חום, צמרמורות וסימנים אחרים של זיהום
- קושי במתן שתן
- כאב בעת מתן שתן
- התקפים

עלול לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן נטילת התרופה Daclizumab

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>) או בטלפון (1-800-332-1088).

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה הזו בקרטון שבו היא הגיעה, סגור היטב והרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן דקליזומאב במקרר אך אין להקפיא אותו. אם אתה מקפיא בטעות את התרופה, עליך להשליך את המזרק הזה. ניתן לשמור את Daclizumab בטמפרטורת החדר עד 30 ימים אך יש להגן עליו מפני אור. אין להחזיר את Daclizumab למקרר לאחר אחסנה בטמפרטורת החדר.

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכניות החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (<http://goo.gl/c4Rm4p>) כדי לגישה לתוכנית החזרה.

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון מטפלי גלולות שבועיים ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאפים) אינם עמידים לילדים.

ילדים קטנים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם.
<http://www.upandaway.org>]<http://www.upandaway.org>[

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisonhelp.org/help>]<https://www.poisonhelp.org/help>[. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

צריך לדעת מידע אחר?

לפני ביצוע בדיקת מעבדה כלשהי, ספר לרופא שלך ולצוות המעבדה שאתה משתמש בהזרקת daclizumab.

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כמו ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

- זינבריטה®
- זנאפקס®

¶-מוצר ממותג זה אינו זמין עוד בשוק. חלופות גנריות עשויות להיות זמינות.

מתוקן לאחרונה - 15/04/2018

[למד כיצד לצטט דף זה](#)



[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc.](#) כתב ויתור

© AHFS מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. נשכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022

