



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [薬](#)、[ハーブ](#)、[サプリメント](#) → [ダクリズマブ注射](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616036.html>

## ダクリズマブ注射

(da kliz'ue mab) と発音します

### お知らせ :

ダクリズマブ注射は使用できなくなりました。現在ダクリズマブを使用している場合は、医師に連絡して別の治療法への切り替えについて話し合う必要があります。

### 重要な警告 :

ダクリズマブは、深刻なまたは生命を脅かす肝臓障害を引き起こす可能性があります。肝障害を引き起こすことが知られている他の薬を服用している人や、すでに肝疾患を患っている人では、肝障害のリスクが高まる可能性があります。肝臓に問題があるか、肝炎にかかったことがあるかどうかを医師に伝えてください。あなたの医者はあなたにダクリズマブ注射を使わないように言うかもしれません。あなたが服用しているすべての薬について医師と薬剤師に伝えてください。そうすれば、あなたの薬のいずれかがダクリズマブによる治療中に肝臓障害を発症するリスクを高める可能性があるかどうかを確認できます。ダクリズマブによる治療中および治療後6か月間、医師が肝臓の問題の兆候を監視します。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください：吐き気、嘔吐、極度の倦怠感、異常な出血やあざ、エネルギー不足、食欲不振、

ダクリズマブは、深刻な免疫系障害（免疫系が体内の健康な細胞を攻撃するときに発生する状態）を引き起こす可能性があります。湿疹や乾癬などの皮膚の問題があるか、またはこれまでに経験したことがあるかどうかを医師に伝えてください。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。皮膚の発赤、かゆみ、または鱗屑。首、脇の下、または鼠径部の腫れた腺; 下痢; 血便; 胃痛; またはあなたの体の任意の部分に影響を与える新しい、説明のつかない症状。

この薬にはリスクがあるため、ダクリズマブの注射は特別な制限された配布プログラムを通じてのみ利用できます。ダクリズマブの製造業者によって、Zinbryta Risk Evaluation and Mitigation Strategies (REMS) プログラムと呼ばれる、必要な監視なしに人々がダクリズマブ注射を使用しないようにするためのプログラムが設定されています。あなたの医者とあなたの

薬剤師はZinbrytaREMSプログラムに登録されている必要があります。このプログラムの詳細と薬の服用方法については、医師にご相談ください。

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。医師は、ダクリズマブ注射に対する体の反応を確認するために、最終投与前、投与中、投与後6か月間特定の検査を注文します。

ダクリズマブ注射による治療を開始するとき、および処方箋を補充するたびに、医師または薬剤師から製造元の患者情報シート（投薬ガイド）が提供されます。情報を注意深く読み、質問がある場合は医師または薬剤師に尋ねてください。食品医薬品局（FDA）のWebサイトにアクセスすることもできます

（<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>]）投薬ガイドを入手する。

ダクリズマブ注射を受けるリスクについて医師に相談してください。

## なぜこの薬が処方されているのですか？

ダクリズマブは、多発性硬化症（MS;神経が機能しない病気）の再発寛解型（症状が時々燃え上がる病気の経過）を持つ人々の症状のエピソードを防ぎ、障害の悪化を遅らせるために使用されます。適切に、そして人々は脱力感、しびれ、筋肉協調の喪失、そして視覚、発話、および膀胱制御の問題を経験するかもしれません）。ダクリズマブは通常、MSのための他の少なくとも2つの薬によって助けられなかった人々によって使用されます。ダクリズマブは、免疫調節剤と呼ばれる薬のクラスに含まれています。炎症を抑え、神経損傷を引き起こす可能性のある免疫細胞の作用を減らすことで機能すると考えられています。

## わあ、この薬を使うべきですか？

ダクリズマブは、皮下（皮膚の下）に注射するために、事前に充填された注射器の溶液（液体）として提供されます。通常、月に1回注射されます。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指示どおりにダクリズマブを使用してください。それを多かれ少なかれ使用したり、医師の処方よりも頻繁に使用したりしないでください。

あなたはあなたの医者のオフィスでダクリズマブの最初の投与量を受け取ります。その後、自分でダクリズマブを注射するか、友人や親戚に注射を行わせることができます。ダクリズマブを初めて使用する前に、付属の説明書をお読みください。医師または薬剤師に、あなたまたは薬を注射する人に注射方法を教えてもらいます。

ダクリズマブは、上腕の後ろ、胃の部分、または太ももに注射できます。炎症を起こした、傷ついた、赤くなった、感染した、傷ついた、または入れ墨のある皮膚に薬を注射しないでください。

薬の針や事前に充填された注射器を再利用したり共有したりしないでください。使用済みの注射器は、耐パンク性のある容器に捨ててください。耐パンク性容器の廃棄方法については、医師または薬剤師にご相談ください。

## この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

## 特別な注意事項に従う必要がありますか？

**ダクリズマブ注射を使用する前に、**

- ダクリズマブ、他の薬、またはダクリズマブ注射の成分のいずれかにアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては、薬剤師に尋ねるか、投薬ガイドを確認してください。
- あなたが服用している、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、およびハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。
- 結核にかかったことがあるか、結核にかかったことがあるか、または感染症にかかっているかどうかを医師に伝えてください。また、うつ病を患ったことがあるか、これまでに経験したことがあるか、または自殺を考えたり試みたりしたことがあるかどうかを医師に伝えてください。
- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。ダクリズマブの使用中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。
- ダクリズマブ注射を使用している間、あなたは落ち込んだり自殺したりする可能性があることを知っておく必要があります（自分自身を傷つけたり殺したりすることを考えたり、そうしようと計画したりしようとしていたりします）。あなた、あなたの家族、またはあなたの介護者は、次の症状のいずれかを経験した場合、すぐに医師に連絡する必要があります：新たなまたは悪化するうつ病、自分を傷つけたり人生を終わらせたいと話したり考えたりすること、または行動や気分のその他の異常な変化。自分で治療を求めることができない場合に医師に連絡できるように、家族や介護者がどの症状が深刻であるかを知っていることを確認してください。
- ダクリズマブによる治療中、または最終投与後4か月以内は、医師に相談せずにワクチン接種を受けないでください。

## 特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

## 服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

ダクリズマブの注射を忘れた場合は、覚えたらすぐに注射してください。ただし、1回分を飲んでから2週間以上経過している場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を注入しないでください。服用し忘れて、何をすべきかについて質問がある場合は、医師に連絡してください。

## この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

ダクリズマブ注射は副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- にきび
- 口の痛み

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状または重要な警告のセクションに記載されている症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡するか、緊急治療を受けてください。

- 発疹
- じんましん
- かゆみ
- 呼吸困難または嚥下困難
- 目、顔、口、舌、喉の腫れ
- 新規または悪化するうつ病
- 気分や行動の変化
- 自分を傷つけたり殺したりすることを考えたり、そうしようと計画したりしようとしたりする
- 鼻水、咳、喉の痛み、発熱、悪寒、その他の感染症の兆候
- 排尿困難
- 排尿時の痛み
- 発作

ダクリズマブは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

（<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]）または電話（1-800-332-1088）。

## この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入ったカートンに入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。ダクリズマブは冷蔵庫に保管しますが、冷凍しないでください。誤って薬を凍結した場合は、その注射器を廃棄する必要があります。ダクリズマブは室温で最大30日間保存できますが、光から保護する必要があります。ダクリズマブは、室温で保存した後は冷蔵庫に戻さないでください。

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、子供の手の届かないところにすべての薬を保管することが重要です。

幼児は簡単に開けることができます。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。 <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。 <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

## 他の情報を知っておく必要がありますか？

臨床検査を受ける前に、ダクリズマブ注射を使用していることを医師と検査官に伝えてください。

他の人にあなたの薬を服用させないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

## ランド名

- ジンブリタ®
- Zenapax®¶

¶-このブランドの製品はもう市場に出ていません。一般的な代替手段が利用できる場合があります。

最終改訂日-2018年4月15日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製商用利用はASHPの承認が必要です。

