



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Injeção de Daclizumabe

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616036.html>

Injeção de Daclizumabe

pronunciado como (da kliz' ue mab)

Perceber:

A injeção de daclizumabe não está mais disponível. Se você estiver usando daclizumabe, você deve ligar para o seu médico para discutir a mudança para outro tratamento.

AVISO IMPORTANTE:

Daclizumab pode causar danos hepáticos graves ou com risco de vida. O risco de danos no fígado pode ser aumentado em pessoas que tomam outros medicamentos conhecidos por causar danos ao fígado e em pessoas que já têm doença hepática. Informe o seu médico se tem ou já teve problemas de fígado ou hepatite. O seu médico pode dizer-lhe para não utilizar a injeção de daclizumab. Informe o seu médico e farmacêutico sobre todos os medicamentos que está a tomar para que possam verificar se algum dos seus medicamentos pode aumentar o risco de desenvolver danos no fígado durante o tratamento com daclizumab. O seu médico irá monitorizá-lo quanto a sinais de problemas hepáticos durante e durante 6 meses após o tratamento com daclizumab. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: náuseas, vômitos, cansaço extremo, hemorragias ou nódoas negras involuáres, falta de energia, perda de apetite,

Daclizumab pode causar distúrbios graves do sistema imunológico (condições que ocorrem quando o sistema imunológico ataca células saudáveis do corpo). Informe o seu médico se tem ou já teve problemas de pele, incluindo eczema ou psoríase. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: vermelhidão, comichão ou descamação da pele; glândulas inchadas no pescoço, axilas ou virilha; diarréia; fezes com sangue; dor de estômago; ou qualquer sintoma novo e inexplicável que afete qualquer parte do seu corpo.

Devido aos riscos com este medicamento, a injeção de daclizumabe está disponível apenas por meio de um programa especial de distribuição restrita. Um programa foi estabelecido pelo fabricante do daclizumab para garantir que as pessoas não usem a injeção de daclizumab sem o monitoramento necessário chamado Programa de Avaliação de Risco e Estratégias de Mitigação de Zinbryta (REMS). Seu médico e seu

farmacêutico deve estar registrado no programa Zinbryta REMS. Pergunte ao seu médico para obter mais informações sobre este programa e como você receberá sua medicação.

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns testes antes, durante e durante 6 meses após a sua dose final para verificar a resposta do seu organismo à injeção de daclizumab.

O seu médico ou farmacêutico fornecer-lhe-á o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) quando iniciar o tratamento com injeção de daclizumab e sempre que reabastecer a sua receita. Leia atentamente as informações e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você também pode visitar o site da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>]) para obter o Guia de Medicação.

Converse com seu médico sobre o(s) risco(s) de receber injeção de daclizumabe.

por que este medicamento é prescrito?

O daclizumab é utilizado para prevenir episódios de sintomas e retardar o agravamento da incapacidade em pessoas que têm formas recorrente-remitentes (curso da doença em que os sintomas surgem de tempos a tempos) de esclerose múltipla (EM; uma doença em que os nervos não funcionam adequadamente e as pessoas podem sentir fraqueza, dormência, perda de coordenação muscular e problemas de visão, fala e controle da bexiga). O daclizumab geralmente é usado por pessoas que não foram ajudadas por pelo menos dois outros medicamentos para esclerose múltipla. Daclizumab está em uma classe de medicamentos chamados imunomoduladores. Acredita-se que funcione diminuindo a inflamação e diminuindo a ação das células imunes que podem causar danos nos nervos.

como este medicamento deve ser usado?

Daclizumab vem como uma solução (líquido) em uma seringa pré-cheia para injetar por via subcutânea (sob a pele). Geralmente é injetado uma vez por mês. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Use daclizumabe exatamente como indicado. Não use mais ou menos dele ou use-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Você receberá sua primeira dose de daclizumabe no consultório do seu médico. Depois disso, você mesmo pode injetar daclizumabe ou pedir a um amigo ou parente que faça as injeções. Antes de usar daclizumabe pela primeira vez, leia as instruções escritas que o acompanham. Peça ao seu médico ou farmacêutico para mostrar a você ou à pessoa que irá injetar o medicamento como injetá-lo.

Você pode injetar daclizumabe na parte de trás dos braços, na área do estômago ou nas coxas. Não injete seu medicamento em pele irritada, machucada, avermelhada, infectada, com cicatrizes ou tatuada.

Nunca reutilize ou compartilhe agulhas ou seringas pré-cheias de medicamentos. Deite fora as seringas usadas num recipiente resistente a perfurações. Fale com o seu médico ou farmacêutico sobre como eliminar o recipiente resistente a perfurações.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de usar injeção de daclizumabe,

- informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao daclizumab, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes da injeção de daclizumab. Pergunte ao seu farmacêutico ou consulte o Guia de Medicação para obter uma lista dos ingredientes.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
- informe o seu médico se tem ou já teve tuberculose ou se tem uma infecção. Além disso, informe o seu médico se você tem ou já teve depressão ou se você já pensou ou tentou suicídio.
- informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto estiver a utilizar daclizumab, contacte o seu médico.
- você deve saber que pode ficar deprimido ou suicida (pensando em se machucar ou se matar ou planejar ou tentar fazê-lo) enquanto estiver usando a injeção de daclizumabe. Você, sua família ou seu cuidador devem ligar para o seu médico imediatamente se sentir algum dos seguintes sintomas: depressão nova ou agravada, falar ou pensar em querer se machucar ou acabar com sua vida ou qualquer outra mudança incomum de comportamento ou humor . Certifique-se de que sua família ou cuidador saiba quais sintomas podem ser graves para que eles possam ligar para o médico se você não puder procurar tratamento por conta própria.
- não tenha sido vacinado durante o tratamento com daclizumab ou até 4 meses após a última dose sem falar com o seu médico.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se você perder uma dose de injeção de daclizumabe, injete a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se forem mais de 2 semanas após a dose esquecida, pule a dose esquecida e continue com o esquema posológico regular. Não injete uma dose dupla para compensar uma dose esquecida. Ligue para o seu médico se você perder uma dose e tiver dúvidas sobre o que fazer.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A injeção de daclizumabe pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- acne
- dor na boca

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você tiver algum destes sintomas ou aqueles listados na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, e ligue para o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

- irritação na pele
- urticária
- coceira
- dificuldade em respirar ou engolir
- inchaço dos olhos, rosto, boca, língua ou garganta
- depressão nova ou agravada
- mudanças de humor ou comportamento
- pensando em se machucar ou se matar ou planejar ou tentar fazê-lo
- coriza, tosse, dor de garganta, febre, calafrios e outros sinais de infecção
- dificuldade em urinar
- dor ao urinar
- convulsões

Daclizumabe pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento na embalagem em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Guarde o daclizumab no frigorífico, mas não o congele. Se você congelar acidentalmente o medicamento, você deve descartar essa seringa. Daclizumabe pode ser mantido em temperatura ambiente por até 30 dias, mas deve ser protegido da luz. Daclizumabe não deve ser colocado de volta na geladeira após ter sido armazenado em temperatura ambiente.

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e

crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Antes de fazer qualquer teste laboratorial, informe o seu médico e o pessoal do laboratório que está a utilizar a injeção de daclizumab.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Zinbryta®
- Zenapax®¶

¶ -Este produto de marca não está mais no mercado. Alternativas genéricas podem estar disponíveis.

Última revisão - 15/04/2018

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS® Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

