



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[บ้าน](#) → [ยา สมุนไพรและอาหารเสริม](#) → [ดาคลิซูแมบฉีด](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616036.html>

การฉีด Daclizumab

ออกเสียงว่า (da kliz 'ue mab)

สังเกต:

ไม่มีการฉีด Daclizumab อีกต่อไป หากคุณกำลังใช้ดาคลิซูแมบ คุณควรโทรหาแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่องการเปลี่ยนไปใช้การรักษาอื่น

คำเตือนที่สำคัญ:

Daclizumab อาจทำให้ตับถูกทำลายอย่างร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต ความเสี่ยงของความเสียหายของตับอาจเพิ่มขึ้นในผู้ที่ทานยาอื่นๆ ที่ทราบว่าทำให้ตับถูกทำลาย และในผู้ที่เป็นโรคตับอยู่แล้ว แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือโรคตับอักเสบ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใช้การฉีดดาคลิซูแมบ แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้อยู่ เพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบว่ายาใด ๆ ของคุณอาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเกิดความเสียหายของตับระหว่างการรักษาด้วยดาคลิซูแมบ แพทย์ของคุณจะตรวจสอบสัญญาณของปัญหาตับในระหว่างและเป็นเวลา 6 เดือนหลังการรักษาด้วยดาคลิซูแมบ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: คลื่นไส้, อาเจียน, เหนื่อยล้ามาก, มีเลือดออกหรือรอยฟกช้ำผิดปกติ, ขาดพลังงาน, เบื่ออาหาร,

Daclizumab อาจทำให้เกิดความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันอย่างร้ายแรง (เงื่อนไขที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันโจมตีเซลล์ที่มีสุขภาพดีในร่างกาย) แจ้งแพทย์หากคุณมีหรือเคยมีปัญหาผิวหนัง รวมทั้งกลากหรือโรคสะเก็ดเงิน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: รอยแดง อาการคัน หรือการปรับขนาดของผิวหนัง ต่อมบวมที่คอ รักแร้ หรือขาหนีบ; ท้องเสีย; อุจจาระเป็นเลือด อาการปวดท้อง; หรืออาการใหม่ที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณ

เนื่องจากความเสี่ยงของยานี้ การฉีด daclizumab สามารถใช้ได้ผ่านโปรแกรมการแจกจ่ายแบบจำกัดพิเศษเท่านั้น ผู้ผลิต daclizumab ได้จัดตั้งโปรแกรมขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนไม่ได้ใช้การฉีด daclizumab หากไม่มีการตรวจสอบที่จำเป็นซึ่งเรียกว่าโปรแกรม Zinbryta Risk Evaluation and Mitigation Strategies (REMS) แพทย์ของคุณและของคุณ

เภสัชกรต้องลงทะเบียนกับโปรแกรม Zinbryta REMS สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้และวิธีที่คุณจะได้รับยาจากแพทย์

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างก่อน ระหว่าง และเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากที่คุณให้ยาครั้งสุดท้าย เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายต่อการฉีดดาคิลิซูแมบ

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยการฉีดดาคิลิซูแมบ และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคำถามใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>]) เพื่อรับคู่มือการใช้ยา

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีดดาคิลิซูแมบ

hy เป็นยานี้กำหนด?

Daclizumab ใช้เพื่อป้องกันอาการและชะลอความทุพพลภาพในผู้ที่มียูรูปแบบการกำเริบของโรค (โรคที่อาการลุกลามเป็นไฟเป็นครั้งคราว) ของเส้นโลหิตตีบหลายเส้น (MS; โรคที่เส้นประสาทไม่ทำงาน อย่างถูกต้องและคนอาจมีอาการอ่อนแรง ชา สูญเสียการประสานงานของกล้ามเนื้อ และปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น การพูด และการควบคุมกระเพาะปัสสาวะ) Daclizumab มักใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากยาอื่น ๆ สำหรับ MS อย่างน้อยสองยา Daclizumab อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า immunomodulators เชื่อกันว่าทำงานโดยลดการอักเสบและลดการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันที่อาจทำให้เส้นประสาทถูกทำลาย

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Daclizumab มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) ในหลอดฉีดยาที่เติมไว้ล่วงหน้าเพื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) มักจะฉีดเดือนละครั้ง ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ daclizumab ตามที่กำหนด อย่าใช้มากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

คุณจะได้รับ daclizumab ครั้งแรกในสำนักงานแพทย์ของคุณ หลังจากนั้นคุณสามารถฉีด daclizumab ด้วยตัวคุณเอง หรือให้เพื่อนหรือญาติทำการฉีด ก่อนที่คุณจะใช้ daclizumab ด้วยตัวเองในครั้งแรก ให้อ่านคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มาพร้อมกับมัน ขอให้แพทย์หรือเภสัชกรแสดงให้คุณเห็นหรือบุคคลที่จะฉีดยาเกี่ยวกับวิธีการฉีดยา

คุณสามารถฉีดดาคิลิซูแมบที่หลังต้นแขน บริเวณท้อง หรือต้นขาได้ ห้ามฉีดยาเข้าสู่ผิวหนังที่ระคายเคือง ฟกช้ำ แดง ตึง เชื้อ มีรอยแผลเป็นหรือรอยสัก

ห้ามใช้ชาหรือแบ่งปันเข็มฉีดยาหรือหลอดฉีดยาที่บรรจุยาไว้ล่วงหน้า ทั้งกระบอกฉีดยาที่ใช้แล้วลงในภาชนะที่ทนต่อการเจาะ พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับวิธีการทิ้งภาชนะที่ทนต่อการเจาะ

ใช้สำหรับยา

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้ใช้อื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันทควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้การฉีดดาคิลิซูแมบ

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาดาคิลิซูแมบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดดาคิลิซูแมบ สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา
- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นวัณโรค หรือเคยติดเชื้อมาก่อน นอกจากนี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีหรือเคยเป็นโรคซึมเศร้า หรือเคยคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ดาคิลิซูแมบ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ
- คุณควรรู้ว่าคุณอาจเป็นโรคซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตาย (กำลังคิดที่จะทำร้ายหรือฆ่าตัวตาย หรือวางแผนหรือพยายามทำเช่นนั้น) ขณะที่กำลังใช้ยาฉีด Daclizumab คุณ ครอบครัว หรือผู้ดูแลของคุณควรโทรหาแพทย์ทันที หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้: ภาวะซึมเศร้าใหม่หรือแย่ลง พวดุ๋ยหรือคิดเกี่ยวกับต้องการทำร้ายตัวเองหรือจบชีวิตของคุณ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ผิดปกติอื่นๆ . ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบครัวหรือผู้ดูแลของคุณรู้ว่าอาการใดที่อาจร้ายแรงเพื่อให้พวกเขาสามารถโทรหาแพทย์ได้หากคุณไม่สามารถหาการรักษาด้วยตนเองได้
- ห้ามฉีดวัคซีนใดๆ ระหว่างการรักษาด้วยดาคิลิซูแมบ หรือไม่เกิน 4 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้ายโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ฉันทควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันทควรทำอย่างไรถ้าฉันทลืมนยา?

หากคุณพลาดการฉีดดาคิลิซูแมบ ให้ฉีดยาที่ไม่ได้รับทันทีที่ทำได้ อย่างไรก็ตาม หากผ่านไปนานกว่า 2 สัปดาห์หลังจากที่คุณลืมนรับประทานยา ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมนไปและดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าฉีดยาสองครั้งเพื่อชดเชยการไม่ได้รับยา โทรหาแพทย์หากคุณพลาดการทานยาและมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานีสามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

การฉีด Daclizumab อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- ลิว
- ปวดปาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคำเตือนที่สำคัญ และโทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษายาบาลฉุกเฉิน:

- ไข้
- ลมพิษ
- อาการคัน
- หายใจลำบากหรือกลืนลำบาก
- บวมที่ตา ใบหน้า ปาก ลิ้น หรือคอ
- ภาวะซึมเศร้าใหม่หรือเลวลง
- การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือพฤติกรรม
- คิดทำร้ายหรือฆ่าตัวตาย หรือวางแผนหรือพยายามทำ
- น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ
- ปัสสาวะลำบาก
- ปวดเมื่อปัสสาวะ
- อาการชัก

Daclizumab อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาคิดผิดปกติ ใดๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

หมวก ฉันทควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยา?

เก็บยานี้ในกล่องที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บ daclizumab ไว้ในตู้เย็น แต่อย่าแช่แข็ง หากคุณหยุดยาโดยไม่ตั้งใจ คุณควรทิ้งกระบอกฉีดยานี้ Daclizumab อาจเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นานถึง 30 วัน แต่ควรได้รับการปกป้องจากแสง ไม่ควรใส่ Daclizumab กลับเข้าไปในตู้เย็นหลังจากที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานีกลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภษานะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ดีต่อเด็กและ

เด็กเล็กสามารถเปิดได้อย่างง่ายดาย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ลือคฝาคอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึง<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ก กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่<https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวดข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

ก่อนทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการว่าคุณกำลังใช้ยาฉีด Daclizumab

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่คุณไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแบรนด์

- ซินบรีตา®
- Zenapax®

ๆ-สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 04/15/2018

[เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ขอจำกัดความรับผิดชอบ](#)

AHFS® ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ © ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเธสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ

สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022

