



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 达珠单抗注射液

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616036.html>

## 达珠单抗注射液

发音为 (da kliz' ue mab)

### 注意:

达珠单抗注射液不再可用。如果您目前正在使用 daclizumab，您应该致电您的医生讨论改用另一种治疗方法。

### 重要警告:

达珠单抗可能会导致严重或危及生命的肝损伤。服用其他已知会导致肝损伤的药物的人，以及已经患有肝病的人，肝损伤的风险可能会增加。如果您有或曾经有过肝脏问题或肝炎，请告诉您的医生。您的医生可能会告诉您不要使用达珠单抗注射液。告诉您的医生和药剂师您正在服用的所有药物，以便他们检查您的任何药物是否会增加您在接受达珠单抗治疗期间发生肝损伤的风险。您的医生将在您接受达珠单抗治疗期间和治疗后的 6 个月内监测您是否有肝脏问题的迹象。如果您出现以下任何症状，请立即就医：恶心、呕吐、极度疲倦、异常出血或瘀伤、精力不足、食欲不振、

Daclizumab 可能导致严重的免疫系统疾病（免疫系统攻击体内健康细胞时发生的情况）。如果您有或曾经有过皮肤问题，包括湿疹或牛皮癣，请告诉您的医生。如果您出现以下任何症状，请立即就医：皮肤发红、瘙痒或脱屑；颈部、腋窝或腹股沟的腺体肿胀；腹泻；血便；肚子痛；或影响您身体任何部位的任何新的、无法解释的症状。

由于这种药物的风险，daclizumab 注射液只能通过特殊的受限分销计划获得。daclizumab 的制造商已经制定了一项计划，以确保人们在没有必要监测的情况下不会使用 daclizumab 注射液，称为 Zinbryta 风险评估和缓解策略 (REMS) 计划。你的医生和你的

药剂师必须在 Zinbryta REMS 计划中注册。向您的医生咨询有关该计划以及您将如何接受药物的更多信息。

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生会在您最后一次给药之前、期间和之后的 6 个月内下令进行某些测试，以检查您的身体对达珠单抗注射液的反应。

当您开始使用 daclizumab 注射剂进行治疗以及每次重新配药时，您的医生或药剂师都会给您制造商的患者信息表（药物指南）。仔细阅读信息，如有任何问题，请咨询您的医生或药剂师。您也可以访问美国食品和药物管理局 (FDA) 网站

(<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>]) 获取用药指南。

与您的医生讨论接受 daclizumab 注射的风险。

## 为什么要开这种药？

Daclizumab 用于预防多发性硬化症 (MS；一种神经功能不全的疾病) 复发缓解型 (症状不时发作的病程) 患者的症状发作并减缓残疾恶化人可能会出现虚弱、麻木、肌肉协调丧失以及视力、语言和膀胱控制问题)。Daclizumab 通常用于那些没有得到至少两种其他 MS 药物帮助的人。Daclizumab 属于一类称为免疫调节剂的药物。它被认为通过减少炎症和减少可能导致神经损伤的免疫细胞的作用而起作用。

## 这个药应该怎么用？

Daclizumab 以溶液 (液体) 形式存在于预装注射器中，用于皮下 (皮下) 注射。它通常每月注射一次。仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示使用达珠单抗。不要使用或多或少地使用它，或者使用它比医生规定的更频繁。

您将在您的医生办公室接受您的第一剂 daclizumab。之后，您可以自己注射 daclizumab 或让朋友或亲戚进行注射。在您自己第一次使用 daclizumab 之前，请阅读随附的书面说明。请您的医生或药剂师向您或将要注射药物的人展示如何注射药物。

您可以在上臂后部、胃部或大腿注射达珠单抗。不要将药物注射到受刺激、瘀伤、发红、感染、疤痕或纹身的皮肤中。

切勿重复使用或共用针头或预装药物注射器。将用过的注射器丢弃在防刺穿容器中。与您的医生或药剂师讨论如何处置耐穿刺容器。

## 该药的其他用途

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

## 我应该遵循什么特殊的预防措施？

**在使用达珠单抗注射液之前，**

- 如果您对达珠单抗、任何其他药物或达珠单抗注射液中的任何成分过敏，请告诉您的医生和药剂师。请咨询您的药剂师或查看药物指南以获取成分列表。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。
- 如果您患有或曾经患有肺结核或感染，请告诉您的医生。此外，告诉您的医生您是否患有或曾经患有抑郁症，或者您是否曾想过或企图自杀。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。如果您在使用 daclizumab 时怀孕，请致电您的医生。
- 您应该知道，当您使用达珠单抗注射液时，您可能会变得抑郁或有自杀倾向（考虑伤害或自杀或计划或试图这样做）。如果您出现以下任何症状，您、您的家人或您的护理人员应立即致电您的医生：新的或恶化的抑郁症、谈论或考虑想要伤害自己或结束生命，或任何其他不寻常的行为或情绪变化。确保您的家人或护理人员知道哪些症状可能很严重，这样如果您无法自行寻求治疗，他们可以打电话给医生。
- 在您使用达珠单抗治疗期间或在最终剂量后最多 4 个月内不与您的医生交谈，不要接种任何疫苗。

## 我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

## 如果我忘记服药该怎么办？

如果您错过了一剂达珠单抗注射液，请在记住时立即注射您错过的剂量。但是，如果您错过的剂量超过 2 周，请跳过错过的剂量并继续您的常规给药计划。不要注射双倍剂量以弥补错过的剂量。如果您错过剂量并且对该怎么做有疑问，请致电您的医生。

## 这种药物会引起副作用吗？

**达珠单抗注射液可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：**

- 粉刺
- 嘴巴痛

**一些副作用可能很严重。如果您遇到任何这些症状或“重要警告”部分中列出的症状，请立即致电您的医生或接受紧急医疗：**

- 皮疹
- 麻疹
- 瘙痒
- 呼吸或吞咽困难
- 眼睛、面部、嘴巴、舌头或喉咙肿胀
- 新的或恶化的抑郁症
- 情绪或行为的变化
- 考虑伤害或杀死自己或计划或试图这样做
- 流鼻涕、咳嗽、喉咙痛、发烧、发冷和其他感染迹象
- 排尿困难
- 小便时疼痛
- 癫痫发作

达珠单抗可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

## 我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的纸箱中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将达珠单抗储存在冰箱中，但不要冷冻。如果您不小心冻结了药物，您应该丢弃该注射器。Daclizumab 可在室温下保存长达 30 天，但应避光。达珠单抗在室温下储存后不应放回冰箱。

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站 (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

将所有药物放在儿童看不到和拿不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周药丸管理器和用于滴眼液、乳膏、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，并且

年幼的孩子可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒，请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

## 我应该知道其他信息吗？

在进行任何实验室测试之前，请告诉您的医生和实验室人员您正在使用达珠单抗注射液。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

## 兰特名称

- 辛布里塔®
- 泽纳帕克斯®¶

¶ -该品牌产品已不再上市。可能有通用的替代品。

最后修订 - 2018 年 4 月 15 日

[了解如何引用此页面](#)



### [美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®，4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

