

[家 → 薬、ハーブ、サプリメント → ダナゾール](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682599.html>

ダナゾール

(da'na zole) と発音します

重要な警告：

ダナゾールは、妊娠中または妊娠する可能性のある女性が服用してはなりません。ダナゾールは胎児に害を及ぼす可能性があります。この薬を服用し始める前に、妊娠検査が陰性である必要があります。あなたが妊娠していないことを確認するためにあなたの月経周期の間にこの薬を服用し始めてください。治療中は効果的な避妊を行ってください。ダナゾールはホルモン避妊薬（避妊薬、パッチ、リング、インプラント、または注射）の効果を低下させる可能性があるため、治療中の避妊の唯一の方法としてこれらを使用しないでください。また、避妊のバリア方式（コンドームやペッサリーなどの精子が子宮に入るのを防ぐ装置）を使用する必要があります。あなたがあなたのために働く避妊の方法を選ぶのを手伝うようにあなたの医者に頼んでください。ダナゾールを服用中に妊娠した場合は、すぐに医師に連絡してください。

ダナゾールは、心臓発作や脳卒中を引き起こす可能性のある、腕、脚、肺、心臓、脳に血栓が発生するリスクを高める可能性があります。血栓があったか、またはあったことがあるかどうかを医師に伝えてください。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。足が温かい、赤くなる、腫れている、または柔らかい。話すことや理解することの問題; 顔面、腕または脚の麻痺またはしびれ; 突然の激しい頭痛; 視力の突然の変化、視力のぼやけまたは黒化、または複視。

ダナゾールは、ダナゾールを長期間服用している人に腹部出血を伴う肝臓障害を引き起こす可能性があります。肝疾患を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください：皮膚や目の黄変、胃の部分の痛み、極度の倦怠感、異常な出血やあざ。

ダナゾールは頭蓋骨内の体液の圧力を上昇させる可能性があります。次の症状のいずれかが発生した場合は、ダナゾールの服用を中止し、すぐに医師に連絡してください：頭痛、吐き気、嘔吐、または視力の問題。

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。医師は、ダナゾールに対する体の反応を確認するために、治療前および治療中に特定の臨床検査を命じることがあります。

ダナゾールを服用するリスクについて医師に相談してください。

なぜこの薬が処方されているのですか？

ダナゾールは、子宮内膜症（子宮[子宮]を裏打ちする組織のタイプが体の他の領域で成長し、不妊症、月経前および月経中の痛み、性的活動中および後の痛み、および重度または不規則な出血）..ダナゾールは、他の治療法が成功しない場合に、線維嚢胞性乳房疾患（腫れ、非癌性のしこりを伴う柔らかい乳房）の治療にも使用されます。ダナゾールは、遺伝性血管性浮腫（手、足、顔、気道、または腸の腫れのエピソードを引き起こす遺伝性疾患）のある人の発作を防ぐためにも使用されます。ダナゾールはアンドロゲンホルモンと呼ばれる薬のクラスにあります。それは子宮の変位した組織を収縮させることによって子宮内膜症を治療するために働きます。乳房の痛みやしこりの原因となるホルモンの放出をブロックすることにより、乳腺線維嚢胞症の治療に効果があります。体内の天然物質の量を増やすことにより、遺伝性血管性浮腫の治療に効果があります。

わあ、この薬を使うべきですか？

ダナゾールは、経口摂取用のカプセルとして提供されます。通常、子宮内膜症や乳腺線維嚢胞症の場合は1日2回、遺伝性血管性浮腫の場合は1日2〜3回服用します。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指示通りにダナゾールを服用してください。多かれ少なかれ服用したり、医師の処方よりも頻繁に服用したりしないでください。

医師に相談せずにダナゾールの服用をやめないでください。乳腺線維嚢胞症の場合、乳房の痛みと圧痛は通常、ダナゾールを服用した最初の1か月で改善し、2〜3か月の治療後に消えます。乳房のしこりは、治療の4〜6か月後に改善するはずですが。

この薬の用途

ダナゾールは、特発性血小板減少性紫斑病（ITP、血小板数が異常に少ないためにあざができやすい、または出血しやすい状態）の治療にも使用されることがあります。あなたの状態のためにこの薬を使用することのリスクについてあなたの医者に相談してください。

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

ダンザオルを取る前に、

- ダナゾール、他の薬、またはダナゾールカプセルの成分にアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。
- 医師と薬剤師に、処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、および服用中または服用予定のハーブ製品を伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください：ワルファリン（クマディン、ヤントーベン）、アトルバスタチン（リピトール、カデュエット）、カルバマゼピン（カルバマゼピン、エクエトロ、テグレートール、その他）、シクロスポリン（ゲングラフィ、ネオラル、Sandimmune）、インスリン、ロバスタチン（Altoprev）、シンバスタチン（Zocor, Vytorin）、またはタクロリムス（Astagraf, Prograf）などの糖尿病治療薬。あなたの医師はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。
- ポルフィリン症（皮膚や神経系の問題を引き起こす可能性のある遺伝性の血液疾患）があるかどうかを医師に伝えてください。原因不明の腫からの出血；癌；または心臓や腎臓の病気。あなたの医師は

おそらくダナゾールを服用しないようにあなたに言うでしょう。

- 母乳育児をしている場合は医師に相談してください。ダナゾールによる治療中は授乳しないでください。
- 片頭痛があるか、または片頭痛があったことがあるかどうかを医師に伝えてください。てんかん（発作）、糖尿病; 副甲状腺機能低下症（体が十分な副甲状腺ホルモンを産生しない状態）; 高血圧; または任意の血液障害。

服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服用時間になっている場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

ダナゾールは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- にきび
- 胸のサイズの減少
- 体重の増加
- 脂性肌や髪
- フラッシング
- 発汗
- 膣の乾燥、灼熱感、かゆみ、または出血
- 緊張感
- 過敏性
- 月経周期の欠如、スポッティング、または月経周期の変化

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状または重要な警告のセクションに記載されている症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- 声の深まり、嗄声、喉の痛み、顔の毛の増加、はげ、または腕や脚の腫れ（女性の場合）
- 皮膚の赤み、はがれ、または水ぶくれ

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

（（<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]）または電話（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。室温で、光や過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門にお問い合わせください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。 <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。 <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

他の情報を知っておく必要がありますか？

臨床検査を受ける前に、ダナゾールを服用していることを医師と検査官に伝えてください。

他の人にあなたの薬を服用させないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- ダナゾール®[¶]

[¶]このブランドの製品はもう市場に出ていません。一般的な代替手段が利用できる場合があります。

最終改訂日-2017年5月24日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc.免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日