

[집](#) → [약물, 허브 및 보조제](#) → [다나졸](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

이 페이지의 URL: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682599.html>

## 다나졸

(da' na zole)로 발음

### 중요 경고:

임신 중이거나 임신할 수 있는 여성은 다나졸을 복용해서는 안 됩니다. Danazol은 태아를 해칠 수 있습니다. 이 약을 복용하기 전에 임신 테스트에서 음성이 나와야 합니다. 임신이 아닌지 확인하기 위해 월경 주기 동안 이 약을 복용하기 시작하십시오. 치료하는 동안 효과적인 피임법을 사용하십시오. Danazol은 호르몬 피임약(피임약, 패치, 링, 임플란트 또는 주사제)의 효과를 감소시킬 수 있으므로 치료 중 이러한 피임법을 유일한 피임 방법으로 사용해서는 안 됩니다. 또한 장벽 피임법(콘돔이나 횡격막과 같이 정자가 자궁으로 들어가는 것을 차단하는 장치)을 사용해야 합니다. 의사에게 자신에게 맞는 피임 방법을 선택하는 데 도움을 요청하십시오. danazol을 복용하는 동안 임신하면 즉시 의사에게 연락하십시오.

Danazol은 심장 마비 또는 뇌졸중을 유발할 수 있는 팔, 다리, 폐, 심장 및 뇌에 혈전이 발생할 위험을 증가시킬 수 있습니다. 혈전이 있거나 있었던 적이 있는지 의사에게 알려십시오. 다음과 같은 증상이 나타나면 즉시 의사의 진찰을 받으십시오. 다리가 따뜻하거나, 붉어지거나, 부어 오르거나, 압통이 있습니다. 말하거나 이해하는 데 문제가 있음; 얼굴, 팔 또는 다리의 마비 또는 마비; 갑자기 심한 두통; 시력의 급격한 변화, 시야가 흐리거나 검게 보이거나 이중으로 보입니다.

다나졸은 장기간 다나졸을 복용하는 사람들에게 복부 출혈과 함께 간 손상을 일으킬 수 있습니다. 간 질환이 있거나 있었던 적이 있는 경우 의사에게 알려십시오. 다음과 같은 증상이 나타나면 즉시 의사의 진찰을 받으십시오. 피부나 눈의 황변, 위장 통증, 극심한 피로감, 비정상적인 출혈 또는 타박상.

Danazol은 두개골 내부 체액의 압력을 증가시킬 수 있습니다. 두통, 메스꺼움, 구토 또는 시력 문제와 같은 증상이 나타나면 다나졸 복용을 중단하고 즉시 의사에게 연락하십시오.

의사 및 검사실과의 모든 약속을 지키십시오. 의사는 danazol에 대한 신체의 반응을 확인하기 위해 치료 전과 치료 중에 특정 실험실 검사를 지시할 수 있습니다.

danazol 복용의 위험에 대해 의사와 상담하십시오.

## 이 약이 처방된 이유는 무엇입니까?

Danazol은 자궁내막증(자궁[자궁]을 둘러싸고 있는 조직 유형이 신체의 다른 부위에서 자라서 불임을 유발하는 상태, 월경 기간 전후의 통증, 성행위 중 및 후의 통증, 과체중 또는 불규칙한 출혈)..Danazol은 또한 다른 치료가 성공하지 못한 경우 섬유낭포성 유방 질환(비암성 덩어리가 있는 부기, 부드러운 유방)을 치료하는 데 사용됩니다. Danazol은 또한 유전성 혈관부종(손, 발, 얼굴, 기도 또는 장의 부종 에피소드를 유발하는 유전 상태)이 있는 사람의 공격을 예방하는 데 사용됩니다. Danazol은 안드로겐 호르몬이라고 불리는 약물 종류에 속합니다. 변위된 자궁 조직을 수축시켜 자궁내막증을 치료하는 데 효과가 있습니다. 유방 통증과 덩어리를 유발하는 호르몬의 방출을 차단하여 섬유낭포성 유방 질환을 치료하는 데 효과가 있습니다. 체내의 천연 물질의 양을 증가시켜 유전성 혈관부종을 치료하는 작용을 합니다.

## 이 약을 사용해야 하나요?

Danazol은 입으로 복용하는 캡슐로 제공됩니다. 일반적으로 자궁내막증이나 섬유낭포성 유방 질환의 경우 하루에 두 번, 유전성 혈관부종의 경우 하루에 두 세 번 복용합니다. 처방전 라벨의 지시 사항을 주의 깊게 따르고 의사나 약사에게 이해되지 않는 부분에 대한 설명을 요청하십시오. 지시대로 정확하게 다나졸을 복용하십시오. 의사가 처방한 것보다 많거나 적게 복용하거나 더 자주 복용하지 마십시오.

의사와 상의하지 않고 다나졸 복용을 중단하지 마십시오. 섬유낭포성 유방 질환이 있는 경우 유방 통증과 압통은 일반적으로 danazol을 복용하고 2-3개월 치료 후 사라지는 첫 달 동안 개선됩니다. 유방 덩어리는 치료 4~6개월 후에 개선되어야 합니다.

## 이 약의 용도

Danazol은 또한 특발성 혈소판 감소성 자반병(ITP, 혈액 내 혈소판 수가 비정상적으로 낮아 쉽게 멍이나 출혈을 일으킬 수 있는 진행 중인 상태)을 치료하는 데 사용되기도 합니다. 귀하의 상태에 이 약을 사용할 때의 위험에 대해 의사와 상담하십시오.

이 약은 다른 용도로 처방될 수 있습니다. 자세한 내용은 의사나 약사에게 문의하십시오.

## 모자 특별 예방 조치를 따라야 하나요?

### 단자울을 복용하기 전,

- danazol, 다른 약물 또는 danazol 캡슐의 성분에 알레르기가 있는 경우 의사와 약사에게 알려십시오. 성분 목록은 약사에게 문의하십시오.
- 의사와 약사에게 귀하가 복용 중이거나 복용할 예정인 처방 및 비처방 약물, 비타민, 영양 보조제, 약초 제품에 대해 알려십시오. 와파린(Coumadin, Jantoven), 아토르바스타틴(Lipitor, in Caduet), 카르바마제핀(Carbatrol, Equetro, Tegretol 등), 사이클로스포린(Gengraf, Neoral, Sandimmune), 인슐린, 로바스타틴(Altoprev), 심바스타틴(Zocor, in Vytorin) 또는 타크로리무스(Astagraf, Prograf)와 같은 당뇨병 치료제. 의사는 약물의 복용량을 변경하거나 부작용에 대해 주의 깊게 모니터링해야 할 수도 있습니다.
- 포르피린증(피부 또는 신경계 문제를 일으킬 수 있는 유전성 혈액 질환)이 있는지 의사에게 알려십시오. 설명할 수 없는 질 출혈; 암; 또는 심장 또는 신장 질환. 의사는

아마도 danazol을 복용하지 말라고 말할 것입니다.

- 모유 수유 중인지 의사에게 알려주세요. 다나졸로 치료하는 동안 모유 수유를 하지 마십시오.
- 편두통이 있거나 있었던 적이 있는지 의사에게 알려주세요. 간질(발작), 당뇨병; 부갑상선 기능 저하증(신체가 충분한 부갑상선 호르몬을 생성하지 못하는 상태); 고혈압; 또는 모든 혈액 장애.

## 복용량을 잊은 경우 모자를 써야 하나요?

놓친 복용량을 기억하는 즉시 복용하십시오. 그러나 다음 복용 시간이 거의 다 되었다면 놓친 복용량을 건너뛰고 정기적인 복용 일정을 계속하십시오. 놓친 것을 보충하기 위해 두 번 복용하지 마십시오.

## 모자 부작용이 약물이 일으킬 수 있습니까?

다나졸은 부작용을 일으킬 수 있습니다. 다음 증상 중 하나라도 심각하거나 사라지지 않으면 의사에게 알려주세요.

- 좌창
- 유방 크기 감소
- 살찌 다
- 지성 피부 또는 머리카락
- 홍조
- 발한
- 질 건조, 작열감, 가려움증 또는 출혈
- 신경질
- 짜증
- 월경 주기의 부재, 반점 또는 월경 주기의 변화

일부 부작용은 심각할 수 있습니다. 이러한 증상이나 중요 경고 섹션에 나열된 증상이 나타나면 즉시 의사에게 연락하십시오.

- 목소리의 깊어짐, 쉼 목소리, 인후통, 수염 증가, 대머리 또는 팔이나 다리의 부기(여성의 경우)
- 붉어지거나 벗겨지거나 물집이 생기는 피부

심각한 부작용이 발생하는 경우 귀하 또는 담당 의사가 온라인으로 FDA(Food and Drug Administration)의 MedWatch 유해 사례 보고 프로그램에 보고서를 보낼 수 있습니다.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 또는 전화 (1-800-332-1088).

## 이 약의 보관 및 폐기에 대해 알아야 하나요?

이 약은 들어 있던 용기에 단단히 밀봉하여 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 실온에서 보관하고 빛과 과도한 열과 습기를 피해 보관하십시오(화장실이 아님).

불필요한 약은 애완동물, 어린이 및 다른 사람이 섭취할 수 없도록 특별한 방법으로 폐기해야 합니다. 그러나 이 약을 변기에 버리면 안 됩니다. 대신, 약물을 폐기하는 가장 좋은 방법은 약물 회수 프로그램을 이용하는 것입니다. 약사와 상담하거나 지역 쓰레기/재활용 부서에 연락하여 지역 사회의 수거 프로그램에 대해 알아보십시오. FDA의 의약품 안전 폐기 웹사이트(<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 회수 프로그램에 대한 액세스 권한이 없는 경우 자세한 내용을 참조하십시오.

많은 용기(주간 알약 보관함 및 안약, 크림, 패치, 흡입기용 용기 등)는 어린이에게 내성이 없고 어린이가 쉽게 열 수 있으므로 모든 약을 어린이의 눈에 띄고 손이 닿지 않는 곳에 두는 것이 중요합니다. 어린 아이들을 중독으로부터 보호하려면 항상 안전 캡을 잠그고 즉시 약을 안전한 장소에 두십시오.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## n 응급/과다복용의 경우

과다 복용의 경우 독극물 관리 헬프라인 1-800-222-1222로 전화하십시오. 정보는 온라인으로도 제공됩니다.<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. 피해자가 쓰러졌거나, 발작을 일으켰거나, 호흡 곤란을 겪거나, 깨어나지 못하면 즉시 911로 응급 서비스에 전화하십시오.

## 모자 다른 정보를 알아야합니까?

실험실 검사를 받기 전에 의사와 실험실 직원에게 danazol을 복용하고 있음을 알려십시오.

다른 사람이 귀하의 약을 복용하게 하지 마십시오. 처방전을 다시 조제하는 것과 관련하여 궁금한 사항은 약사에게 문의하십시오.

귀하가 복용하고 있는 모든 처방약 및 비처방약(일반의약품)은 물론 비타민, 미네랄 또는 기타 식이 보조제와 같은 제품의 목록을 작성하는 것이 중요합니다. 의사를 방문하거나 병원에 입원할 때마다 이 목록을 지참해야 합니다. 비상시에 휴대하는 것도 중요한 정보입니다.

## 랜드 이름

- 단분비®¶

¶ .이 브랜드 제품은 더 이상 시장에 없습니다. 일반적인 대안을 사용할 수 있습니다.

최종 수정 - 2017년 5월 24일

[이 페이지를 인용하는 방법 알아보기](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 면책 조항](#)

AHFS®환자 투약 정보™. © 저작권, 2022. 미국 건강 시스템 약사 협회®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. 판권 소유. 복사

상업적 사용을 위해서는 ASHP의 승인을 받아야 합니다.

---

국립 의학 도서관 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 미국 보건 복지부

국립 보건원

페이지 마지막 업데이트: 2022년 3월 25일