

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Danazol

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682599.html>

Danazol

pronunciado como (da' na zole)

AVISO IMPORTANTE:

Danazol não deve ser tomado por mulheres grávidas ou que possam engravidar. Danazol pode prejudicar o feto. Você precisará ter um teste de gravidez negativo antes de começar a tomar este medicamento. Comece a tomar este medicamento durante o seu ciclo menstrual para ter certeza de que não está grávida. Use controle de natalidade eficaz durante o tratamento. Danazol pode diminuir a eficácia dos contraceptivos hormonais (pílulas anticoncepcionais, adesivos, anéis, implantes ou injeções), portanto você não deve usá-los como seu único método contraceptivo durante o tratamento. Você também deve usar um método de barreira de controle de natalidade (dispositivo que bloqueia o esperma de entrar no útero, como um preservativo ou um diafragma). Peça ao seu médico para ajudá-lo a escolher um método de controle de natalidade que funcione para você. Se engravidar enquanto estiver a tomar danazol, contacte o seu médico imediatamente.

Danazol pode aumentar o risco de desenvolver um coágulo sanguíneo nos braços, pernas, pulmões, coração e cérebro que pode causar um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral. Informe o seu médico se você tem ou já teve um coágulo sanguíneo. Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente: perna quente, vermelha, inchada ou sensível; dificuldade para falar ou entender; paralisia ou dormência na face, braço ou perna; dor de cabeça súbita e intensa; mudanças repentinas na visão, visão turva ou enegrecida, ou visão dupla.

Danazol pode causar danos ao fígado com sangramento abdominal em pessoas que tomam danazol por um longo tempo. Informe o seu médico se tem ou já teve doença hepática. Se sentir algum dos seguintes sintomas contacte o seu médico imediatamente: amarelecimento da pele ou dos olhos, dor na zona do estômago, cansaço extremo ou hemorragias ou nódoas negras involuáres.

Danazol pode causar aumento da pressão do fluido dentro do crânio. Se sentir algum dos seguintes sintomas, pare de tomar danazol e contacte o seu médico imediatamente: dor de cabeça, náuseas, vômitos ou problemas de visão.

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Seu médico pode solicitar alguns exames laboratoriais antes e durante o tratamento para verificar a resposta do seu corpo ao danazol.

Converse com seu médico sobre os riscos de tomar danazol.

por que este medicamento é prescrito?

Danazol é usado para tratar a endometriose (uma condição na qual o tipo de tecido que reveste o útero cresce em outras áreas do corpo e causa infertilidade, dor antes e durante os períodos menstruais, dor durante e após a atividade sexual e dor intensa ou sangramento irregular). Danazol também é usado para tratar a doença fibrocística da mama (seios inchados, sensíveis com nódulos não cancerosos) quando outros tratamentos não são bem sucedidos. Danazol também é usado para prevenir ataques em pessoas com angioedema hereditário (condição hereditária que causa episódios de inchaço nas mãos, pés, rosto, vias aéreas ou intestinos). Danazol está em uma classe de medicamentos chamados hormônios androgênicos. Ele funciona para tratar a endometriose encolhendo o tecido deslocado do útero. Ele funciona para tratar a doença fibrocística da mama, bloqueando a liberação de hormônios que causam a dor e os nódulos mamários. Ele funciona para tratar o angioedema hereditário, aumentando a quantidade de uma substância natural no corpo.

como este medicamento deve ser usado?

Danazol vem como uma cápsula para tomar por via oral. Geralmente é tomado duas vezes ao dia para endometriose ou doença fibrocística da mama, ou duas ou três vezes ao dia para angioedema hereditário. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome danazol exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Não pare de tomar danazol sem falar com o seu médico. Se você tem doença fibrocística da mama, a dor e a sensibilidade mamária geralmente melhoram durante o primeiro mês em que você toma danazol e desaparecem após 2 a 3 meses de tratamento; nódulos mamários devem melhorar após 4 a 6 meses de tratamento.

outros usos para este medicamento

O danazol também é algumas vezes usado para tratar a púrpura trombocitopênica idiopática (PTI; uma condição contínua que pode causar hematomas ou sangramentos fáceis devido a um número anormalmente baixo de plaquetas no sangue). Converse com seu médico sobre os riscos de usar este medicamento para sua condição.

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar danazol,

- informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao danazol, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes das cápsulas de danazol. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: anticoagulantes ('diluentes do sangue') como varfarina (Coumadin, Jantoven), atorvastatina (Lipitor, em Caduet), carbamazepina (Carbatrol, Equetro, Tegretol, outros), ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune), medicamentos para diabetes, como insulina, lovastatina (Altoprev), sinvastatina (Zocor, em Vytorin) ou tacrolimus (Astagraf, Prograf). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
- informe o seu médico se tiver porfiria (uma doença hereditária do sangue que pode causar problemas na pele ou no sistema nervoso); sangramento vaginal inexplicável; Câncer; ou doença cardíaca ou renal. Seu médico irá

provavelmente dizer-lhe para não tomar danazol.

- informe o seu médico se estiver a amamentar. Não amamente durante o tratamento com danazol.
- informe o seu médico se tem ou já teve enxaquecas; epilepsia (convulsões), diabetes; hipoparatiroidismo (condição em que o corpo não produz hormônio paratireoídiano suficiente); pressão alta; ou qualquer doença do sangue.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perda.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Danazol pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- acne
- diminuição do tamanho dos seios
- ganho de peso
- pele ou cabelo oleoso
- rubor
- sudorese
- secreção vaginal, queimação, coceira ou sangramento
- nervosismo
- irritabilidade
- ausência de ciclo menstrual, manchas ou alteração no ciclo menstrual

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você tiver algum destes sintomas ou aqueles listados na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, ligue para o seu médico imediatamente:

- engrossamento da voz, rouquidão, dor de garganta, aumento de pêlos faciais, calvície ou inchaço dos braços ou pernas (em mulheres)
- pele vermelha, descascada ou com bolhas

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe da luz e do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Antes de fazer qualquer teste laboratorial, informe o seu médico e o pessoal do laboratório que está a tomar danazol.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Danócrino®¶

¶ -Este produto de marca não está mais no mercado. Alternativas genéricas podem estar disponíveis.

Última revisão - 24/05/2017

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022