

[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → Danazol

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682599.html>

danazol

pronunciado como (da' na zole)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Danazol no debe ser tomado por mujeres embarazadas o que puedan quedar embarazadas. El danazol puede dañar al feto. Deberá tener una prueba de embarazo negativa antes de comenzar a tomar este medicamento. Comience a tomar este medicamento durante su ciclo menstrual para asegurarse de no estar embarazada. Use un método anticonceptivo efectivo durante su tratamiento. Danazol puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos hormonales (píldoras, parches, anillos, implantes o inyecciones anticonceptivas), por lo que no debe usarlos como su único método anticonceptivo durante su tratamiento. También debe usar un método anticonceptivo de barrera (dispositivo que impide que los espermatozoides ingresen al útero, como un condón o un diafragma). Pídele a tu médico que te ayude a elegir un método anticonceptivo que funcione para ti. Si queda embarazada mientras toma danazol, llame a su médico de inmediato.

El danazol puede aumentar el riesgo de que desarrolle un coágulo de sangre en los brazos, las piernas, los pulmones, el corazón y el cerebro que puede causar un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido un coágulo de sangre. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato: pierna caliente, roja, hinchada o sensible; problemas para hablar o entender; parálisis o entumecimiento en la cara, brazo o pierna; dolor de cabeza intenso y repentino; cambios repentinos en la visión, visión borrosa o ennegrecida, o visión doble.

Danazol puede causar daño hepático con sangrado abdominal en personas que toman danazol durante mucho tiempo. Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad hepática. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato: coloración amarillenta de la piel o los ojos, dolor en el área del estómago, cansancio extremo o sangrado o moretones inusuales.

El danazol puede provocar un aumento de la presión del líquido dentro del cráneo. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, deje de tomar danazol y llame a su médico de inmediato: dolor de cabeza, náuseas, vómitos o problemas con la visión.

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico puede ordenar ciertas pruebas de laboratorio antes y durante su tratamiento para verificar la respuesta de su cuerpo al danazol.

Hable con su médico sobre los riesgos de tomar danazol.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

El danazol se usa para tratar la endometriosis (una afección en la que el tipo de tejido que recubre el útero [matriz] crece en otras áreas del cuerpo y causa infertilidad, dolor antes y durante los períodos menstruales, dolor durante y después de la actividad sexual y pesadez o sangrado irregular). Danazol también se usa para tratar la enfermedad fibroquística de las mamas (senos hinchados y sensibles con bultos no cancerosos) cuando otros tratamientos no dan resultado. Danazol también se usa para prevenir ataques en personas con angioedema hereditario (afección hereditaria que causa episodios de hinchazón en las manos, los pies, la cara, las vías respiratorias o los intestinos). El danazol pertenece a una clase de medicamentos llamados hormonas androgénicas. Funciona para tratar la endometriosis al encoger el tejido desplazado del útero. Funciona para tratar la enfermedad fibroquística de las mamas al bloquear la liberación de hormonas que causan el dolor y los bultos en las mamas. Funciona para tratar el angioedema hereditario al aumentar la cantidad de una sustancia natural en el cuerpo.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

El danazol viene envasado en cápsulas para tomar por vía oral. Por lo general, se toma dos veces al día para la endometriosis o la enfermedad fibroquística de las mamas, o dos o tres veces al día para el angioedema hereditario. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome danazol exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

No deje de tomar danazol sin hablar con su médico. Si tiene enfermedad fibroquística de las mamas, el dolor y la sensibilidad en las mamas generalmente mejoran durante el primer mes que toma danazol y desaparecen después de 2 a 3 meses de tratamiento; los bultos en los senos deben mejorar después de 4 a 6 meses de tratamiento.

Otros usos de este medicamento

El danazol también se usa a veces para tratar la púrpura trombocitopénica idiopática (PTI; una afección persistente que puede causar hematomas o sangrado con facilidad debido a un número anormalmente bajo de plaquetas en la sangre). Hable con su médico acerca de los riesgos de usar este medicamento para su condición.

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar danazol,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al danazol, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes que contienen las cápsulas de danazol. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.
- informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: anticoagulantes ('diluyentes de la sangre') como warfarina (Coumadin, Jantoven), atorvastatina (Lipitor, en Caduet), carbamazepina (Carbatrol, Equetro, Tegretol, otros), ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune), medicamentos para la diabetes como insulina, lovastatina (Altoprev), simvastatina (Zocor, en Vytorin) o tacrolimus (Astagraf, Prograf). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.
- informe a su médico si tiene porfiria (una enfermedad hereditaria de la sangre que puede causar problemas en la piel o en el sistema nervioso); sangrado vaginal inexplicable; cáncer; o enfermedad cardíaca o renal. Su médico lo hará

probablemente le diga que no tome danazol.

- Informe a su médico si está amamantando. No amamante durante su tratamiento con danazol.
- informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido migrañas; epilepsia (convulsiones), diabetes; hipoparatiroidismo (afección en la que el cuerpo no produce suficiente hormona paratiroidea); Alta presión sanguínea; o cualquier trastorno de la sangre.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

El danazol puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- acné
- disminución del tamaño de los senos
- aumento de peso
- piel o cabello graso
- enrojecimiento
- transpiración
- sequedad vaginal, ardor, picazón o sangrado
- nerviosismo
- irritabilidad
- ausencia de ciclo menstrual, manchado o cambio en el ciclo menstrual

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas o los enumerados en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE, llame a su médico de inmediato:

- profundización de la voz, ronquera, dolor de garganta, aumento del vello facial, calvicie o hinchazón de brazos o piernas (en mujeres)
- piel roja, descamada o con ampollas

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos de la luz y el exceso de calor y humedad (no en el baño).

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Antes de realizarse alguna prueba de laboratorio, informe a su médico y al personal del laboratorio que está tomando danazol.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- danocrina®¶

¶ -Este producto de marca ya no está en el mercado. Es posible que haya alternativas genéricas disponibles.

Última revisión - 24/05/2017

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022