



عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682599.html>

دانا زول تنطقك (دا نا زول)

تحذيرهام:

يجب عدم تناول دانا زول من قبل النساء الحوامل أو اللاتي يمكن أن يصبحن حوامل. قد يؤدي دانا زول الجنين. ستحتاج إلى إجراء اختبار حمل سلبي قبل البدء في تناول هذا الدواء. ابدأ بتناول هذا الدواء خلال دورتك الشهرية للتأكد من أنك لست حاملاً. استخدم وسيلة فعالة لمنع الحمل أثناء العلاج. قد يقلل دانا زول من فعالية موانع الحمل الهرمونية (حبوب منع الحمل ، أو اللصقات ، أو الحلقات ، أو الغرسات ، أو الحقن) ، لذلك يجب ألا تستخدمها كوسيلة وحيدة لتحديد النسل أثناء العلاج. يجب أيضاً استخدام طريقة حاجز لمنع الحمل (جهاز يمنع الحيوانات المنوية من دخول الرحم مثل الواقي الذكري أو العازل الأنثوي). اطلب من طبيبك مساعدتك في اختيار طريقة تحديد النسل التي تناسبك. إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول دانا زول ، فاتصل بطبيبك على الفور.

يمكن أن يزيد Danazol من خطر إصابتك بجلطة دموية في ذراعيك وساقيك وريئتيك وقلبك ودماعك والتي قد تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية. أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من جلطة دموية أو أصبت بها في أي وقت مضى. إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيبك على الفور: ساق دافئة أو حمراء أو منتفخة أو مؤلمة ؛ مشكلة في التحدث أو الفهم ؛ شلل أو خدر في الوجه أو الذراع أو الساق ؛ صداع حاد مفاجئ تغيرات مفاجئة في الرؤية ، رؤية ضبابية أو سوداء ، أو رؤية مزدوجة.

قد يتسبب دانا زول في تلف الكبد مع نزيف في البطن لدى الأشخاص الذين يتناولون دانا زول لفترة طويلة. أخبر طبيبك إذا كنت مصاباً أو سبق أن أصبت بمرض كبدي. إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيبك على الفور: اصفرار الجلد والعينين ، أو ألم في منطقة المعدة ، أو إرهاق شديد ، أو نزيف أو كدمات غير عادية.

يمكن أن يتسبب Danazol في زيادة ضغط السائل داخل الجمجمة. إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية ، فتوقف عن تناول دانا زول واتصل بطبيبك على الفور: صداع ، غثيان ، قيء ، أو مشاكل في الرؤية.

احتفظ بجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. قد يطلب طبيبك بعض الاختبارات المعملية قبل وأثناء العلاج للتحقق من استجابة جسمك للدانا زول.

تحدث إلى طبيبك حول مخاطر تناول دانا زول.

لماذا وصف هذا الدواء؟

يستخدم دانا زول لعلاج الانتباز البطاني الرحمي (حالة ينمو فيها نوع النسيج المبطن للرحم [الرحم] في مناطق أخرى من الجسم ويسبب العقم ، والألم قبل الدورة الشهرية وأثناءها ، والألم أثناء وبعد النشاط الجنسي ، والغزارة أو نزيف غير منتظم) .. يستخدم دانا زول أيضاً لعلاج مرض الثدي الليفي الكيسي (تورم الثديين الرقيق مع وجود كتل غير سرطانية) عندما لا تنجح العلاجات الأخرى. يستخدم Danazol أيضاً لمنع الهجمات لدى الأشخاص الذين يعانون من الوذمة الوعائية الوراثية (حالة وراثية تسبب نوبات من التورم في اليدين أو القدمين أو الوجه أو مجرى الهواء أو الأمعاء). دانا زول ينتمي إلى فئة من الأدوية تسمى هرمونات الأندروجين. يعمل على علاج الانتباز البطاني الرحمي عن طريق تقليص أنسجة الرحم النازحة. يعمل على علاج مرض الكيس الليفي بالثدي عن طريق منع إفراز الهرمونات التي تسبب آلام الثدي وتكتله. يعمل على علاج الوذمة الوعائية الوراثية عن طريق زيادة كمية مادة طبيعية في الجسم.

كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي Danazol كبسولة لأخذها عن طريق الفم. عادة ما يتم تناوله مرتين في اليوم لعلاج الانتباز البطاني الرحمي أو مرض الثدي الليفي الليفي ، أو مرتين أو ثلاث مرات في اليوم للوذمة الوعائية الوراثية. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. خذ دانا زول بالضبط حسب التوجيهات. لا تأخذ أكثر أو أقل منه أو تناوله أكثر مما وصفه طبيبك.

لا تتوقف عن تناول دانا زول دون التحدث مع طبيبك. إذا كنت تعاني من مرض الثدي الليفي الكيسي ، فعادة ما يتحسن ألم الثدي والحنان خلال الشهر الأول الذي تتناول فيه دانا زول وتختفي بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من العلاج ؛ يجب أن تتحسن أورام الثدي بعد 4 إلى 6 أشهر من العلاج.

هناك استخدامات لهذا الدواء

يستخدم دانا زول أيضاً في بعض الأحيان لعلاج فرقرية نقص الصفائح مجهول السبب (ITP ؛ حالة مستمرة قد تسبب كدمات أو نزيفاً سهلاً بسبب انخفاض عدد الصفائح الدموية بشكل غير طبيعي في الدم). تحدث إلى طبيبك حول مخاطر استخدام هذا الدواء لحالتك.

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبعة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبل تناول دانا زول ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كان لديك حساسية من دانا زول أو أي أدوية أخرى أو أي من مكونات كبسولات دانا زول. اسأل الصيدلي عن قائمة المكونات.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: مضادات التخثر (مميعات الدم) مثل الوارفارين (كومادين ، جانتوفين) ، أتورفاستاتين (ليبيتور ، في كادويت) ، كاربامازيبين (كارباترول ، إيكيترو ، تيجريتول ، وغيرها) ، سيكلوسبورين (جينجراف ، نيورال ، Sandimmune) ، أدوية لمرض السكري مثل الأنسولين ، لوفاستاتين (ألتوبريف) ، سيمفاستاتين (زوكور ، في فيتورين) ، أو تاكروليموس (أستاغراف ، بروغراف). قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.
- أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من البورفيريا (مرض دم وراثي قد يسبب مشاكل في الجلد أو الجهاز العصبي) ؛ نزيف مهلي غير مبرر سرطان ؛ أو أمراض القلب أو الكلى. طبيبك سوف

ربما أخبرك بعدم تناول دانا زول.

- أخبر طبيبك إذا كنت مرضعة. لا ترضع أثناء العلاج بدانا زول.
- أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من الصداع النصفي أو سبق أن عانيت منه ؛ الصرع (النوبات) ومرض السكري. قصور الدريقات (حالة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من هرمون الغدة الجار درقية) ؛ ضغط دم مرتفع؛ أو أي اضطراب في الدم.

قبعة يجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

خذ الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. ومع ذلك ، إذا حان الوقت تقريباً للجرعة التالية ، فتجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الجرعات المعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب دانا زول آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- حكة الشبّاب
- انخفاض في حجم الثدي
- زيادة الوزن
- البشرة الدهنية أو الشعر
- تدفق مائي - صرف
- التعرق
- جفاف المهبل ، حرقان ، حكة ، أو نزيف
- العصبية
- التهيج
- غياب الدورة الشهرية أو اكتشاف أو تغير في الدورة الشهرية

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض أو تلك المذكورة في قسم تحذير هام ، فاتصل بطبيبك على الفور:

- زيادة حدة الصوت ، بحة في الصوت ، التهاب الحلق ، زيادة في شعر الوجه ، الصلع ، أو تورم الذراعين أو الساقين (عند النساء)
- جلد أحمر أو متقشر أو متقرح

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

قبعة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزينه في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن الضوء والحرارة الزائدة والرطوبة (وليس في الحمام).

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المراحيض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويةك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء (<http://goo.gl/c4Rm4p>) لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

من المهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريمات والبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ، قم دائماً بإغلاق أعطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم. (<http://www.upandaway.org>)

نحالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على (<https://www.poisonhelp.org/help>) إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قبة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

قبل إجراء أي اختبار معمل ، أخبر طبيبك وموظفي المختبر أنك تتناول دانا زول.

لا تدع أي شخص آخر يأخذ دوائك. اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماء راند

- دانوكرين®

١- هذا المنتج ذو العلامة التجارية لم يعد في السوق. قد تكون البدائل العامة متاحة.

آخر مراجعة - 2017/05/24

تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة



إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS® معلومات الدواء المريض ™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة.
الازدواجية. 4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland.
للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 8600 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهد الوطنية للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022