



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[บ้าน](#) → [ยา สมุนไพรและอาหารเสริม](#) → [ดاناโซล](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682599.html>

ดاناโซล

ออกเสียงว่า (da' na zole)

คำเตือนที่สำคัญ:

สตรีที่ตั้งครรภ์หรืออาจตั้งครรภ์ต้องไม่รับประทาน Danazol Danazol อาจเป็นอันตรายต่อการกในครรภ์ คุณจะต้องมีการทดสอบการตั้งครรภ์เป็นลบก่อนเริ่มใช้ยานี้ เริ่มใช้ยานี้ในระหว่างรอบเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งครรภ์ ใช้การคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพในระหว่างการรักษาของคุณ Danazol อาจลดประสิทธิภาพของฮอร์โมนคุมกำเนิด (ยาคุมกำเนิด แผ่นแปะ แหวน การปลูกถ่าย หรือการฉีดยา) ดังนั้นคุณไม่ควรใช้สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีเดียวในการคุมกำเนิดระหว่างการรักษา คุณต้องใช้วิธีคุมกำเนิดด้วย (อุปกรณ์ที่กันสเปิร์มไม่ให้เข้าไปในมดลูก เช่น ถุงยางอนามัยหรือไดอะแฟรม) ขอให้แพทย์ช่วยคุณเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานดاناโซล ให้โทรเรียกแพทย์ทันที

Danazol สามารถเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเกิดลิ่มเลือดที่แขน ขา ปอด หัวใจ และสมอง ซึ่งอาจทำให้หัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง บอกแพทย์หากคุณเคยมีหรือเคยมีลิ่มเลือด หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: ชาอุ่น, แดง, บวมหรืออ่อน; ปัญหาในการพูดหรือทำความเข้าใจ อัมพาตหรือชาที่ใบหน้า แขนหรือขา; ปวดหัวอย่างรุนแรงกะทันหัน; การมองเห็นเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ตาฟุ้งหรือดำคล้ำ หรือมองเห็นเป็นสองเท่า

Danazol อาจทำให้ตับถูกทำลายโดยมีเลือดออกในช่องท้องในผู้ที่ทานดاناโซลเป็นเวลานาน แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: ฝวหรือตาเหลือง, ปวดท้อง, เหนื่อยล้าอย่างรุนแรง, เลือดออกหรือรอยฟกช้ำผิดปกติ

Danazol อาจทำให้ความดันของเหลวภายในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดทานดاناโซล และโทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรือปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นของคุณ

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างก่อนและระหว่างการรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อดานาโซล

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ดاناโซล

hy เป็นยานี้กำหนด?

Danazol ใช้รักษาเยื่อโพรงมดลูกเจริญผิดปกติ (ภาวะที่เนื้อเยื่อที่เรียงตัวอยู่ในมดลูก [มดลูก] เติบโตในส่วนอื่นของร่างกายและทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก ความเจ็บปวดก่อนและระหว่างมีประจำเดือน ความเจ็บปวดระหว่างและหลังกิจกรรมทางเพศ และหนักหรือหนักหรือ เลือดออกผิดปกติ)..ดاناโซลยังใช้รักษาโรคเต้านมไฟโบรซิสติก (เต้านมบวม คัดตึง และมีก้อนเนื้อที่ไม่เป็นมะเร็ง) เมื่อการรักษาอื่นๆ ไม่ประสบผลสำเร็จ Danazol ยังใช้เพื่อป้องกันการโจมตีในผู้ที่มี angioedema ทางพันธุกรรม (สภาพที่สืบทอดมาซึ่งทำให้เกิดอาการบวมที่มือ เท้า ใบหน้า ทางเดินหายใจ หรือลำไส้) Danazol อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าฮอร์โมนแอนโดรเจน มันทำงานเพื่อรักษา endometriosis โดยการหดตัวของเนื้อเยื่อที่ถูกแทนที่ของมดลูก มันทำงานเพื่อรักษาโรคเต้านมไฟโบรซิสติกโดยการปิดกั้นการหลั่งของฮอร์โมนที่ทำให้เกิดอาการเจ็บเต้านมและเป็นก้อน มันทำงานเพื่อรักษา angioedema ทางพันธุกรรมโดยการเพิ่มปริมาณของสารธรรมชาติในร่างกาย

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Danazol มาเป็นแคปซูลทางปาก มักใช้วันละสองครั้งสำหรับ endometriosis หรือโรคเต้านม fibrocystic หรือสองหรือสามครั้งต่อวันสำหรับ angioedema ทางพันธุกรรม ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ danazol ตามที่กำหนดไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

อย่าหยุดทานดاناโซลโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หาก你有โรคเต้านม fibrocystic อาการเจ็บเต้านมและความอ่อนโยนมักจะดีขึ้นในช่วงเดือนแรกที่คุณทานดاناโซลและหายไปหลังจากการรักษา 2 ถึง 3 เดือน ก้อนเต้านมควรดีขึ้นหลังจากการรักษา 4 ถึง 6 เดือน

ใช้สำหรับยานี้

บางครั้ง Danazol ยังใช้รักษา thrombocytopenic purpura ที่ไม่ทราบสาเหตุ (ITP ซึ่งเป็นภาวะต่อเนื้องอกที่อาจทำให้ซีหรือมีเลือดออกได้ง่ายเนื่องจากมีเกล็ดเลือดในเลือดต่ำอย่างผิดปกติ) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้สำหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนทานแตนซอล

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาดاناโซล ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในแคปซูลดاناโซล สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ('ยาละลายลิ่มเลือด') เช่น วาร์ฟาริน (คูมาดิน, แจนโทเวน), อะทอร์วาสแตติน (ลิปิตอร์, ในคาตูเอต), คาร์บามาเซปิน (คาร์บาไมโรล, อีเคเวโดร, เตเกรตอล, อื่นๆ), โซโคลอสปอริน (เจนกราฟ, นีโอริล, Sandimmune), ยารักษาโรคเบาหวาน เช่น อินซูลิน, lovastatin (Altoprev), simvastatin (Zocor, ใน Vytorin) หรือ Tacrolimus (Astagraf, Prograf) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหาก你有พอร์ไฟเรีย (โรคเลือดที่สืบทอดมาซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาผิวหนังหรือระบบประสาท) เลือดออกทางช่องคลอดไม่ได้อธิบาย; โรคเมเร็ง; หรือโรคหัวใจหรือไต แพทย์ของคุณจะ

อาจบอกคุณว่าอย่าทานดاناซอล

- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณกำลังให้นมบุตร อย่าให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วยดاناซอล
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยปวดหัวไมเกรน โรคลมบ้าหมู (ชัก), เบาหวาน; hypoparathyroidism (เงื่อนไขที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยด์ไม่เพียงพอ); ความดันโลหิตสูง; หรือความผิดปกติของเลือดใดๆ

ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ได้รับทันทีที่คุณจำได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสำหรับมือต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

Danazol อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- ลีว
- ขนาดเต้านมลดลง
- ปากมีกลิ่นเหม็น, ปากมีกลิ่นเหม็น, อ้วกซึม
- ผิวมันหรือผม
- ล้าง
- เหงื่อออก
- ช่องคลอดแห้ง แสบร้อน คัน หรือมีเลือดออก
- ความกังวลใจ
- ความหงุดหงิด
- ประจำเดือนไม่มา ฝ้า หรือการเปลี่ยนแปลงของรอบเดือน

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคำเตือนที่สำคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

- เสียงเข้มขึ้น, เสียงแหบ, เจ็บคอ, ขนบนใบหน้าเพิ่มขึ้น, หัวล้านหรือบวมที่แขนหรือขา (ในผู้หญิง)
- ผิวแดง ลอกหรือพอง

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยา?

เก็บยานี้ไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากแสงและความร้อนและความชื้นส่วนเกิน (ไม่ใช่ในห้องน้ำ)

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยาลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภษานะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตาครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อกฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึง<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ก กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกรถพยาบาลทันทีที่ 911

หมวดข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

ก่อนทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการใดๆ ให้แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการว่าคุณกำลังใช้ยาดานาซอล

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ทามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่คุณพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแบรนด์

- Danocrine®

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 05/24/2017

[เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้า](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ขอจำกัดความรับผิดชอบ](#)

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเธสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ
สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022