

[У дома](#) → [Лекарства, билки и добавки](#) → Даназол

Source : U.S. National Library of Medicine

URL на тази страница: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682599.html>

Даназол

произнася се като (da' na zole)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Даназол не трябва да се приема от жени, които са бременни или които биха могли да забременеят. Даназол може да навреди на плода. Ще трябва да имате отрицателен тест за бременност, преди да започнете да приемате това лекарство. Започнете да приемате това лекарство по време на менструалния си цикъл, за да сте сигурни, че не сте бременна. Използвайте ефективен контрол на раждаемостта по време на лечението. Даназол може да намали ефективността на хормоналните контрацептиви (хапчета за контрол на раждаемостта, пластири, пръстени, импланти или инжекции), така че не трябва да ги използвате като единствен метод за контрол на раждаемостта по време на лечението. Вие също трябва да използвате бариерен метод за контрол на раждаемостта (устройство, което блокира навлизането на спермата в матката, като презерватив или диафрагма). Помолете Вашия лекар да Ви помогне да изберете метод за контрол на раждаемостта, който ще работи за Вас. Ако забременеете, докато приемате даназол, незабавно се обадете на Вашия лекар.

Даназол може да увеличи риска от образуване на кръвен съсирек в ръцете, краката, белите дробове, сърцето и мозъка, който може да причини сърдечен удар или инсулт. Кажете на Вашия лекар, ако имате или някога сте имали кръвен съсирек. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: топъл, зачервен, подут или нежен крак; проблеми с говоренето или разбирането; парализа или изтръпване на лицето, ръката или крака; внезапно силно главоболие; внезапни промени в зрението, замъглено или почерняло зрение или двойно виждане.

Даназол може да причини увреждане на черния дроб с коремно кървене при хора, които приемат даназол продължително време. Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали чернодробно заболяване. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: пожълтяване на кожата или очите, болка в областта на стомаха, силна умора или необичайно кървене или синини.

Даназол може да причини повишено налягане на течността вътре в черепа. Ако получите някой от следните симптоми, спрете приема на даназол и незабавно се обадете на Вашия лекар: главоболие, гадене, повръщане или проблеми със зрението.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи определени лабораторни изследвания преди и по време на Вашето лечение, за да провери реакцията на тялото Ви към даназол.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема на даназол.

защо е предписано това лекарство?

Даназол се използва за лечение на ендометриоза (състояние, при което типът тъкан, покриваща матката (матката), расте в други части на тялото и причинява безплодие, болка преди и по време на менструация, болка по време и след сексуална активност и тежка или нередовно кървене). Даназол се използва също за лечение на фиброкистозна болест на гърдата (подути, чувствителни гърди с неракови бучки), когато други лечения не са успешни. Даназол се използва също за предотвратяване на пристъпи при хора с наследствен ангиоедем (наследствено състояние, което причинява епизоди на подуване на ръцете, краката, лицето, дихателните пътища или червата). Даназол е в клас лекарства, наречени андрогенни хормони. Той работи за лечение на ендометриоза чрез свиване на изместената тъкан на матката. Той работи за лечение на фиброкистозна болест на гърдата, като блокира освобождаването на хормони, които причиняват болка в гърдите и бучки. Действа за лечение на наследствен ангиоедем чрез увеличаване на количеството на естествено вещество в тялото.

как трябва да се използва това лекарство?

Даназол се предлага като капсула за прием през устата. Обикновено се приема два пъти дневно за ендометриоза или фиброкистозна болест на гърдата или два или три пъти на ден за наследствен ангиоедем. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте даназол точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Не спирайте приема на даназол, без да говорите с Вашия лекар. Ако имате фиброкистозна болест на гърдата, болката и чувствителността на гърдите обикновено се подобряват през първия месец, в който приемате даназол, и изчезват след 2 до 3 месеца лечение; бучките в гърдите трябва да се подобрят след 4 до 6 месеца лечение.

други употреби на това лекарство

Даназол също понякога се използва за лечение на идиопатична тромбоцитопенична пурпура (ИТП; продължаващо състояние, което може да причини лесно синини или кървене поради необичайно нисък брой тромбоцити в кръвта). Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете даназол,

- уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към даназол, други лекарства или някоя от съставките на даназол капсули. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.
- кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin, Jantoven), аторвастатин (Lipitor, in Caduet), карбамазепин (Carbatrol, Equetro, Tegretol, други), циклоспорин (Gengraf, Neoral, Sandimmune), лекарства за диабет като инсулин, ловастатин (Altoprev), симвастатин (Zocor, in Vytorin) или такролимус (Astagraf, Prograf). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.
- уведомете Вашия лекар, ако имате порфирия (наследствено заболяване на кръвта, което може да причини проблеми с кожата или нервната система); необяснимо вагинално кървене; рак; или сърдечно или бъбречно заболяване. Вашият лекар ще

вероятно ще ви кажа да не приемате даназол.

- уведомете Вашия лекар, ако кърмите. Не кърмете по време на лечението с даназол.
- уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали мигренозно главоболие; епилепсия (гърчове), диабет; хипопаратиреоидизъм (състояние, при което тялото не произвежда достатъчно паратироиден хормон); високо кръвно налягане; или някакво кръвно заболяване.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Даназол може да предизвика нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

- акне
- намаляване на размера на гърдите
- качване на тегло
- мазна кожа или коса
- зачервяване
- изпотяване
- вагинална сухота, парене, сърбеж или кръвене
- нервност
- раздразнителност
- липса на менструален цикъл, зацапване или промяна в менструалния цикъл

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

- задълбочаване на гласа, дрезгав глас, възпалено гърло, увеличаване на окосмяването по лицето, плешивост или подуване на ръцете или краката (при жените)
- зачервена, лющена или образуваща мехури кожа

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) или по телефона (1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте го при стайна температура и далеч от светлина и излишна топлина и влага (не в банята).

Неужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да държите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и обсега.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

п случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е достъпна и онлайн на адрес <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Ако жертвата е припаднала, има гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Преди да направите каквото и да е лабораторно изследване, кажете на Вашия лекар и на лабораторния персонал, че приемате даназол.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

- Данокрин®

® -Този марков продукт вече не е на пазара. Може да са налични общи алтернативи.

Последна редакция - 24.05.2017 г

[Научете как да цитирате тази страница](#)



[Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc](#)

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г