

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 达那唑

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682599.html>

## 达那唑

发音为 (da' na zole)

### 重要警告:

怀孕或可能怀孕的妇女不得服用达那唑。达那唑可能会伤害胎儿。在开始服用这种药物之前, 您需要进行阴性妊娠试验。在月经周期开始服用这种药物, 以确保您没有怀孕。在治疗期间使用有效的避孕措施。达那唑可能会降低激素避孕药(避孕药、贴片、避孕环、植入物或注射剂)的有效性, 因此您不应在治疗期间将它们用作唯一的避孕方法。您还必须使用屏障避孕方法(阻止精子进入子宫的装置, 例如避孕套或隔膜)。请您的医生帮助您选择适合您的避孕方法。如果您在服用达那唑时怀孕, 请立即致电您的医生。

达那唑会增加您在手臂、腿、肺、心脏和大脑中形成血栓的风险, 这可能会导致心脏病发作或中风。如果您有或曾经有血栓, 请告诉您的医生。如果您出现以下任何症状, 请立即就医: 腿部发热、发红、肿胀或触痛; 说话或理解困难; 面部、手臂或腿部瘫痪或麻木; 突然剧烈头痛; 视力突然变化, 视力模糊或变黑, 或复视。

长期服用达那唑的人可能会导致肝损伤并伴有腹部出血。如果您患有或曾经患有肝病, 请告诉您的医生。如果您出现以下任何症状, 请立即就医: 皮肤或眼睛发黄、胃部疼痛、极度疲倦或异常出血或瘀伤。

达那唑会导致颅骨内液体的压力增加。如果您出现以下任何症状, 请停止服用达那唑并立即就医: 头痛、恶心、呕吐或视力问题。

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生可能会在您治疗之前和期间要求进行某些实验室测试, 以检查您的身体对达那唑的反应。

与您的医生讨论服用达那唑的风险。

## 为什么要开这种药？

达那唑用于治疗子宫内膜异位症（子宫内膜组织类型在身体其他部位生长并导致不孕、月经前后疼痛、性活动期间和之后疼痛以及重度或不规则出血）..当其他治疗不成功时，达那唑也用于治疗纤维囊性乳房疾病（肿胀、柔软的乳房，伴有非癌性肿块）。达那唑还用于预防遗传性血管性水肿（导致手、脚、脸、气道或肠道肿胀发作的遗传性疾病）患者的发作。达那唑属于一类称为雄激素的药物。它通过缩小子宫的移位组织来治疗子宫内膜异位症。它通过阻止引起乳房疼痛和肿块的激素的释放来治疗纤维囊性乳房疾病。它通过增加体内天然物质的含量来治疗遗传性血管性水肿。

## 这个药应该怎么用？

达那唑以胶囊形式口服。对于子宫内膜异位症或纤维囊性乳腺疾病，通常每天服用两次，对于遗传性血管性水肿，通常每天服用两到三次。仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用达那唑。不要多吃或少吃，也不要比医生开的更频繁。

不要在未咨询医生的情况下停止服用达那唑。如果您患有纤维囊性乳房疾病，乳房疼痛和压痛通常会在您服用达那唑的第一个月内得到改善，并在治疗 2 至 3 个月后会消失；治疗 4 至 6 个月，乳房肿块应有所改善。

## 该药的其他用途

达那唑有时也用于治疗特发性血小板减少性紫癜（ITP；由于血液中血小板数量异常少而可能导致容易瘀伤或出血的持续性疾病）。与您的医生讨论使用这种药物治疗您的病情的风险。

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

## 我应该遵循什么特殊的预防措施？

### 服用丹枣前，

- 如果您对达那唑、任何其他药物或达那唑胶囊中的任何成分过敏，请告诉您的医生和药剂师。向您的药剂师索取成分清单。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用哪些处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及以下任何一项：抗凝剂（“血液稀释剂”），例如华法林（Coumadin、Jantoven）、阿托伐他汀（立普妥，在 Caduet）、卡马西平（Carbatrol、Equetro、Tegretol 等）、环孢素（Gengraf、Neoral、Sandimmune），糖尿病药物，如胰岛素、洛伐他汀（Altoprev）、辛伐他汀（Zocor, in Vytorin）或他克莫司（Astagraf, Prograf）。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。
- 如果您患有卟啉症（一种可能导致皮肤或神经系统问题的遗传性血液病），请告诉您的医生；不明原因的阴道出血；癌症；或心脏或肾脏疾病。你的医生会

可能会告诉你不要服用达那唑。

- 如果您正在哺乳，请告诉您的医生。在使用达那唑治疗期间不要进行母乳喂养。
- 如果您患有或曾经患有偏头痛，请告诉您的医生；癫痫（癫痫发作），糖尿病；甲状旁腺功能减退（身体不能产生足够的甲状旁腺激素的情况）；高血压；或任何血液疾病。

## 如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果快到下一次服药的时间了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

## 这种药物会引起副作用吗？

**达那唑可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：**

- 粉刺
- 乳房变小
- 体重增加
- 油性皮肤或头发
- 冲洗
- 出汗
- 阴道干燥、灼热、瘙痒或出血
- 紧张
- 易怒
- 没有月经周期、斑点或月经周期变化

**一些副作用可能很严重。如果您遇到任何这些症状或重要警告部分中列出的症状，请立即致电您的医生：**

- 声音变深、声音嘶哑、喉咙痛、面部毛发增多、秃顶或手臂或腿部肿胀（女性）
- 皮肤发红、脱皮或起水泡

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

## 我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离光线、过热和潮湿（不要放在浴室里）。

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站 (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免受中毒，请始终锁上安全帽，并立即将药物放在安全的位置——一个向上、远离、看不见和够不到的地方。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

## 我应该知道其他信息吗？

在进行任何实验室检查之前，请告诉您的医生和实验室人员您正在服用达那唑。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

## 兰特名称

- 丹诺克林®<sup>¶</sup>

<sup>¶</sup> - 该品牌产品已不再上市。可能有通用的替代品。

最后修订 - 2017 年 5 月 24 日

[了解如何引用此页面](#)



[美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

---

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022 年 3 月 25 日