

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Danazol

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682599.html>

Danazol

prononcé comme (da' na zole)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Le danazol ne doit pas être pris par les femmes enceintes ou susceptibles de le devenir. Le danazol peut nuire au fœtus. Vous devrez avoir un test de grossesse négatif avant de commencer à prendre ce médicament. Commencez à prendre ce médicament pendant votre cycle menstruel pour vous assurer que vous n'êtes pas enceinte. Utilisez une contraception efficace pendant votre traitement. Le danazol peut diminuer l'efficacité des contraceptifs hormonaux (pilules contraceptives, patches, anneaux, implants ou injections), vous ne devez donc pas les utiliser comme seule méthode de contraception pendant votre traitement. Vous devez également utiliser une méthode contraceptive barrière (dispositif qui empêche les spermatozoïdes de pénétrer dans l'utérus, comme un préservatif ou un diaphragme). Demandez à votre médecin de vous aider à choisir une méthode de contraception qui fonctionnera pour vous. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez du danazol, appelez immédiatement votre médecin.

Le danazol peut augmenter votre risque de développer un caillot sanguin dans les bras, les jambes, les poumons, le cœur et le cerveau pouvant provoquer une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Dites à votre médecin si vous avez ou avez déjà eu un caillot sanguin. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin : jambe chaude, rouge, enflée ou douloureuse ; difficulté à parler ou à comprendre; paralysie ou engourdissement du visage, du bras ou de la jambe ; maux de tête soudains et intenses ; changements soudains de la vision, vision floue ou noircie, ou vision double.

Le danazol peut causer des lésions hépatiques accompagnées de saignements abdominaux chez les personnes qui prennent du danazol pendant une longue période. Dites à votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie du foie. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin : jaunissement de la peau ou des yeux, douleur dans la région de l'estomac, fatigue extrême ou saignement ou ecchymose inhabituel.

Le danazol peut provoquer une augmentation de la pression du liquide à l'intérieur du crâne. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, arrêtez de prendre du danazol et appelez immédiatement votre médecin : maux de tête, nausées, vomissements ou problèmes de vision.

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin peut prescrire certains tests de laboratoire avant et pendant votre traitement pour vérifier la réponse de votre corps au danazol.

Discutez avec votre médecin des risques liés à la prise de danazol.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le danazol est utilisé pour traiter l'endométriose (une affection dans laquelle le type de tissu qui tapisse l'utérus [utérus] se développe dans d'autres parties du corps et provoque l'infertilité, des douleurs avant et pendant les menstruations, des douleurs pendant et après l'activité sexuelle, et des saignements irréguliers). Le danazol est également utilisé pour traiter la maladie fibrokystique du sein (seins gonflés et sensibles avec des masses non cancéreuses) lorsque les autres traitements ne réussissent pas. Le danazol est également utilisé pour prévenir les crises chez les personnes atteintes d'angio-œdème héréditaire (maladie héréditaire qui provoque des épisodes de gonflement des mains, des pieds, du visage, des voies respiratoires ou des intestins). Le danazol appartient à une classe de médicaments appelés hormones androgènes. Il agit pour traiter l'endométriose en rétrécissant le tissu déplacé de l'utérus. Il agit pour traiter la maladie fibrokystique du sein en bloquant la libération d'hormones qui causent la douleur et les grosseurs mammaires. Il agit pour traiter l'œdème de Quincke héréditaire en augmentant la quantité d'une substance naturelle dans le corps.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Danazol se présente sous forme de capsule à prendre par la bouche. Il est généralement pris deux fois par jour pour l'endométriose ou la maladie fibrokystique du sein, ou deux ou trois fois par jour pour l'angio-œdème héréditaire. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez le danazol exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

N'arrêtez pas de prendre du danazol sans en parler à votre médecin. Si vous souffrez d'une maladie fibrokystique du sein, la douleur et la sensibilité mammaires s'améliorent généralement au cours du premier mois de prise de danazol et disparaissent après 2 à 3 mois de traitement; les masses mammaires devraient s'améliorer après 4 à 6 mois de traitement.

autres utilisations de ce médicament

Le danazol est également parfois utilisé pour traiter le purpura thrombocytopénique idiopathique (PTI, une affection persistante qui peut provoquer facilement des ecchymoses ou des saignements en raison d'un nombre anormalement bas de plaquettes dans le sang). Discutez avec votre médecin des risques liés à l'utilisation de ce médicament pour votre état.

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre du danazol,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au danazol, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients contenus dans les gélules de danazol. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.
- informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. N'oubliez pas de mentionner l'un des éléments suivants : les anticoagulants ("anticoagulants") tels que la warfarine (Coumadin, Jantoven), l'atorvastatine (Lipitor, dans Caduet), la carbamazépine (Carbatrol, Equetro, Tegretol, autres), la cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), des médicaments pour le diabète tels que l'insuline, la lovastatine (Altoprev), la simvastatine (Zocor, dans Vytorin) ou le tacrolimus (Astagraf, Prograf). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.
- informez votre médecin si vous souffrez de porphyrie (une maladie héréditaire du sang qui peut causer des problèmes de peau ou de système nerveux); saignements vaginaux inexplicables ; cancer; ou une maladie cardiaque ou rénale. Votre médecin va

vous dira probablement de ne pas prendre de danazol.

- informez votre médecin si vous allaitez. N'allaites pas pendant votre traitement par le danazol.
- informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu des migraines ; épilepsie (convulsions), diabète; hypoparathyroïdie (état dans lequel le corps ne produit pas suffisamment d'hormone parathyroïdienne); hypertension artérielle; ou tout trouble sanguin.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Le danazol peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- acné
- diminution de la taille des seins
- gain de poids
- peau ou cheveux gras
- rinçage
- transpiration
- sécheresse vaginale, brûlures, démangeaisons ou saignements
- nervosité
- irritabilité
- absence de cycle menstruel, saignotement ou changement du cycle menstruel

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou ceux énumérés dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT, appelez immédiatement votre médecin :

- voix plus grave, enrouement, mal de gorge, augmentation de la pilosité faciale, calvitie ou gonflement des bras ou des jambes (chez les femmes)
- peau rouge, écaillée ou boursouflée

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la lumière et de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Avant de subir un test de laboratoire, informez votre médecin et le personnel du laboratoire que vous prenez du danazol.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Danocrine®¶

¶ -Ce produit de marque n'est plus sur le marché. Des alternatives génériques peuvent être disponibles.

Dernière révision - 24/05/2017

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS® Renseignements pour les patients sur les médicaments MC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisée par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022