Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

MedlinePlus
Trusted Health Information for You

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614015.html

Dapagliflozine

prononcé comme (dap'' un gli floe' zin)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La dapagliflozine est utilisée avec un régime alimentaire et de l'exercice, et parfois avec d'autres médicaments, pour abaisser la glycémie chez les adultes atteints de diabète de type 2 (état dans lequel la glycémie est trop élevée parce que le corps ne produit pas ou n'utilise pas l'insuline normalement). Il est également utilisé pour réduire le risque d'avoir besoin d'être hospitalisé pour une insuffisance cardiaque chez les adultes atteints de diabète de type 2 avec une maladie cardiaque et vasculaire ou qui présentent de multiples facteurs de risque de développer une maladie cardiaque et vasculaire. La dapagliflozine est également utilisée chez les adultes souffrant d'insuffisance cardiaque pour réduire le risque d'hospitalisation et de décès dû à une maladie cardiaque et vasculaire. Il est également utilisé pour réduire le risque d'aggravation de la maladie rénale, la nécessité d'être hospitalisé pour une insuffisance cardiaque et le risque de décès dû à une maladie cardiaque chez les adultes atteints de maladie rénale. La dapagliflozine appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs du co-transporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2). Il abaisse la glycémie en obligeant les reins à se débarrasser de plus de glucose dans l'urine. La dapagliflozine n'est pas utilisée pour traiter le diabète de type 1 (état dans lequel le corps ne produit pas d'insuline et, par conséquent, ne peut pas contrôler la quantité de sucre dans le sang) ou l'acidocétose diabétique (une maladie grave qui peut se développer si l'hyperglycémie n'est pas traitée).

Au fil du temps, les personnes atteintes de diabète et d'hyperglycémie peuvent développer des complications graves ou potentiellement mortelles, notamment des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des problèmes rénaux, des lésions nerveuses et des problèmes oculaires. Prendre de la dapagliflozine, apporter des changements à votre mode de vie (p. ex. régime alimentaire, exercice physique, arrêter de fumer) et vérifier régulièrement votre glycémie peuvent vous aider à gérer votre diabète et à améliorer votre santé. Cette thérapie peut également réduire vos risques d'avoir une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou d'autres complications liées au diabète telles qu'une insuffisance rénale, des lésions nerveuses (engourdissement, jambes ou pieds froids ; diminution de la capacité sexuelle chez les hommes et les femmes), des problèmes oculaires, y compris des changements ou perte de vision, ou maladie des gencives. Votre médecin et d'autres professionnels de la santé vous parleront de la meilleure façon de gérer votre diabète.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

La dapagliflozine se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il est généralement pris avec ou sans nourriture une fois par jour. Prenez la dapagliflozine à peu près à la même heure chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez la dapagliflozine exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Votre médecin peut vous prescrire une faible dose de dapagliflozine et augmenter votre dose si nécessaire.

La dapagliflozine aide à contrôler votre état, mais ne le guérit pas. Continuez à prendre la dapagliflozine même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre la dapagliflozine sans en parler à votre médecin.

Votre médecin ou votre pharmacien vous remettra la fiche d'information patient du fabricant (Guide des médicaments) au début du traitement par la dapagliflozine et à chaque renouvellement de votre ordonnance. Lisez attentivement les informations et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions. Vous pouvez également visiter le site Web de la Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) pour obtenir le Guide des médicaments.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre la dapagliflozine,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la dapagliflozine, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients contenus dans les comprimés de dapagliflozine. Demandez à votre pharmacien ou consultez le Guide des médicaments pour une liste des ingrédients.
- informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) tels que le bénazépril (Lotensin, dans Lotrel), le captopril, l'énalapril (Vasotec, dans Vaseretic), le fosinopril, le lisinopril (dans Zestoretic), le moexipril (Univasc, dans Uniretic), perindopril (Aceon, à Prestalia), ramipril (Altace) et trandolapril (Mavik, à Tarka); les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine (ARB) tels que l'azilsartan (Edarbi, dans Edarbyclor), le candésartan (Atacand, dans Atacand HCT), l'éprosartan (Teveten), l'irbésartan (Avapro, dans Avalide), le losartan (Cozaar, dans Hyzaar), l'olmésartan (Benicar, à Azor, à Benicar HCT, à Tribenzor), telmisartan (Micardis, à Micardis HCT, à Twynsta) ; l'aspirine et d'autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) tels que l'ibuprofène (Advil, Motrin) et le naproxène (Aleve, Naprosyn); les médicaments contre le diabète tels que le glimépiride (Amaryl, dans Duetact), le glipizide (Glucotrol), le glyburide (DiaBeta, Glynase), le répaglinide (Prandin, dans Prandimet) et le tolbutamide ; diurétiques ("pilules d'eau"); et l'insuline.
- informez votre médecin si vous êtes sous dialyse. Votre médecin peut vous dire de ne pas prendre de dapagliflozine.
- informez votre médecin si vous buvez régulièrement de l'alcool ou buvez parfois de grandes quantités d'alcool en peu de temps (consommation excessive d'alcool) ou si vous suivez un régime pauvre en sodium. Informez également votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une insuffisance cardiaque, une maladie du pancréas, y compris une pancréatite (gonflement du pancréas) ou si vous avez subi une intervention chirurgicale sur votre pancréas, des infections des voies urinaires ou des problèmes pour uriner, une pression artérielle basse, des infections à levures dans la région génitale, maladie rénale ou hépatique. Si vous êtes un homme, informez votre médecin si vous n'avez jamais été circoncis. Informez également votre médecin si vous mangez moins en raison d'une maladie, d'une intervention chirurgicale ou d'un changement dans votre alimentation, ou si vous avez récemment eu de la diarrhée, des vomissements, si vous n'avez pas bu suffisamment de liquides, si vous êtes resté trop longtemps au soleil ou si vous avez beaucoup transpiré. , ce qui peut provoquer une déshydratation (perte d'une grande quantité de fluides corporels).
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. N'allaitez pas pendant que vous prenez de la dapagliflozine. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez de la dapagliflozine, appelez votre médecin.
- si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez de la dapagliflozine. Votre médecin vous dira probablement d'arrêter de prendre la dapagliflozine au moins 3 jours avant une intervention chirurgicale.

- l'alcool peut entraîner une modification de la glycémie. Demandez à votre médecin comment utiliser en toute sécurité des boissons alcoolisées pendant que vous prenez de la dapagliflozine.
- vous devez savoir que la dapagliflozine peut provoquer des étourdissements, des étourdissements et des évanouissements lorsque vous vous levez trop rapidement d'une position allongée. Si vous avez ce problème, appelez votre médecin. Ce problème est plus fréquent lorsque vous commencez à prendre de la dapagliflozine. Pour éviter ce problème, sortez lentement du lit, en posant vos pieds sur le sol pendant quelques minutes avant de vous lever.
- demandez à votre médecin quoi faire si vous tombez malade, développez une infection ou de la fièvre, ressentez un stress inhabituel ou êtes blessé. Ces conditions peuvent affecter votre glycémie et la quantité de dapagliflozine dont vous pourriez avoir besoin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Assurez-vous de suivre toutes les recommandations d'exercice et diététiques faites par votre médecin ou votre diététiste. Il est important d'avoir une alimentation saine et de faire de l'exercice régulièrement.

Suivez les instructions de votre médecin concernant la consommation de suffisamment de liquides tout au long de la journée pendant que vous prenez ce médicament.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Ce médicament peut entraîner des modifications de votre glycémie. Vous devez connaître les symptômes de l'hypoglycémie et de l'hyperglycémie et savoir quoi faire si vous présentez ces symptômes.

La dapagliflozine peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- uriner beaucoup, y compris la nuit
- augmentation de la soif

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez immédiatement votre médecin :

- miction fréquente, urgente, brûlante ou douloureuse
- urine trouble, rouge, rose ou brune
- urine à forte odeur
- diminution de la quantité d'urine
- douleur pelvienne ou rectale
- (chez les femmes) odeur vaginale, pertes vaginales blanches ou jaunâtres (peuvent être grumeleuses ou ressembler à du fromage cottage) ou démangeaisons vaginales

- (chez les hommes) rougeur, démangeaisons ou gonflement du pénis ; éruption cutanée sur le pénis; écoulement nauséabond du pénis; ou douleur dans la peau autour du pénis
- se sentir fatigué, faible ou mal à l'aise; avec fièvre et douleur, sensibilité, rougeur et gonflement des organes génitaux ou de la zone située entre les organes génitaux et le rectum
- gonflement des jambes ou des pieds

Si vous présentez l'un des symptômes suivants, arrêtez de prendre la dapagliflozine et appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

- éruption
- urticaire
- démangeaison
- difficulté à respirer ou à avaler
- gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres, de la bouche ou des yeux
- enrouement

Si vous ressentez l'un des symptômes suivants d'acidocétose, arrêtez de prendre la dapagliflozine et appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence. Si possible, vérifiez la présence de corps cétoniques dans vos urines si vous présentez ces symptômes, même si votre glycémie est inférieure à 250 mg/dL :

- nausée
- vomissement
- douleur dans la région de l'estomac
- fatigue
- difficulté à respirer

La dapagliflozine peut provoquer d'autres effets indésirables. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA). (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité

et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit qui est haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira probablement certains tests de laboratoire avant et pendant votre traitement pour vérifier la réponse de votre corps à la dapagliflozine.

Votre glycémie doit être contrôlée régulièrement pour déterminer votre réponse à la dapagliflozine. Votre médecin prescrira d'autres tests de laboratoire, y compris l'hémoglobine glycosylée (HbA1c), pour vérifier votre réponse à la dapagliflozine. Votre médecin vous indiquera également comment vérifier votre réponse à ce médicament en mesurant votre glycémie à domicile. Suivez attentivement ces instructions.

Avant de subir tout test de laboratoire, informez votre médecin et le personnel du laboratoire que vous prenez de la dapagliflozine. En raison de la façon dont ce médicament agit, votre urine peut être testée positive pour le glucose.

Vous devez toujours porter un bracelet d'identification du diabète pour être sûr d'obtenir un traitement approprié en cas d'urgence.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Farxiga®

noms et noms de produits combinés

- Qtern®(contenant de la dapagliflozine, de la saxagliptine)
- Qternmet®XR (contenant de la dapagliflozine, de la metformine, de la saxagliptine)
- Xigduo®XR (contenant Dapagliflozine, Metformine)

Dernière révision - 15/07/2021

Apprenez à citer cette page

Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022