Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605039.html

Darifenacin

pronunțat ca (dar ee fen' a sin)

de ce este prescris acest medicament?

Darifenacin este utilizat pentru a trata o vezică hiperactivă (o afecțiune în care mușchii vezicii urinare se contractă necontrolat și provoacă urinare frecventă, nevoie urgentă de a urina și incapacitatea de a controla urinarea). Darifenacina face parte dintr-o clasă de medicamente numite antimuscarinici. Funcționează prin relaxarea mușchilor vezicii urinare pentru a preveni urinarea urgentă, frecventă sau necontrolată.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Darifenacin vine sub formă de comprimat cu eliberare prelungită (cu acțiune prelungită) de administrat pe cale orală. De obicei, se ia o dată pe zi cu mult lichid. Acest medicament poate fi luat cu sau fără alimente. Luați darifenacin aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați darifenacin exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Înghițiți comprimatele întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți.

Medicul dumneavoastră vă va începe să utilizați o doză mică de darifenacină și vă poate crește doza după 2 săptămâni.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua darifenacină,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la darifenacină sau la orice alte medicamente.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: antidepresive precum amitriptilina (Elavil), amoxapină (Asendin), clomipramină (Anafranil), desipramină (Norpramin), doxepină (Adapin, Sinequan), imipramină (Tofranil), nortriptilină (Aventyl, Pamelor) , protriptilină (Vivactil) și trimipramină (Surmontil); antihistaminice; claritromicină (Biaxin); flecainidă (Tambocor); ipratropiu (Atrovent); itraconazol (Sporanox); ketoconazol

(Nizoral); medicamente pentru boala intestinului iritabil, răul de mișcare, boala Parkinson, ulcere sau probleme urinare; nefazodonă (Serzone); nelfinavir (Viracept); ritonavir (Norvir); și tioridazină (Mellaril). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată obstrucție urinară (un blocaj al urinei care curge din vezică), orice tip de blocaj la nivelul sistemului digestiv, hipertrofie benignă de prostată (mărirea prostatei), constipație severă, colită ulcerativă (un afecțiune care provoacă umflături și răni la nivelul mucoasei colonului [intestinul gros] și rect), miastenia gravis (o tulburare a sistemului nervos care provoacă slăbiciune musculară), glaucom sau boală hepatică.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați darifenacin, adresați-vă medicului dumneavoastră.
- dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați darifenacină.
- trebuie să știți că darifenacina poate provoca vedere încețoșată sau vă poate ameți. Nu conduceți o mașină și nu utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.
- trebuie să știți că darifenacina determină scăderea transpirației, ceea ce poate provoca prosternare la căldură (colaps din cauza temperaturii ridicate a corpului) pe vreme caldă.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Omiteți doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați două doze în aceeași zi sau o doză dublă pentru a compensa o doză omisă.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Darifenacina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

- gură uscată
- constipație
- stomac deranjat
- dureri de stomac
- diaree
- slăbiciune
- ochi uscați

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră:

- dificultate la urinare sau imposibilitatea de a urina
- durere arzătoare în timpul urinării

- eczemă
- mâncărime

Darifenacina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon (1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

- probleme de vedere

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitamine, minerale sau alte diete.

suplimente. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

- Enablex®

Ultima revizuire - 15.06.2016

Aflați cum să citați această pagină

Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022