Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.



Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682289.html

# ダウノルビシン

**（daw'' noe roo'bi sin）と発音します**

## 重要な警告：

ダウノルビシンの注射は、癌の化学療法薬の投与経験のある医師の監督下で病院または医療施設で行う必要があります。

ダウノルビシンは、治療中または治療終了後数か月から数年後のいつでも、深刻なまたは生命を脅かす心臓の問題を引き起こす可能性があります。医師は、治療前と治療中に、ダウノルビシンを安全に投与するのに十分な心臓の働きがあるかどうかを確認するための検査を命じます。これらの検査には、心電図（ECG;心臓の電気的活動を記録する検査）と心エコー検査（音波を使用して心臓の血液を送り出す能力を測定する検査）が含まれる場合があります。心臓の血液を送り出す能力が低下していることがテストで示された場合、医師はこの薬を服用してはならないと言うかもしれません。胸部に何らかの種類の心臓病または放射線（X線）療法を受けたことがあるか、または受けたことがあるかどうかを医師に伝えてください。ドキソルビシン（ドキシル）、エピルビシン（エレンス）、イダルビシン（イダマイシン）、ミトキサントロン（ノバントロン）、シクロホスファミド（シトキサン）、トラスツズマブ（ハーセプチン）などの特定のがん化学療法薬を服用している、または服用したことがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。息切れ。呼吸困難; 手、足、足首または下肢の腫れ; または速い、不規則な、またはドキドキする心拍。

ダウノルビシンは、骨髄中の血球数を大幅に減少させる可能性があります。これは特定の症状を引き起こす可能性があり、深刻な感染症や出血を発症するリスクを高める可能性があります。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。発熱、喉の痛み、進行中の咳やうっ血、またはその他の感染症の兆候。異常な出血またはあざ。

腎臓病や肝臓病を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。腎臓や肝臓の病気がある場合は、医師が用量を調整する必要があるかもしれません。

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。あなたの医者はダウノルビシンに対するあなたの体の反応をチェックするために特定のテストを命じます。

## なぜこの薬が処方されているのですか？

ダウノルビシンは、特定の種類の急性骨髄性白血病（AML、白血球のがんの一種）を治療するために他の化学療法薬と併用されます。ダウノルビシンは、特定の種類の急性リンパ性白血病（ALL;白血球のがんの一種）を治療するために他の化学療法薬と一緒に使用されます。ダウノルビシンは、アントラサイクリンと呼ばれる薬のクラスに含まれています。それはあなたの体の癌細胞の成長を遅らせるか、または止めることによって働きます。

## わあ、この薬を使うべきですか？

ダウノルビシンは、他の化学療法薬と一緒に医療施設の医師または看護師によって静脈内（静脈内）に注入される液体（液体）または液体と混合される粉末として提供されます。ダウノルビシンがAMLの治療に使用される場合、通常、治療期間の特定の日に1日1回注射されます。ダウノルビシンを使用してALLを治療する場合、通常は週に1回注射されます。治療期間は、服用している薬の種類、体がそれらにどれだけうまく反応するか、そしてあなたが持っている癌の種類によって異なります。

薬剤師または医師に、患者に関する製造元の情報のコピーを依頼してください。

## この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

## 特別な注意事項に従う必要がありますか？

### ダウノルビシン注射を受ける前に、

- ダウノルビシン、他の薬、またはダウノルビシン注射の成分のいずれかにアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。
- あなたが服用している、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、およびハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。重要な警告のセクションに記載されている薬剤と、アザチオプリン（Imuran）、シクロスポリン（Neoral、Sandimmune）、メトトレキサート（Rheumatrex、Trexall）、シロリムス（Rapamune）、およびタクロリムス（Prograf）のいずれかに必ず言及してください。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。他の薬もダウノルビシンと相互作用する可能性があるため、このリストに記載されていない薬も含め、服用しているすべての薬について医師に必ず伝えてください。
- 何らかの病状があるか、またはこれまでに経験したことがあるかどうかを医師に伝えてください。
- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。ダウノルビシン注射を受けている間は妊娠しないでください。ダウノルビシンの投与中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。ダウノルビシンは胎児に害を及ぼす可能性があります。

## 特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

### この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

**ダウノルビシンは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。**

- 吐き気
- 嘔吐
- 口と喉の痛み
- 下痢
- 胃痛
- 脱毛
- 赤い尿

**いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状または重要な警告のセクションに記載されている症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。**

- 注射を行った部位の発赤、痛み、腫れ、または灼熱感
- 発疹
- じんましん
- かゆみ
- 呼吸困難または嚥下困難

ダウノルビシンは、他の癌を発症するリスクを高める可能性があります。この薬を服用するリスクについて医師に相談してください。

ダウノルビシンは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話（1-800-332-1088）。

## n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

### 他の情報を知っておく必要がありますか？

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

## ランド名

- セルビジン®

## それらの名前

- ダウノマイシン
- ルビドマイシン

最終改訂日-2011年12月15日

このページを引用する方法を学ぶ

American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項
AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省
国立衛生研究所
ページの最終更新日：2022年3月25日