Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682289.html

Daunorubicin

ออกเสียงว่า (daw '' noe roo' bi sin)

คำเตือนที่สำคัญ:

ต้องฉีด Daunorubicin ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภายใต้การดูแลของแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการให้ยาเคมีบำบัดสำหรับโรคมะเร็ง

Daunorubicin อาจทำให้เกิดปัญหาหัวใจที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ตลอดเวลาระหว่างการรักษาของคุณหรือหลายเดือนถึงหลายปีหลังจากการรักษาของคุณสิ้นสุดลง แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบก่อนและระหว่างการรักษาของคุณเพื่อดูว่าหัวใจของคุณทำงานได้ดีเพียงพอสำหรับคุณที่จะได้รับ Daunorubicin อย่างปลอดภัยหรือไม่ การทดสอบเหล่านี้อาจรวมถึงการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG; การทดสอบที่บันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ) และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (การทดสอบที่ใช้คลื่นเสียงเพื่อวัดความสามารถของหัวใจในการสูบฉีดเลือด) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าคุณไม่ควรได้รับยานี้หากการทดสอบแสดงความสามารถของหัวใจในการสูบฉีดเลือดลดลง แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจหรือการฉายรังสี (x-ray) ชนิดใดก็ตามที่บริเวณหน้าอก แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณเคยใช้หรือเคยได้รับยาเคมีบำบัดมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin (Doxil), epirubicin (Ellence), idarubicin (Idamycin) หรือ mitoxantrone (Novantrone), cyclophosphamide (Cytoxan) หรือ trastuzumab (Herceptin) . หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: หายใจถี่; หายใจลำบาก; อาการบวมที่มือ เท้า ข้อเท้าหรือขาท่อนล่าง หรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

Daunorubicin อาจทำให้จำนวนเซลล์เม็ดเลือดในไขกระดูกของคุณลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการบางอย่างและอาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเกิดการติดเชื้อรุนแรงหรือมีเลือดออก หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: มีไข้ เจ็บคอ ไอและคัดจมูกอย่างต่อเนื่อง หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ มีเลือดออกผิดปกติหรือช้ำ

แจ้งแพทย์หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตหรือตับ แพทย์ของคุณอาจต้องปรับขนาดยาหากคุณเป็นโรคไตหรือตับ

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ Daunorubicin

hy เป็นยานี้กำหนด?

Daunorubicin ใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ (AML; มะเร็งชนิดหนึ่งของเซลล์เม็ดเลือดขาว) Daunorubicin ยังใช้กับยาเคมีบำบัดอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันกลุ่มลิมโฟซิติก (ALL; มะเร็งชนิดหนึ่งของเซลล์เม็ดเลือดขาว) Daunorubicin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า anthracyclines มันทำงานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Daunorubicin มาในรูปแบบสารละลาย (ของเหลว) หรือเป็นผงสำหรับผสมกับของเหลวเพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดำ (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือพยาบาลในสถานพยาบาลพร้อมกับยาเคมีบำบัดอื่น ๆ เมื่อใช้ Daunorubicin เพื่อรักษา AML มักถูกฉีดวันละครั้งในบางวันของระยะเวลาการรักษาของคุณ เมื่อใช้ Daunorubicin เพื่อรักษา ALL มักถูกฉีดสัปดาห์ละครั้ง ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของยาที่คุณกำลังใช้ ร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาเหล่านี้ได้ดีเพียงใด และชนิดของมะเร็งที่คุณเป็น

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสำเนาข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับผู้ป่วย

ใช้สำหรับยานี้

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดดอโนรูบิซิน

- แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ Daunorubicin ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีด Daunorubicin สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคำเตือนที่สำคัญและสิ่งต่อไปนี้: azathioprine (Imuran), cyclosporine (Neoral, Sandimmune), methotrexate (Rheumatrex, Trexall), sirolimus (Rapamune) และ tacrolimus (Prograf) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อาจมีผลต่อ daunorubicin ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ แม้กระทั่งยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

- แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณมีหรือเคยมีอาการป่วยใด ๆ
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภ์ในขณะที่คุณได้รับการฉีด Daunorubicin หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับ Daunorubicin ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Daunorubicin อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

Daunorubicin อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- คลื่นไส้
- อาเจียน
- แผลในปากและลำคอ
- ท้องเสีย
- อาการปวดท้อง
- ผมร่วง
- ปัสสาวะสีแดง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคำเตือนที่สำคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

- แดง ปวด บวม หรือแสบร้อนบริเวณที่ฉีดยา
- ผื่น
- ลมพิษ
- อาการคัน
- หายใจลำบากหรือกลืนลำบาก

Daunorubicin อาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้

Daunorubicin อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

ท กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

- เซรูบิดีน®

ชื่อของเธอ

- Daunomycin
- รูบิโดมัยซิน

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2554

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ

สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022