Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682289.html

柔红霉素

发音为 (daw'' noe roo' bi sin)

重要警告：

柔红霉素注射液必须在医院或医疗机构进行，并在有为癌症给予化疗药物经验的医生的监督下进行。

柔红霉素可能会在您治疗期间的任何时间或治疗结束后的数月至数年内导致严重或危及生命的心脏问题。您的医生会在您治疗前和治疗期间下令进行检查，以查看您的心脏是否运作良好，足以让您安全地接受柔红霉素。这些测试可能包括心电图（ECG；记录心脏电活动的测试）和超声心动图（使用声波测量心脏泵血能力的测试）。如果测试显示您的心脏泵血能力下降，您的医生可能会告诉您不应接受这种药物。如果您有或曾经有过任何类型的心脏病或胸部放射（X 射线）治疗，请告诉您的医生。如果您正在服用或曾经接受过某些癌症化疗药物，如多柔比星 (Doxil)、表柔比星 (Ellence)、伊达比星 (Idamycin) 或米托蒽醌 (Novantrone)、环磷酰胺 (Cytoxan) 或曲妥珠单抗 (Herceptin)，请告诉您的医生和药剂师. 如果您出现以下任何症状，请立即致电您的医生： 呼吸急促；呼吸困难; 手、脚、脚踝或小腿肿胀；或快速、不规则或剧烈的心跳。

柔红霉素可导致骨髓中血细胞数量严重减少。这可能会导致某些症状，并可能增加您发生严重感染或出血的风险。如果您出现以下任何症状，请立即就医：发烧、喉咙痛、持续咳嗽和充血或其他感染迹象；异常出血或瘀伤。

如果您患有或曾经患有肾脏或肝脏疾病，请告诉您的医生。如果您患有肾脏或肝脏疾病，您的医生可能需要调整您的剂量。

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生会下令进行某些测试，以检查您的身体对柔红霉素的反应。

为什么要开这种药?

柔红霉素与其他化疗药物一起用于治疗某种类型的急性髓性白血病（AML；一种白细胞癌）。柔红霉素还与其他化疗药物一起用于治疗某种类型的急性淋巴细胞白血病（ALL；一种白细胞癌）。柔红霉素属于一类称为蒽环类药物的药物。它的作用是减缓或阻止体内癌细胞的生长。

这个药应该怎么用？

柔红霉素以溶液（液体）或粉末形式出现，与液体混合，由医疗机构的医生或护士连同其他化疗药物一起静脉注射（进入静脉）。当柔红霉素用于治疗 AML 时，通常在治疗期间的某些日子每天注射一次。当柔红霉素用于治疗 ALL 时，通常每周注射一次。治疗时间长短取决于您服用的药物类型、您的身体对药物的反应程度以及您患的癌症类型。

向您的药剂师或医生索取患者的制造商信息副本。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施？

在接受柔红霉素注射前，

- 如果您对柔红霉素、任何其他药物或柔红霉素注射液中的任何成分过敏，请告诉您的医生和药剂师。向您的药剂师索取成分清单。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及重要警告部分中列出的药物和以下任何药物：硫唑嘌呤 (Imuran)、环孢素 (Neoral、Sandimmune)、甲氨蝶呤 (Rheumatrex、Trexall)、西罗莫司 (Rapamune) 和他克莫司 (Prograf)。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。其他药物也可能与柔红霉素相互作用，因此请务必告诉您的医生您正在服用的所有药物，即使是未出现在此列表中的药物。
- 如果您有或曾经有任何健康状况，请告诉您的医生。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。您在接受柔红霉素注射时不应怀孕。如果您在接受柔红霉素期间怀孕，请致电您的医生。柔红霉素可能会伤害胎儿。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

这种药物会引起副作用吗？

柔红霉素可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 恶心
- 呕吐
- 口腔和喉咙痛
- 腹泻
- 肚子痛
- 脱发
- 红色尿液

一些副作用可能很严重。如果您遇到任何这些症状或重要警告部分中列出的症状，请立即致电您的医生：

- 注射部位发红、疼痛、肿胀或灼热
- 皮疹
- 麻疹
- 瘙痒
- 呼吸或吞咽困难

柔红霉素可能会增加您患其他癌症的风险。与您的医生讨论服用这种药物的风险。

柔红霉素可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告 (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. 如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

我应该知道其他信息吗？

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 冰柔比啶®

其他名字

- 道诺霉素
- 红霉素

最后修订 - 2011 年 12 月 15 日

了解如何引用此页面

美国卫生系统药剂师协会免责声明

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022 年 3 月 25 日