Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

MedlinePlus
Trusted Health Information for You

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612016.html

Deferipron

uttalas som (de fer' i prone)

VIKTIG VARNING:

Deferipron kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar som bildas av din benmärg. Vita blodkroppar hjälper din kropp att bekämpa infektioner, så om du har ett lågt antal vita blodkroppar är risken större att du utvecklar en allvarlig eller livshotande infektion. Berätta för din läkare om alla mediciner du tar, eftersom att ta vissa andra mediciner tillsammans med deferipron kan öka risken för att antalet vita blodkroppar minskar. Om du upplever något av följande symtom på infektion, sluta ta deferipron och kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk hjälp: feber, ont i halsen, munsår, influensaliknande symtom, frossa eller kraftiga skakningar.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester, inklusive tester för att kontrollera ditt antal vita blodkroppar före behandlingen och minst en gång i veckan under behandlingen.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) när du påbörjar behandling med deferipron och varje gång du fyller på ditt recept. Läs informationen noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan också besöka Food and Drug Administration (FDA) webbplats (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

Tala med din läkare om riskerna med att ta deferipron.

hur är denna medicin utskriven?

Deferipron används för att avlägsna överskott av järn i kroppen hos vuxna och barn från 3 år och äldre som har talassemi (ett ärftligt tillstånd som orsakar ett lågt antal röda blodkroppar). Det används också för att avlägsna överskott av järn hos vuxna och barn från 3 år och äldre med sicklecellssjukdom (en ärftlig blodsjukdom) eller andra typer av anemi (ett lägre antal röda blodkroppar än normalt).

Deferipron är i en klass av mediciner som kallas järnkelatorer. Det fungerar genom att det fäster på järn i kroppen så att det kan utsöndras (avlägsnas från kroppen).

hur ska detta läkemedel användas?

Deferipron kommer som en tablett och som oral lösning (vätska) att ta genom munnen. Det tas vanligtvis två eller tre gånger dagligen. Deferipron kan tas med eller utan mat, men att ta det med måltider kan hjälpa till att förhindra illamående och kräkningar som kan orsakas av medicinen. Ta deferipron vid ungefär samma tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta deferipron exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Om din dos innehåller hälften av en tablett, dela en tablett försiktigt på skåran.

Använd mätbägaren som medföljer lösningen för att mäta din dos. Tillsätt din dos i den medföljande måttbägaren och drick den. Tillsätt sedan 2 till 3 teskedar (10 till 15 mL) vatten till mätbägaren, virvla försiktigt runt den för att blanda vattnet med eventuellt kvarvarande läkemedel i koppen och drick blandningen. Handtvätt mätkoppen med vatten efter användning.

Din läkare kan justera din dos av deferipron varannan till var tredje månad beroende på dina laboratorietestresultat.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar deferipron,

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot deferipron, andra läkemedel eller något av innehållsämnena i deferiprontabletter eller oral lösning. Fråga din apotekspersonal eller se läkemedelsguiden för en lista över ingredienserna.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: diklofenak (Kambia, Cataflam), diuretika (vattenpiller) eller probenecid (Probalan). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
- om du tar antacida, multivitaminer eller järn- eller zinktillskott, ta dem 4 timmar före eller 4 timmar efter att du tagit deferipron.
- berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt mjölktistel.
- tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft ett förlängt QT-intervall (ett sällsynt hjärtproblem som kan orsaka oregelbunden hjärtslag, svimning eller plötslig död), långsam hjärtrytm, hjärtsvikt eller andra hjärtproblem, låga nivåer av kalium eller magnesium i ditt blod, eller njur- eller leversjukdom.
- tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller om du planerar att skaffa barn. Du eller din partner ska inte bli gravid medan du får deferipron. Om du är en kvinna som kan bli gravid måste du ta ett graviditetstest innan behandlingen påbörjas och använda effektiv preventivmedel under din behandling och i 6 månader efter din sista dos. Om du är man,

du och din kvinnliga partner ska använda preventivmedel under din behandling och i 3 månader efter din sista dos. Om du blir gravid medan du tar deferipron, kontakta din läkare omedelbart. Deferipron kan skada fostret.

- tala om för din läkare om du ammar. Din läkare kan säga till dig att inte amma under din behandling och under 2 veckor efter din sista dos.
- undvik alkoholhaltiga drycker medan du tar deferipron. Alkohol kan göra biverkningarna av deferipron värre.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Deferipron kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

- illamående
- kräkningar
- halsbränna
- magont
- diarre
- ökad eller minskad aptit
- viktökning
- smärta i armar, ben, rygg eller leder
- huvudvärk
- röd eller brun missfärgning av urin

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de som anges i avsnittet VIKTIG VARNING, ring din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

- rödlila fläckar eller utslag, särskilt på nedre delen av kroppen; svullna och ömma leder; magsmärtor eller blodig urin
- nässelfeber
- svullnad runt ögonen
- snabba eller bultande hjärtslag

- yrsel
- yrsel
- svimning
- anfall

Deferipron kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur och borta från ljus, överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Efter att ha öppnat flaskan med oral lösning, kassera den och eventuell oanvänd oral lösning efter 35 dagar.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera:

- dubbel syn
- okontrollerbara ögonrörelser
- ovanliga, långsamma eller okontrollerbara rörelser av någon del av kroppen

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa laboratorietester för att kontrollera din kropps svar på deferipron.

Din urin kan få en röd eller brun färg; denna effekt är vanlig och inte skadlig.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

- Ferriprox

Senast reviderad - 2021-08-15

Lär dig hur du citerar den här sidan

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists ®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022