Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612016.html

去铁酮

发音为 (de fer' i 倾向)

重要警告：

去铁酮可能会导致骨髓产生的白细胞数量减少。白细胞帮助您的身体抵抗感染，因此，如果您的白细胞数量较少，您患上严重或危及生命的感染的风险就会更高。告诉您的医生您正在服用的所有药物，因为与去铁酮一起服用某些其他药物可能会增加您的白细胞计数减少的风险。如果您出现以下任何感染症状，请停止服用去铁酮并立即致电您的医生或寻求紧急医疗帮助：发烧、喉咙痛、口腔溃疡、流感样症状、发冷或剧烈颤抖。

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生会下令进行某些实验室检查，包括在治疗前检查您的白细胞计数以及在治疗期间至少每周检查一次。

当您开始使用去铁酮治疗以及每次重新配药时，您的医生或药剂师都会给您制造商的患者信息表（药物指南）。仔细阅读信息，如有任何问题，请咨询您的医生或药剂师。您也可以访问美国食品和药物管理局 (FDA) 网站

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 或制造商的网站获取用药指南。

与您的医生讨论服用去铁酮的风险。

为什么要开这种药？

Deferiprone 用于去除患有地中海贫血（一种导致红细胞数量少的遗传性疾病）的成人和 3 岁及以上儿童体内多余的铁。它还用于去除患有镰状细胞病（一种遗传性血液病）或其他类型的贫血（红细胞数量低于正常值）的成人和 3 岁及以上儿童的过量铁。

Deferiprone 属于一类称为铁螯合剂的药物。它通过附着在体内的铁上而起作用，以便可以将其排出（从体内去除）。

这个药应该怎么用？

Deferiprone 以片剂和口服溶液（液体）的形式出现。通常每天服用两到三次。Deferiprone 可以在有或没有食物的情况下服用，但随餐服用可能有助于预防可能由药物引起的恶心和呕吐。每天大约在同一时间服用去铁酮。仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用去铁酮。不要多吃或少吃，也不要比医生开的更频繁。

如果您的剂量包括半片药片，请在分数标记上小心地分开一片药片。

使用随溶液提供的量杯来测量您的剂量。将您的剂量添加到提供的量杯中并饮用。然后，在量杯中加入 2 至 3 茶匙（10 至 15 毫升）的水，轻轻旋转量杯，将水与杯中剩余的药物混合，然后饮用。使用后用水手洗量杯。

您的医生可能会根据您的实验室测试结果每 2 到 3 个月调整一次去铁酮的剂量。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施？

在服用去铁酮之前，

- 如果您对去铁酮、任何其他药物或去铁酮片剂或口服溶液中的任何成分过敏，请告诉您的医生和药剂师。请咨询您的药剂师或查看药物指南以获取成分列表。

- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用哪些处方药和非处方药、维生素和营养补充剂。请务必提及以下任何一项：双氯芬酸（Cambia，Cataflam）、利尿剂（水丸）或丙磺舒（Probalan）。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。

- 如果您正在服用抗酸剂、复合维生素或铁或锌补充剂，请在服用去铁酮前 4 小时或服用去铁酮后 4 小时服用。
- 告诉您的医生您正在服用什么草药产品，尤其是奶蓟草。
- 如果您有或曾经有过 QT 间期延长（一种罕见的心脏问题，可能导致心律不齐、昏厥或猝死）、心跳缓慢、心力衰竭或其他心脏问题、钾或镁水平低，请告诉您的医生在您的血液、肾脏或肝脏疾病中。

- 如果您怀孕、计划怀孕或计划生育孩子，请告诉您的医生。在您接受去铁酮治疗期间，您或您的伴侣不应怀孕。如果您是能够怀孕的女性，您必须在开始治疗前进行妊娠试验，并在治疗期间和最后一次服药后的 6 个月内使用有效的避孕措施。如果你是男性，

您和您的女性伴侣应在治疗期间和最后一次服药后的 3 个月内使用避孕措施。如果您在服用去铁酮期间怀孕，请立即致电您的医生。去铁酮可能会伤害胎儿。

- 如果您正在母乳喂养，请告诉您的医生。您的医生可能会告诉您在治疗期间和最后一次服药后的 2 周内不要进行母乳喂养。
- 服用去铁酮时避免饮酒。酒精会使去铁酮的副作用更严重。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果快到下一次服药的时间了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

去铁酮可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 恶心
- 呕吐
- 胃灼热
- 肚子痛
- 腹泻
- 食欲增加或减少
- 体重增加
- 手臂、腿部、背部或关节疼痛
- 头痛
- 尿液呈红色或棕色变色

一些副作用可能很严重。如果您遇到任何这些症状或“重要警告”部分中列出的症状，请立即致电您的医生或接受紧急医疗：

- 红紫色斑点或皮疹，特别是在身体的下半部分; 关节肿胀和疼痛；胃痛或血尿
- 麻疹
- 眼睛周围肿胀
- 快速或剧烈的心跳

- 头晕
- 头晕目眩
- 昏厥
- 癫痫发作

Deferiprone 可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告 (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离光线、过热和潮湿（不要放在浴室里）。首次打开口服溶液瓶后，35 天后将其和任何未使用的口服溶液丢弃。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免受中毒，请始终锁上安全帽，并立即将药物放在安全的位置——一个向上、远离、看不见和够不到的地方。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. 如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

过量服用的症状可能包括：

- 双重视力
- 无法控制的眼球运动
- 身体任何部位的异常、减慢或无法控制的运动

我应该知道其他信息吗？

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生会下令进行实验室测试，以检查您的身体对去铁酮的反应。

您的尿液可能会变成红色或棕色；这种影响很常见，而且无害。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- Ferriprox

最后修订 - 2021 年 8 月 15 日

了解如何引用此页面

美国卫生系统药剂师协会免责声明

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制
用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部
美国国立卫生研究院
最后更新页面：2022 年 3 月 25 日