

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Demeclociclina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682103.html>

Demeclociclina

pronunciado como (dem e kloe sye' kleen)

por que este medicamento é prescrito?

A demeclociclina é usada para tratar infecções causadas por bactérias, incluindo pneumonia e outras infecções do trato respiratório; certas infecções da pele, olhos, sistema linfático, intestinal, genital e urinário; e algumas outras infecções que são transmitidas por carrapatos, piolhos, ácaros e animais infectados. Também é usado junto com outros medicamentos para tratar a acne. A demeclociclina também é usada para tratar peste e tularemia (infecções graves que podem se espalhar propositalmente como parte de um ataque bioterrorista). A demeclociclina também pode ser usada em pacientes que não podem ser tratados com penicilina para tratar certos tipos de intoxicação alimentar e antraz (uma infecção muito grave que pode se espalhar propositalmente como parte de um ataque bioterrorista). antibióticos. Funciona impedindo o crescimento e a propagação de bactérias.

Antibióticos como a demeclociclina não funcionam para resfriados, gripes ou outras infecções virais. O uso de antibióticos quando não são necessários aumenta o risco de contrair uma infecção mais tarde que resista ao tratamento com antibióticos.

como este medicamento deve ser usado?

A demeclociclina vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é tomado duas ou quatro vezes por dia. Beba um copo cheio de água com cada dose. Tome demeclociclina com o estômago vazio pelo menos 1 hora antes ou 2 horas após as refeições. Não tome demeclociclina com alimentos, especialmente laticínios, como leite, iogurte, queijo e sorvete. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome demeclociclina exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

outros usos para este medicamento

A demeclociclina também é usada às vezes para tratar a síndrome do hormônio antidiurético inadequado (SIADH; condição na qual o corpo produz muito de uma determinada substância natural que faz com que o corpo retenha água). Converse com seu médico sobre os riscos de usar este medicamento para sua condição.

Este medicamento às vezes é prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar demeclociclina,

- informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à demeclociclina, tetraciclina, minociclina, doxiciclina, qualquer outro medicamento ou qualquer um dos ingredientes dos comprimidos de demeclociclina. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar, especialmente anticoagulantes ("afinadores do sangue"), como varfarina (Coumadin, Jantoven) e penicilina. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
- esteja ciente de que antiácidos contendo magnésio, alumínio ou cálcio, suplementos de cálcio, produtos de ferro e laxantes contendo magnésio interferem na demeclociclina, tornando-a menos eficaz. Tome demeclociclina 2 horas antes ou 6 horas depois de antiácidos, suplementos de cálcio e laxantes contendo magnésio. Tome demeclociclina 2 horas antes ou 4 horas depois de preparações de ferro e produtos vitamínicos que contenham ferro.
- informe o seu médico se você tem ou já teve lúpus (condição na qual o sistema imunológico ataca muitos tecidos e órgãos, incluindo a pele, articulações, sangue e rins), ou doença renal ou hepática.
- você deve saber que a demeclociclina pode diminuir a eficácia dos contraceptivos hormonais (pílulas anticoncepcionais, adesivos, anéis ou injeções). Converse com seu médico sobre o uso de outra forma de controle de natalidade.
- informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto estiver a tomar demeclociclina, contacte o seu médico imediatamente. A demeclociclina pode prejudicar o feto.
- planeje evitar a exposição desnecessária ou prolongada à luz solar e usar roupas de proteção, óculos de sol e protetor solar. A demeclociclina pode tornar sua pele sensível à luz solar. Informe o seu médico imediatamente se tiver uma queimadura solar.
- você deve saber que quando a demeclociclina é usada durante a gravidez ou em bebês ou crianças até 8 anos de idade, pode causar manchas permanentes nos dentes. A demeclociclina não deve ser utilizada em crianças com menos de 8 anos de idade, a menos que o seu médico decida que é necessário.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perda.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A demeclociclina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- diarreia
- náusea
- vômito

- alterações na cor da pele ou da boca
- irritação na garganta
- sede excessiva
- micção frequente
- fraqueza
- inflamação da extremidade do pênis

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

- dor de cabeça
- visão turva, visão dupla ou perda de visão
- tontura
- zumbido nos ouvidos
- irritação na pele
- urticária
- pele descamação ou bolhas
- inchaço da face, garganta, língua, lábios e olhos
- dificuldade em respirar ou engolir
- sangramento ou hematomas incomuns
- confusão
- inchaço das pernas, tornozelos ou pés
- diminuição da micção
- dor nas articulações
- dor no peito
- fezes aquosas ou com sangue, cólicas estomacais ou febre durante o tratamento ou por até dois ou mais meses após a interrupção do tratamento
- um retorno de febre, dor de garganta, calafrios ou outros sinais de infecção

A demeclociclina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico solicitará alguns exames de laboratório para verificar sua resposta à demeclociclina.

Antes de fazer qualquer teste laboratorial, informe o seu médico e o pessoal do laboratório que está a tomar demeclociclina.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Sua receita provavelmente não é recarregável. Se você ainda tiver sintomas de infecção depois de terminar a demeclociclina, ligue para o seu médico.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Declomicina®¶

¶-Este produto de marca não está mais no mercado. Alternativas genéricas podem estar disponíveis.

Última revisão - 15/08/2017

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022