

[Acasă](#) → [Medicamente, plante și suplimente](#) → Demeclociclina

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682103.html>

Demeclociclina

pronunțat ca (dem e kloe sye' kleen)

de ce este prescris acest medicament?

Demeclociclina este utilizată pentru a trata infecțiile cauzate de bacterii, inclusiv pneumonia și alte infecții ale tractului respirator; anumite infecții ale pielii, ochilor, sistemelor limfatic, intestinal, genital și urinar; și anumite alte infecții care sunt răspândite de căpușe, păduchi, acarieni și animale infectate. De asemenea, este utilizat împreună cu alte medicamente pentru a trata acneea. Demeclociclina este, de asemenea, utilizată pentru a trata ciuma și tularemia (infecții grave care pot fi răspândite intenționat ca parte a unui atac bioteror). Demeclociclina poate fi, de asemenea, utilizată la pacienții care nu pot fi tratați cu penicilină pentru a trata anumite tipuri de intoxicații alimentare și antrax (o infecție foarte gravă care poate fi răspândită intenționat ca parte a unui atac bioteror), Demeclociclina face parte dintr-o clasă de medicamente numită tetraciclină. antibiotice. Acționează prin prevenirea creșterii și răspândirii bacteriilor.

Antibioticele precum demeclociclina nu vor funcționa pentru răceli, gripă sau alte infecții virale. Utilizarea antibioticelor atunci când acestea nu sunt necesare crește riscul de a obține o infecție mai târziu care rezistă tratamentului cu antibiotice.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Demeclociclina vine sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia de două sau patru ori pe zi. Bea un pahar plin de apă cu fiecare doză. Luați demeclociclină pe stomacul gol cu cel puțin 1 oră înainte sau 2 ore după masă. Nu luați demeclociclină cu alimente, în special cu produse lactate, cum ar fi laptele, iaurtul, brânza și înghețata. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați demeclociclină exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament

Demeclociclina este, de asemenea, uneori utilizată pentru a trata sindromul hormonului antidiuretic inadecvat (SIADH; afecțiune în care organismul produce prea mult dintr-o anumită substanță naturală care determină organismul să rețină apa). Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament este uneori prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua demeclociclină,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la demeclociclină, tetraciclină, minociclină, doxiciclină, orice alte medicamente sau oricare dintre ingredientele comprimatelor de demeclociclină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care intenționați să le luați, în special anticoagulante („diluante ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin, Jantoven) și penicilina. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.
- rețineți că antiacidele care conțin magneziu, aluminiu sau calciu, suplimentele de calciu, produsele din fier și laxativele care conțin magneziu interferează cu demeclociclină, făcând-o mai puțin eficientă. Luați demeclociclină cu 2 ore înainte sau 6 ore după antiacide, suplimente de calciu și laxative care conțin magneziu. Luați demeclociclină cu 2 ore înainte sau 4 ore după preparatele cu fier și produsele vitaminice care conțin fier.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată lupus (afecțiune în care sistemul imunitar atacă multe țesuturi și organe, inclusiv pielea, articulațiile, sângele și rinichii) sau boli ale rinichilor sau ficatului.
- trebuie să știți că demeclociclină poate scădea eficacitatea contraceptivelor hormonale (pilule contraceptive, plasturi, inele sau injecții). Discutați cu medicul dumneavoastră despre utilizarea unei alte forme de control al nașterii.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați demeclociclină, sunați imediat medicului dumneavoastră. Demeclociclină poate dăuna fătului.
- planificați pentru a evita expunerea inutilă sau prelungită la lumina soarelui și pentru a purta îmbrăcăminte de protecție, ochelari de soare și protecție solară. Demeclociclină vă poate face pielea sensibilă la lumina soarelui. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți o arsură solară.
- trebuie să știți că atunci când demeclociclină este utilizată în timpul sarcinii sau la bebeluși sau copii până la vârsta de 8 ani, poate provoca pătarea permanentă a dinților. Demeclociclină nu trebuie utilizată la copiii sub 8 ani decât dacă medicul dumneavoastră decide că este necesar.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Demeclociclină poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispere:

- diaree
- greață
- vărsături

- modificări ale culorii pielii sau gurii
- iritația gâtului
- sete excesivă
- Urinare frecventă
- slăbiciune
- inflamația capătului penisului

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

- durere de cap
- vedere încețoșată, vedere dublă sau pierderea vederii
- amețeală
- țiuit în urechi
- eczemă
- urticarie
- piele descuamată sau formată de vezicule
- umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor și ochilor
- dificultăți de respirație sau de înghițire
- sângerări sau vânătăi neobișnuite
- confuzie
- umflarea picioarelor, gleznelor sau picioarelor
- scăderea urinării
- dureri articulare
- dureri în piept
- scaune apoase sau sângeroase, crampe stomacale sau febră în timpul tratamentului sau până la două sau mai multe luni după întreruperea tratamentului
- o revenire a febrei, dureri în gât, frisoane sau alte semne de infecție

Demeclociclina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de raportare a evenimentelor adverse MedWatch al Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) sau la telefon (1-800-332-1088).

ce ar trebui să știi despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresa <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator pentru a verifica răspunsul dumneavoastră la demeclocicină.

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că luați demeclocicină.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Rețeta dumneavoastră probabil nu poate fi reîncărcată. Dacă mai aveți simptome de infecție după ce ați terminat tratamentul cu demeclocicină, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

- Declomicină®¶

¶ -Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.

Ultima revizuire - 15.08.2017

[Aflați cum să citați această pagină](#)



[Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii](#)

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022