

[Ev](#) → [İlaçlar, Otlar ve Takviyeler](#) → Demeklosiklin

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682103.html>

deklosiklin

(dem e kloe sye' kleen) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Demeclocycline, pnömoni ve diğer solunum yolu enfeksiyonları dahil olmak üzere bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır; cilt, göz, lenfatik, bağırsak, genital ve üriner sistemlerin belirli enfeksiyonları; ve keneler, bitler, akarlar ve enfekte hayvanlar tarafından yayılan diğer bazı enfeksiyonlar. Ayrıca akne tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Demeclocycline ayrıca veba ve tularemii (biyoterör saldırısının bir parçası olarak bilerek yayılabilen ciddi enfeksiyonlar) tedavi etmek için kullanılır. Demeclocycline, belirli gıda zehirlenmesi türlerini ve şarbonu (biyoterör saldırısının bir parçası olarak bilerek yayılabilen çok ciddi bir enfeksiyon) tedavi etmek için penisilin ile tedavi edilemeyen hastalarda da kullanılabilir. Demeclocycline, tetrasiklin adı verilen bir ilaç sınıfındadır. antibiyotikler. Bakterilerin büyümesini ve yayılmasını önleyerek çalışır.

Demeclocycline gibi antibiyotikler soğuk algınlığı, grip veya diğer viral enfeksiyonlarda işe yaramaz. Gerektiğinde antibiyotik kullanmak, daha sonra antibiyotik tedavisine direnen bir enfeksiyona yakalanma riskinizi artırır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Demeclocycline ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle günde iki veya dört kez alınır. Her dozda bir bardak su için. Demeclocycline'ı yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra aç karnına alın. Demeclocycline'ı yiyeceklerle, özellikle süt, yoğurt, peynir ve dondurma gibi süt ürünleri ile almayın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Demeclocycline'ı aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

bu ilacın kullanım alanları

Demeclocycline bazen uygunsuz antidiüretik hormon sendromunu (SIADH; vücudun su tutmasına neden olan belirli bir doğal maddeyi çok fazla ürettiği durum) tedavi etmek için de kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç bazen başka kullanımlar için reçete edilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Demeclocycline almadan önce,

- demeclocycline, tetracycline, minocycline, doxycycline, diğer ilaçlara veya demeclocycline tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
- doktorunuza ve eczacınıza, özellikle varfarin (Coumadin, Jantoven) ve penisilin gibi antikoagülanlar ("kan sulandırıcılar") gibi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve aldığınız veya almayı planladığınız bitkisel ürünleri söyleyin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.
- Magnezyum, alüminyum veya kalsiyum içeren antasitler, kalsiyum takviyeleri, demir ürünleri ve magnezyum içeren laksatiflerin demeclocycline ile etkileşerek daha az etkili hale getirdiğini unutmayın. Demeclocycline'ı antasitler, kalsiyum takviyeleri ve magnezyum içeren laksatiflerden 2 saat önce veya 6 saat sonra alın. Demeclocycline'ı demir içeren preparatlardan ve vitamin ürünlerinden 2 saat önce veya 4 saat sonra alın.
- lupus (bağışıklık sisteminin cilt, eklemler, kan ve böbrekler dahil olmak üzere birçok doku ve organa saldırdığı durum) veya böbrek veya karaciğer hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin.
- Demeclocycline'ın hormonal kontraseptiflerin (doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar veya enjeksiyonlar) etkinliğini azaltabileceğini bilmelisiniz. Başka bir doğum kontrol yöntemi kullanma konusunda doktorunuzla konuşun.
- Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Demeclocycline kullanırken hamile kalırsanız derhal doktorunuza arayın. Demeclocycline fetüse zarar verebilir.
- güneş ışığına gereksiz yere veya uzun süre maruz kalmaktan kaçınmayı ve koruyucu giysiler, güneş gözlüğü ve güneş kremi giymeyi planlayın. Demeclocycline, cildinizi güneş ışığına duyarlı hale getirebilir. Güneş yanığı alırsanız hemen doktorunuza bildirin.
- Bilmelisiniz ki, demeclocycline hamilelik sırasında veya bebeklerde veya 8 yaşına kadar olan çocuklarda kullanıldığında dişlerin kalıcı olarak lekelenmesine neden olabilir. Demeclocycline, doktorunuz gerekli görmedikçe 8 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Demeclocycline yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- ishal
- mide bulantısı
- kusma

- cilt veya ağız rengindeki değişiklikler
- boğaz tahrişi
- aşırı susuzluk
- sık idrara çıkma
- zayıflık
- penis ucunun iltihabı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

- baş ağrısı
- bulanık görme, çift görme veya görme kaybı
- baş dönmesi
- Kulaklarında çınlayan
- döküntü
- kurdeşen
- soyma veya kabarma cilt
- yüz, boğaz, dil, dudaklar ve gözlerin şişmesi
- nefes alma veya yutma zorluğu
- olağandışı kanama veya morarma
- bilinç bulanıklığı, konfüzyon
- bacaklarınızın, ayak bileklerinizin veya ayaklarınızın şişmesi
- azalmış idrara çıkma
- eklem ağrısı
- göğüs ağrısı
- tedavi sırasında veya tedaviyi bıraktıktan sonra iki veya daha fazla aya kadar sulu veya kanlı dışkı, mide krampları veya ateş
- ateş, boğaz ağrısı, titreme veya diğer enfeksiyon belirtilerinin geri dönüşü

Demeclocycline diğer yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorunuz varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) veya telefonla (1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kaptaki sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:<https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, demeclocycline yanıtınızı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline demeclocycline kullandığınızı söyleyiniz.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçeteniz muhtemelen yeniden doldurulabilir değildir. Demeclocycline'i bitirdikten sonra hala enfeksiyon semptomlarınız varsa doktorunuzu arayın.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- deklomisin®¶

¶-Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.

Son Revize - 08/15/2017

[Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin](#)



[Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi](#)

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma

ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022