Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608010.html

desmopresină

pronunțat ca (des moe press' in)

de ce este prescris acest medicament?

Desmopresina este utilizată pentru a controla simptomele unui anumit tip de diabet insipid („diabet de apă"; afecțiune în care organismul produce o cantitate anormal de mare de urină). Desmopresina este, de asemenea, utilizată pentru a controla setea excesivă și trecerea unei cantități anormal de mare de urină care poate apărea după o leziune la cap sau după anumite tipuri de intervenții chirurgicale. Desmopresina este, de asemenea, utilizată pentru a controla urezirea patului. Desmopresina face parte dintr-o clasă de medicamente numite hormoni. Acționează prin înlocuirea vasopresinei, un hormon care este produs în mod normal în organism pentru a ajuta la echilibrarea cantității de apă și sare.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Desmopresina vine sub formă de tablete de luat pe cale orală. Se ia de obicei de două până la trei ori pe zi. Când desmopresina este utilizată pentru a trata enurezisul, se ia de obicei o dată pe zi la culcare. Încercați să luați desmopresină aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați desmopresină exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă poate începe cu o doză mică de desmopresină și vă poate crește treptat doza. Urmați aceste instrucțiuni cu atenție.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament este uneori prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua desmopresină,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la desmopresină, la orice alte medicamente sau la oricare dintre ingredientele comprimatelor de desmopresină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: antidepresive precum amitriptilina, amoxapină, clomipramină (Anafranil), desipramină (Norpramin), doxepină (Sinequan), imipramină (Tofranil), nortriptilină (Aventyl, Pamelor),

protriptilină (Vivactil) și trimipramină (Surmontil); aspirina și alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofen (Advil, Motrin) și naproxen (Aleve, Naprosyn); carbamazepină (Tegretol); clorpromazină (Torazină, Sonazine); clorpropamidă (diabineză); clofibrat; demeclociclină (Declomicină); fludrocortizon; heparină; lamotrigină (Lamictal); litiu (Eskalith); medicamente narcotice (opiacee) pentru durere; oxibutinină (Ditropan); inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), cum ar fi citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetină (Prozac, Sarafem), fluvoxamină, paroxetină (Paxil) și sertralină (Zoloft); și uree (Pytest). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu desmopresina,

- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală de rinichi sau un nivel scăzut de sodiu în sânge. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați desmopresină.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată hipertensiune arterială, orice afecțiune care vă face să fiți extrem de sete, fibroză chistică sau boli de inimă.
- dacă luați desmopresină pentru a trata enurezisul, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o infecție, febră, vărsături sau diaree; dacă vremea este neobișnuit de caldă; sau dacă intenționați să faceți mai mult exerciții decât de obicei. Este posibil să fie nevoie să beți mai multe lichide decât de obicei în aceste situații. Bea prea multe lichide în timp ce luați desmopresină poate fi periculos, așa că medicul dumneavoastră vă va spune probabil să încetați temporar să luați desmopresină.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați desmopresină, sunați la medicul dumneavoastră.
- discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile și beneficiile administrării desmopresinei dacă aveți 65 de ani sau mai mult. De obicei, adulții în vârstă nu ar trebui să ia desmopresină, deoarece nu este la fel de sigură sau eficientă ca alte medicamente care pot fi utilizate pentru a trata aceeași afecțiune.
- întrebați medicul despre utilizarea în siguranță a băuturilor alcoolice în timp ce luați desmopresină.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Medicul dumneavoastră vă poate spune să limitați cantitatea de lichid pe care o beți în timpul tratamentului cu desmopresină. Dacă luați desmopresină pentru a trata enurezisul, medicul dumneavoastră vă va spune probabil să evitați să beți cu cel puțin o oră înainte de a lua desmopresină și cu cel puțin 8 ore după ce luați desmopresină. Urmați cu atenție instrucțiunile medicului dumneavoastră pentru a preveni efectele secundare grave.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Desmopresina poate provoca reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă oricare dintre următoarele simptome este severă sau nu dispare:

- diaree
- gândire anormală

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră:

- greaţă
- vărsături
- pierderea poftei de mâncare
- creștere în greutate
- durere de cap
- iritabilitate
- nelinişte
- oboseală extremă
- confuzie
- reflexe încetinite
- slăbiciune musculară, spasme sau crampe
- halucinații (a vedea lucruri sau a auzi voci care nu există)
- convulsii
- pierderea conștienței pentru o perioadă de timp

Desmopresina poate provoca alte reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de raportare a evenimentelor adverse MedWatch al Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon (1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura camerei, ferit de căldură, lumină și umiditate.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul dvs. sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din partea dvs.

comunitate. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

- confuzie
- somnolenţă
- durere de cap
- dificultate la urinare
- creștere bruscă în greutate

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră poate comanda anumite teste de laborator pentru a verifica răspunsul dumneavoastră la desmopresină.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă folosească medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

- DDAVP®

Ultima revizuire - 15.10.2018

Aflați cum să citați această pagină

Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022