TITLE - DESMOPRESSIN / DDAVP MINIRIN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN SWEDISH

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608010.html

Desmopressin

uttalas som (des moe press' in)

hur är denna medicin utskriven?

Desmopressin används för att kontrollera symtomen på en viss typ av diabetes insipidus ('vattendiabetes'; tillstånd där kroppen producerar en onormalt stor mängd urin). Desmopressin används också för att kontrollera överdriven törst och passage av en onormalt stor mängd urin som kan uppstå efter en huvudskada eller efter vissa typer av operationer. Desmopressin används också för att kontrollera sängvätning. Desmopressin är i en klass av mediciner som kallas hormoner. Det fungerar genom att ersätta vasopressin, ett hormon som normalt produceras i kroppen för att hjälpa till att balansera mängden vatten och salt.

hur ska detta läkemedel användas?

Desmopressin kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis två till tre gånger om dagen. När desmopressin används för att behandla sängvätning, tas det vanligtvis en gång om dagen vid sänggåendet. Försök att ta desmopressin vid ungefär samma tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta desmopressin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Din läkare kan börja med en låg dos desmopressin och gradvis öka din dos. Följ dessa anvisningar noggrant.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin skrivs ibland ut för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar desmopressin,

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot desmopressin, andra mediciner eller något av innehållsämnena i desmopressin tabletter. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: antidepressiva medel som amitriptylin, amoxapin, klomipramin (Anafranil), desipramin (Norpramin), doxepin (Sinequan), imipramin (Tofranil), nortriptylin (Aventyl, Pamelor),

protriptylin (Vivactil) och trimipramin (Surmontil); aspirin och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen (Advil, Motrin) och naproxen (Aleve, Naprosyn); karbamazepin (Tegretol); klorpromazin (Torazin, Sonazin); klorpropamid (Diabinese); klofibrat; demeklocyklin (Deklomycin); fludrokortison; heparin; lamotrigin (Lamictal); litium (Eskalith); narkotiska (opiater) läkemedel mot smärta; oxibutynin (Ditropan); selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetin (Prozac, Sarafem), fluvoxamin, paroxetin (Paxil) och sertralin (Zoloft); och urea (Pytest). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Andra mediciner kan också interagera med desmopressin,

- tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft en njursjukdom eller en låg nivå av natrium i ditt blod. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta desmopressin.
- tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft högt blodtryck, något tillstånd som gör att du är extremt törstig, cystisk fibros eller hjärtsjukdom.
- om du tar desmopressin för att behandla sängvätning, tala om för din läkare om du utvecklar en infektion, feber, kräkningar eller diarré; om vädret är ovanligt varmt; eller om du planerar att träna mer än vanligt. Du kan behöva dricka mer vätska än vanligt i dessa situationer. Att dricka för mycket vätska medan du tar desmopressin kan vara farligt, så din läkare kommer förmodligen att säga till dig att sluta ta desmopressin tillfälligt.
- tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du tar desmopressin, kontakta din läkare.
- prata med din läkare om riskerna och fördelarna med att ta desmopressin om du är 65 år eller äldre. Äldre vuxna bör vanligtvis inte ta desmopressin eftersom det inte är lika säkert eller effektivt som andra mediciner som kan användas för att behandla samma tillstånd.
- fråga din läkare om säker användning av alkoholhaltiga drycker medan du tar desmopressin.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Din läkare kan säga till dig att begränsa mängden vätska du dricker under din behandling med desmopressin. Om du tar desmopressin för att behandla sängvätning, kommer din läkare förmodligen att säga åt dig att undvika att dricka i minst en timme innan du tar desmopressin och minst 8 timmar efter att du tagit desmopressin. Följ din läkares anvisningar noggrant för att förhindra allvarliga biverkningar.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Desmopressin kan orsaka biverkningar. Ring din läkare om något av följande symtom är allvarligt eller inte försvinner:

- diarre
- onormalt tänkande

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart:

- illamående
- kräkningar
- aptitlöshet
- viktökning
- huvudvärk
- irritabilitet
- rastlöshet
- extrem trötthet
- förvirring
- bromsade reflexer
- muskelsvaghet, spasmer eller kramper
- hallucinationer (att se saker eller höra röster som inte finns)
- anfall
- förlust av medvetande under en period

Desmopressin kan orsaka andra biverkningar. Tala om för din läkare om du upplever några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur, borta från värme, ljus och fukt.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i din

gemenskap. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

- förvirring
- dåsighet
- huvudvärk
- svårt att kissa
- plötslig viktökning

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kan beställa vissa laboratorietester för att kontrollera ditt svar på desmopressin.

Låt inte någon annan använda din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

- DDAVP®

Senast reviderad - 10/15/2018

Lär dig hur du citerar den här sidan

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists ®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022