Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608022.html

Desvenlafaxine

binibigkas bilang (des ven'' la fax' een)

MAHALAGANG BABALA:

Ang isang maliit na bilang ng mga bata, teenager, at young adult (hanggang 24 taong gulang) na umiinom ng mga antidepressant ('mood elevators') tulad ng desvenlafaxine sa panahon ng mga klinikal na pag-aaral ay naging suicidal (pag-iisip tungkol sa pinsala o pagpatay sa sarili o pagpaplano o pagsisikap na gawin ito.). Ang mga bata, teenager, at young adult na umiinom ng mga antidepressant upang gamutin ang depression o iba pang mga sakit sa isip ay maaaring mas malamang na magpakamatay kaysa sa mga bata, teenager, at young adult na hindi umiinom ng mga antidepressant para gamutin ang mga kundisyong ito. Gayunpaman, hindi sigurado ang mga eksperto kung gaano kalaki ang panganib na ito at kung gaano ito dapat isaalang-alang sa pagpapasya kung ang isang bata o tinedyer ay dapat uminom ng antidepressant. Ang mga batang wala pang 18 taong gulang ay hindi dapat karaniwang umiinom ng desvenlafaxine, ngunit sa ilang mga kaso,

Dapat mong malaman na ang iyong kalusugan sa isip ay maaaring magbago sa mga hindi inaasahang paraan kapag umiinom ka ng desvenlafaxine o iba pang mga antidepressant kahit na ikaw ay nasa hustong gulang na higit sa 24 taong gulang. Maaari kang magpakamatay, lalo na sa simula ng iyong paggamot at anumang oras na tumaas o bumaba ang iyong dosis. Ikaw, ang iyong pamilya, o ang iyong tagapag-alaga ay dapat tumawag kaagad sa iyong doktor kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: bago o lumalalang depresyon; pag-iisip tungkol sa pananakit o pagpatay sa iyong sarili, o pagpaplano o pagsisikap na gawin ito; matinding pag-aalala; pagkabalisa; pag-atake ng sindak; nahihirapang makatulog o manatiling tulog; agresibong pag-uugali; pagkamayamutin; kumikilos nang walang pag-iisip; matinding pagkabalisa; o frenzied abnormal excitement.

Gusto ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na makita ka nang madalas habang umiinom ka ng desvenlafaxine, lalo na sa simula ng iyong paggamot. Siguraduhing panatilihin ang lahat ng appointment para sa mga pagbisita sa opisina kasama ng iyong doktor.

Ibibigay sa iyo ng doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) kapag sinimulan mo ang paggamot gamit ang desvenlafaxine. Basahing mabuti ang impormasyon at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Maaari mo ring makuha ang Gabay sa Gamot mula sa website ng FDA:http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm].

Anuman ang iyong edad, bago ka uminom ng antidepressant, ikaw, ang iyong magulang, o ang iyong tagapag-alaga ay dapat makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng paggamot sa iyong kondisyon ng isang antidepressant o sa iba pang mga paggamot. Dapat mo ring pag-usapan ang mga panganib at benepisyo ng hindi paggagamot sa iyong kondisyon. Dapat mong malaman na ang pagkakaroon ng depresyon o ibang sakit sa pag-iisip ay lubos na nagpapataas ng panganib na ikaw ay magpakamatay. Mas mataas ang panganib na ito kung ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay nagkaroon o nagkaroon na ng bipolar disorder (mood na nagbabago mula sa depress tungo sa abnormally excited) o mania (frenzied, abnormally excited mood) o naisip o nagtangkang magpakamatay. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iyong kondisyon, mga sintomas, at personal at family medical history. Ikaw at ang iyong doktor ang magpapasya kung anong uri ng paggamot ang tama para sa iyo.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Desvenlafaxine ay ginagamit upang gamutin ang depresyon. Ang Desvenlafaxine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na selective serotonin at norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtaas ng dami ng serotonin at norepinephrine, mga natural na sangkap sa utak na tumutulong sa pagpapanatili ng balanse ng isip.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Desvenlafaxine bilang isang extended-release (long-acting) na tablet na dapat inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwang kinukuha ito isang beses sa isang araw na may pagkain o walang pagkain. Uminom ng desvenlafaxine sa halos parehong oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Uminom ng desvenlafaxine nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Lunukin ang mga tablet nang buo na may maraming tubig; huwag hatiin, nguyain, durugin, o dissolve ang mga ito.

Kinokontrol ng Desvenlafaxine ang depresyon, ngunit hindi ito ginagamot. Maaaring tumagal ng ilang linggo bago mo maramdaman ang buong benepisyo ng desvenlafaxine. Ipagpatuloy ang pag-inom ng desvenlafaxine kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-inom ng desvenlafaxine nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Malamang na babawasan ng iyong doktor ang iyong dosis nang paunti-unti. Kung bigla kang huminto sa pag-inom ng desvenlafaxine, maaari kang makaranas ng mga sintomas ng withdrawal tulad ng pagkahilo; pagkalito; pagduduwal; sakit ng ulo; tugtog sa tainga; pagkamayamutin; agresibong pag-uugali; kawalan ng kakayahang kontrolin ang mga emosyon; madalas na pagbabago ng mood; abnormally excited, hirap makatulog o manatiling tulog, pagtatae, pagkabalisa; matinding pagkapagod; hindi pangkaraniwang mga panaginip; mga seizure; pagpapawis; hindi mapigil na pagyanig ng isang bahagi ng katawan; malabong paningin; o pananakit, paso o pangingilig sa mga kamay o paa.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang desvenlafaxine ay ginagamit din minsan upang gamutin ang mga hot flashes (hot flushes; biglaang matinding init at pagpapawis) sa mga babaeng nakaranas ng menopause ('pagbabago ng buhay'; ang pagtatapos ng buwanang regla). Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng desvenlafaxine,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa desvenlafaxine, venlafaxine (Effexor), anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa desvenlafaxine tablets. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang listahan ng mga sangkap.
- sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng monoamine oxidase (MAO) inhibitor, tulad ng isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), methylene blue, phenelzine (Nardil), selegiline (Emsam, Zelapar), at tranylcypromine (Parnate), o kung huminto ka sa pag-inom ng isa sa mga gamot na ito sa loob ng nakaraang 14 na araw. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na hindi ka dapat uminom ng desvenlafaxine. Kung huminto ka sa pag-inom ng desvenlafaxine, sasabihin sa iyo ng iyong doktor na dapat kang maghintay ng hindi bababa sa 7 araw bago ka magsimulang uminom ng MAO inhibitor.
- dapat mong malaman na ang desvenlafaxine ay halos kapareho sa isa pang SNRI, venlafaxine (Effexor). Hindi mo dapat inumin ang mga gamot na ito nang magkasama.
- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot o bitamina na iyong iniinom o pinaplanong inumin. Tiyaking banggitin ang alinman sa mga sumusunod: amphetamine tulad ng amphetamine (sa Adderall, sa Mydayis), dextroamphetamine (Dexedrine, sa Adderall), at methamphetamine (Desoxyn); anticoagulants ('blood thinners') tulad ng warfarin (Coumadin, Jantoven); aspirin at iba pang nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) tulad ng ibuprofen (Advil, Motrin) at naproxen (Aleve, Naprosyn); atomoxetine (Straterra); buspirone; dextromethorphan (matatagpuan sa maraming gamot sa ubo; sa Nuedexta); diuretics ('mga tabletas ng tubig'); fentanyl (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys); ketoconazole; lithium (Lithobid); mga gamot para sa pagkabalisa, sakit sa isip, o mga seizure; mga gamot para sa migraine tulad ng almotriptan, eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex), at zolmitriptan (Zomig); metoprolol (Lopressor, Toprol XL); midazolam; nebivolol (Bystolic); nefazodone; perphenazine; pampakalma; selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) tulad ng citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, sa Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Paxil), at sertraline (Zoloft); iba pang mga SNRI tulad ng duloxetine (Cymbalta); mga tabletas sa pagtulog; tolterodine (Detrol); tramadol (Ultram); mga tranquilizer; at tricyclic antidepressants tulad ng amitriptyline, amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor), protriptyline, at trimipramine. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.
- sabihin sa iyong doktor kung anong mga herbal na produkto at nutritional supplement ang iniinom mo, lalo na ang St. John's wort at tryptophan.
- sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka o nakainom ka na ng maraming alak o gumagamit o nakagamit na ng mga gamot sa kalye o nagamit nang sobra sa mga iniresetang gamot. Sabihin din sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon ng mga problema sa pagdurugo; isang stroke; altapresyon; mataas na kolesterol o triglycerides (mga taba sa dugo); mga seizure; mababang antas ng sodium sa dugo; o sakit sa puso, bato, o atay.
- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, lalo na kung ikaw ay nasa huling ilang buwan ng iyong pagbubuntis, o kung plano mong magbuntis o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng desvenlafaxine, tawagan ang iyong doktor. Ang desvenlafaxine ay maaaring magdulot ng mga problema sa mga bagong silang kasunod ng panganganak kung ito ay iniinom sa mga huling buwan ng pagbubuntis.
- kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng desvenlafaxine.
- dapat mong malaman na ang desvenlafaxine ay maaaring magpaantok sa iyo at maaaring makaapekto sa iyong paghuhusga, pag-iisip, at paggalaw. Huwag magmaneho ng kotse o magpaandar ng makinarya hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

- tanungin ang iyong doktor tungkol sa ligtas na paggamit ng mga inuming nakalalasing habang umiinom ka ng desvenlafaxine. Ang alkohol ay maaaring magpalala ng mga side effect mula sa desvenlafaxine.
- dapat mong malaman na ang desvenlafaxine ay maaaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo. Dapat mong ipasuri ang iyong presyon ng dugo bago simulan ang paggamot at regular habang iniinom mo ang gamot na ito.
- dapat mong malaman na sa mga matatanda, ang desvenlafaxine ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagkahilo, at pagkahilo kapag mabilis kang bumangon mula sa pagkakahiga. Upang maiwasan ang problemang ito, dahan-dahang bumangon sa kama, ipahinga ang iyong mga paa sa sahig nang ilang minuto bago tumayo.
- dapat mong malaman na ang desvenlafaxine ay maaaring magdulot ng angle-closure glaucoma (isang kondisyon kung saan ang likido ay biglang nabara at hindi makalabas sa mata na nagdudulot ng mabilis, matinding pagtaas ng presyon ng mata na maaaring humantong sa pagkawala ng paningin). Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagkakaroon ng pagsusuri sa mata bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito. Kung mayroon kang pagduduwal, pananakit ng mata, mga pagbabago sa paningin, tulad ng makakita ng mga kulay na singsing sa paligid ng mga ilaw, at pamamaga o pamumula sa loob o paligid ng mata, tawagan ang iyong doktor o kumuha kaagad ng emerhensiyang medikal na paggamot.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Desvenlafaxine. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

- pagtitibi
- walang gana kumain
- tuyong bibig
- pagkahilo
- pagkaantok
- matinding pagod
- hindi pangkaraniwang panaginip
- humihikab
- nahihirapang makatulog o manatiling tulog
- pagpapawisan
- hindi mapigil na pagyanig ng isang bahagi ng katawan
- pananakit, paso, pamamanhid, o pamamanhid sa bahagi ng katawan
- pinalaki ang mga mag-aaral (mga itim na bilog sa gitna ng mga mata)

- mga problema sa sekswal sa mga lalaki; nabawasan ang gana sa pakikipagtalik, kawalan ng kakayahan na makakuha o panatilihin ang isang paninigas, o naantala o walang bulalas
- mga problema sa sekswal sa mga babae; nabawasan ang sex drive, o naantala ang orgasm o hindi nagkakaroon ng orgasm
- hirap umihi

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o sa mga nakalista sa MAHALAGANG BABALA o seksyong MGA ESPESYAL NA PAG-Iingat, tawagan kaagad ang iyong doktor:

- pantal
- mga pantal
- pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti
- kahirapan sa paglunok o paghinga
- mabilis na tibok ng puso
- ubo
- pananakit ng dibdib, braso, likod, leeg, o panga
- lagnat
- coma (pagkawala ng malay para sa isang yugto ng panahon)
- mga seizure
- lagnat, pagpapawis, pagkalito, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, matinding paninigas ng kalamnan o pagkibot, pagkabalisa, guni-guni, pagkawala ng koordinasyon, pagduduwal, pagsusuka, o pagtatae
- hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa
- pagdurugo ng ilong
- maliliit na pula o lilang tuldok sa balat
- sakit ng ulo
- hirap magconcentrate
- mga problema sa memorya
- pagkalito
- kahinaan
- nadagdagan ang pagbagsak
- nanghihina

Ang Desvenlafaxine ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332-1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

- pagsusuka
- pagkabalisa, guni-guni, lagnat, pagpapawis, pagkalito, mabilis na tibok ng puso, panginginig, matinding paninigas o pagkibot ng kalamnan, pagkawala ng koordinasyon, pagduduwal, pagsusuka, o pagtatae
- antok
- pagkawala ng malay
- mga seizure
- mabilis, mabagal, o hindi regular na tibok ng puso
- nadagdagan ang laki ng pupil (itim na gitna ng mata)
- pananakit o panghihina ng kalamnan

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo.

Ang extended-release na tablet ay hindi natutunaw sa tiyan pagkatapos lunukin. Dahan-dahan nitong inilalabas ang gamot habang dumadaan ito sa iyong digestive system. Maaari mong mapansin ang patong ng tablet sa dumi. Ito

ay normal at hindi nangangahulugan na hindi mo natanggap ang kumpletong dosis ng gamot.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

- Pristiq®

Huling Binago - 01/15/2022

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022