



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : NPS

VISANNE® ((Viz-Ahn) ジエノゲスト)

これには何がありますか リーフレット

このリーフレットは、Visanneに関するいくつかの一般的な質問に答えます。利用可能なすべてが含まれているわけではありません

情報。それはあなたの医者や薬剤師と話す代わりにはなりません。

すべての薬にはリスクと利点があります。あなたの医者はあなたがVisanneを服用するリスクと彼らがあなたに期待する利益とを比較検討しました。

懸念がある場合、またはこの薬の服用について確信が持てない場合は、医師または薬剤師にアドバイスを求めてください。

このリーフレットは薬と一緒に保管してください。

もう一度読む必要があるかもしれません。

VISANNEとは

のために使用される

ヴィザンヌは、の痛みを伴う症状の治療に使用されます
子宮内膜病変（子宮内膜の変化した組織）。

Visanneには、プロゲステロンホルモンであるジエノゲストが含まれています。

毎日1錠のVisanne錠を服用すると、子宮内膜組織が収縮し、骨盤痛や毎月の痛みを伴う出血などの関連する愁訴が減少します。

**なぜこれについて質問があるかどうか医師に尋ねてください
薬が処方されています。**

あなたの医者は別の理由でそれを処方した
かもしれません。

あなたが取る前に VISANNE

あなたがそれを取ってはいけないとき

次のアレルギーがある場合は、Visanneを服用しないでください。

• ジエノゲスト（ビザンヌの有効成分）

• に記載されている成分のいずれか
このリーフレットの終わり。

アレルギー反応の症状には、次のようなものがあります。

• 呼吸困難
• 喘鳴または呼吸困難

• 顔、唇、舌、または体の他の部分の腫れ

• 皮膚の発疹、かゆみ、じんましん。

血栓がある場合、または血栓があった場合は、Visanneを服用しないでください。

• 脚の血管（深部静脈血栓症-DVT）

• 肺（肺塞栓症-PE）

• 心臓（心臓発作）

• 脳（脳卒中）

• 体の他の部分。

血餅のリスクの増加が心配な場合は、Visanneを服用しないでください。

血餅はまれです。ごくまれに、血餅が原因となることがあります

深刻な永続的な障害、または致命的でさえあるかもしれません。

次のような場合は、Visanneを服用しないでください。

• 血管損傷を伴う糖尿病

• 重度の肝疾患と肝機能が正常に戻っていない

• 性ホルモンの影響下で成長する可能性のある癌（例：乳房または生殖器の）

• 良性または悪性の肝腫瘍

• 原因不明の膣からの出血。

Visanneの服用中にこれらの症状のいずれかが初めて現れた場合は、すぐに服用を中止し、医師に相談してください。

妊娠中または妊娠している可能性があると思われる場合は、Visanneを服用しないでください。

妊娠の可能性は開始する前に除外する必要があります

ヴィザンヌ。

授乳中または授乳している場合は、Visanneを服用しないでください。

Visanneを子供に与えないでください。 Visanneは、初潮（最初の月経出血）前の女性の子供には使用できません。

パックとプリスターに印刷された有効期限後は、ビザンヌを服用しないでください。

有効期限は、「EXP」の後のカートンと各プリスターに印刷されています

（たとえば、11 18は2018年11月を指します）。有効期限とは、その月の最終日を指します。有効期限が切れている場合は、薬剤師に返送して処分してください。

パッケージが破れたり、改ざんの兆候が見られる場合は、Visanneを服用しないでください。

パッケージが破損している場合は、薬剤師に返送して廃棄してください。

この薬の服用を開始すべきかどうか分からない場合は、医師に相談してください。

あなたがそれを取り始める前に

他の薬、食品、防腐剤、染料にアレルギーがある場合は医師に相談してください。

下記の条件のいずれかが存在する状態でVisanneを使用する場合は、**厳重な監視が必要になる場合があります。あなたの医者はあなたにこれを説明することができません。したがって、これらのいずれかに該当する場合は、Visanneの使用を開始する前に医師に相談してください。**

- あなたが喫煙します
- あなたは太りすぎです
- あなたは糖尿病を患っているか、以前の妊娠中に一時的に糖尿病を患っていました
- あなたは高血圧を持っているか、高血圧を発症します
ヴィザンヌを服用している間
- あなたはうつ病に苦しんでいます
- 子宮外妊娠をしたことがある場合
- あなたはビザンヌを服用している間に肝臓病を発症します。
症状には次のものが含まれます
皮膚や目が黄変したり、全身がかゆみを伴う。そのような場合も医師に知らせてください
前回の妊娠中に症状が発生した
- 肝斑（皮膚、特に顔の黄褐色の色素沈着パッチ）があります
ーもしそうなら、太陽や紫外線への暴露を避けてください
- あなたまたはあなたの近親者は、脚や肺に血餅、心臓発作、脳卒中、乳がん、または高コレステロール血症を患っていません。

ヴィザンヌには乳糖—水和物が含まれています。

一部の糖分に不耐性がある場合は、Visanneの服用を開始する前に医師に連絡してください。

他の薬を服用する

**他に服用している場合は、医師または薬剤師に伝えてください
薬局、スーパーマーケット、健康食品店から処方箋なしで入手したものを含む薬。**

いくつかの薬/食品とビザンヌは互いに干渉する可能性があります。これらには以下が含まれます：

- フェニトイン、プリミドン、バルビツール酸塩などのてんかんの治療に使用される薬（例：
フェノバルビタール）、
カルバマゼピン、
オクスカルバゼピン、トピラマート、
フェルバメート
- フルオキセチン、フルボキサミンなどのうつ病の治療に使用される薬
- 高血圧、胸痛、不整脈の治療に使用される薬であるジルチアゼム、ベラパミル
- リファンピシン、リファブチンなどの結核の治療に使用される薬
- HIVまたはC型肝炎ウイルス（HCV）の治療に使用される薬
- ケトコナゾール、イトラコナゾール、フルコナゾールなどの真菌感染症の治療に使用される薬、
ポリコナゾール)
- いくつかの抗生物質（例えば、エリスロマイシン、クラリスロマイシン)
- 制酸剤シメチジン
- セントジョンズワートを含むハーブ薬
- グレープフルーツ。

これらの薬/食品は、ビザンヌの影響を受ける可能性があり、またはそれがどれだけうまく機能するかに影響を与える可能性があります。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、別の薬を処方する必要があるかもしれません。

**他の服用する前に、医師または薬剤師にアドバイスを求めてください
薬。**

取る方法 VISANNE

医師または薬剤師からの指示に注意深く従ってください。

これらは、このリーフレットに含まれている情報とは異なる場合があります。

薬剤師のラベルまたはこのリーフレットに印刷されているパックの説明がわからない場合は、医師または助けを求める薬剤師。

取り方

休憩なしで、毎日ほぼ同じ時間に毎日1錠を服用してください。

すべての錠剤が取り出されるまで、プリスターパックの矢印の方向に従います。

タブレットの服用は、月経周期のどの日にでも開始できます。

錠剤は、膣からの出血に関係なく継続的に服用する必要があります。これは、最初のパックが終了した後、次のパックを中断することなく開始する必要があることを意味します。

タブレット全体を水で飲み込みます。
食事の前後に飲んでも構いません。

ヴィザンヌにかかる時間

医師の指示がある限り、薬を飲み続けてください。

この薬はあなたの状態をコントロールするのに役立ちますが、それを治すことはありません。気分が良くても薬を飲み続けることが大切です。

ビザンヌを取るのを忘れた場合

タブレットの服用を忘れた場合、または嘔吐や下痢に苦しんでいる場合：

錠剤を紛失したり、嘔吐や下痢を起こした場合（錠剤を服用してから3〜4時間以内に発生した場合）、Visanneの有効性が低下する可能性があります。タブレットを紛失した場合は、すぐに1つのタブレットのみを服用する必要があります

覚えておいてください。そうすれば、翌日の通常の時間にタブレットを服用し続ける必要があります。嘔吐や下痢のために吸収されなかった錠剤も同様に1錠と交換する必要があります。

飲み過ぎた場合（過剰摂取）

すぐに毒物情報センター（オーストラリア：13 11 26）に連絡してアドバイスを求めるか、次のURLにアクセスしてください。

**での事故と緊急事態
あなたや他の誰かがVisanneを飲みすぎたかもしれないと思うなら、最寄りの病院。**

不快感や中毒の兆候がない場合でも、これを行ってください。緊急の治療が必要な場合があります。

あなたがいる間 ヴィザンヌを取る

あなたがしなければならないこと

あなたを治療している他の医師、歯科医、薬剤師に、あなたがこの薬を服用していることを伝えてください。

血液検査を受けようとしている場合は、この薬を服用していることを医師に伝えてください。

一部のテストの結果に干渉する可能性があります。

手術を受ける場合は、この薬を服用していることを外科医または麻酔科医に伝えてください。

手術中に使用される他の薬に影響を与える可能性があります。

あなたの進歩をチェックできるようにあなたの医者の予定をすべて保管してください。

医師は、薬が効いていることを確認し、望ましくない副作用を防ぐために、時々いくつかの検査を行う場合があります。

この薬を服用中に妊娠した場合は、すぐに医師に相談してください。

してはいけないこと

医師の指示がない限り、他の苦情を治療するためにVisanneを服用しないでください。

たとえ彼らがあなたと同じ状態であっても、あなたの薬を他の人に与えないでください。

注意点

妊娠を避けるために、非ホルモン剤を使用する必要があります。コンドームや他のバリア方法などの避妊予防策。

いかなる形態の避妊薬（錠剤、パッチ、子宮内）を含む性ホルモンを使用してはなりません（システム）Visanneを服用している間。

リズムや温度の方法を使用しないでください。これらの方法は信頼できない可能性があります。

例外的なケースで、Visanneの使用中に妊娠する必要がある場合、Visanneのようなプロゲステゲン含有製剤の使用者は子宮外妊娠をする可能性が高くなります（胚は子宮の外で発生します）。

過去に子宮外妊娠をしたことがある場合、または卵管の機能が低下している場合は、Visanneの服用を開始する前に医師に相談してください。

あなたがあなたから一般的に経験する症状とは異なる原因不明の腹部の不満を経験した場合

子宮内膜症の場合は、すぐに医師に連絡してください。

子宮外妊娠を考慮する必要があります。

副作用

服用中に気分が悪い場合は、できるだけ早く医師または薬剤師に伝えてください

ヴィザンヌ。

すべての薬には副作用があります。時には彼らは深刻ですが、ほとんどの場合そうではありません。いくつかの副作用が出た場合は、医師の診察は必要ないかもしれませんが。

考えられる副作用のこのリストに驚かさないでください、あなたはそれらのどれも経験しないかもしれません。

次のリストには、Visanneのより一般的な副作用が含まれています。これらは通常穏やかで、時間とともに減少します。

次の副作用のいずれかに気づき、心配している場合は、医師または薬剤師に伝えてください。

- 頭痛または片頭痛
- 乳房の不快感、
- ほてり
- うつ病、過敏性、

緊張、睡眠の問題、セックスへの興味の喪失

- にきび、脱毛
- 吐き気、腹痛、風、おなかの腫れ、または嘔吐
- 体重の増加
- 背中痛み
- スポッティングを含む子宮/膣からの出血
- 異常な弱点

気分が悪くなっている他の何かに気づいたら、医師または薬剤師に伝えてください。

記載されていない他の副作用も一部の人に発生する可能性があります。

血栓症

血栓症は、血液をブロックする可能性のある血栓の形成です。

血栓症は時々発生します。脚の深部静脈（DVT）。この血栓が形成された静脈から離れると、肺の動脈に到達して閉塞し、肺塞栓症（PE）を引き起こす可能性があります。

深部静脈血栓症はまれな発生です。それはあなたがVisanneを服用しているかどうかにかかわらず発生することができます。妊娠した場合にも発生する可能性があります。

静脈血栓塞栓症（DVTまたはPE）のリスクは、Visanneのようなホルモン（プロゲステゲン含有）製剤の使用者の方が非使用者よりもわずかに高いようですが、妊娠中または経口避妊薬の使用中心ほど高くはありません。

避妊薬（ピル）。

静脈血栓塞栓症のリスクは、たとえば次のように増加します。

- 加齢とともに
- 太りすぎの場合
- 出産直後
- 過去に血栓があった場合
- あなたの近親者の誰かが比較的早い年齢で血栓を持っていた場合
- 長期間の固定中、例えば、手術後または石膏/添え木に足を入れた後など。

予想される入院や手術のかなり前に、Visanneを使用していることを医師に伝えてください。

医師は、手術の数週間前、または固定化時、およびピザンヌの服用を再開できるときに、ピザンヌの服用を中止するように指示する場合があります。

血栓は、心臓の血管（心臓発作を引き起こす）または脳（脳卒中を引き起こす）でも発生する可能性があります。

研究から、Visanneに類似したプロゲステロゲン含有製剤と心臓発作または脳卒中のリスクの増加との間に関連があるという証拠はほとんどまたはまったくありません。

そのようなイベントのリスクは、むしろ年齢の増加に関連しています、高血圧（高血圧）、および喫煙。

高血圧の女性では、脳卒中のリスクはプロゲステンによってわずかに増加する可能性があります

Visanneのような準備が含まれています。

Visanneの使用中に高血圧が発生した場合は、使用を中止するように言われることがあります。

血栓の兆候に気付いた場合は、Visanneの服用を中止し、医師に相談してくださいすぐに。

血栓の考えられる兆候は次のとおりです。

- 異常な咳

- 胸、腕、または胸骨の下の痛み
- 背中に広がる不快感
- 息切れおよび/または呼吸困難
- 片足の腫れ、痛み、または圧痛
- 顔、腕、または脚の突然の脱力感、しびれ、または悪い「ピンと針」、特に体の片側
- 突然の歩行障害、めまい、平衡感覚の喪失または協調の喪失
- 重度の突然の腹痛
- 失神攻撃、またはあなたは崩壊します
- 通常よりもひどい異常な頭痛や片頭痛
- あなたのスピーチ、理解または視力に関する突然の問題

癌

乳がんは、ピルを使用しない同年齢の女性よりも、経口避妊薬の併用（ピル）を使用する女性でわずかに多く診断されています。違いがピルによるものなのか、それともピルによるものなのかは不明です。

癌はピルユーザーで以前に検出されました。

証拠は、Visanneのようなプロゲステロンのみの製剤については決定的ではありません。

定期的に乳房をチェックし、しこりを感じたら医師に連絡することが重要です。

まれに、良性肝腫瘍、さらにまれに、ピルの使用者に悪性肝腫瘍が報告されています。これらの腫瘍は内出血を引き起こす可能性があります。

腹部に激しい痛みがある場合は、すぐに医師に連絡してください。

出血パターン

ピザンヌ治療は、大多数の女性の月経出血パターンに影響を及ぼします。

子宮腺筋症や子宮平滑筋腫などの女性の子宮出血は、Visanneで悪化する可能性があります。

出血がひどく、時間の経過とともに続く場合、これは貧血につながる可能性があります（場合によっては重度）。そのような場合、あなたの医師はあなたにVisanneの服用をやめるようにアドバイスするかもしれません。

骨密度 (BMD)

Visanneの長期使用は、青年（12〜<18歳）の骨塩密度（BMD）に影響を与える可能性があるため、医師はVisanneを他の人と比較して使用する利点を慎重に検討します。

骨量減少（骨粗鬆症）の潜在的なリスク例：

- 代謝性骨疾患
- あなたの近親者の誰かが骨量減少（骨粗鬆症）に苦しんだことがあるなら
- 転倒や事故によるものではない骨折したことがある場合
- てんかん薬やステロイドなど、骨量を減らすことができる薬の使用
- 低ボディマス指数または摂食障害、例えば神経性食欲不振症または過食症
- アルコールの使用
- 喫煙

Visanneを使用する場合、骨粗鬆症のリスクを減らすために、医師は体重負荷運動や適切なカルシウムとビタミンDを含む健康的な食事などの食事とライフスタイルの変更を勧めることもあります。骨の健康を改善するためのアドバイスを医師に依頼してください。

服用後 VISANNE

ストレージ

服用する時まで、タブレットをブリスターパックに入れておきます。

パックからタブレットを取り出すと、うまく保存されない場合があります。

タブレットを涼しく乾燥した場所に保管してください。30°C未満にとどまります。

ヴィザンヌやその他の薬をバスルーム、流し台の近く、または窓枠に保管しないでください。車の中に薬を残さないでください。

熱と湿気はいくつかを破壊する可能性があります
薬。

医師からこの薬の服用や有効期限の中止を指示された場合、日付が過ぎたら、残った薬をどうするか薬剤師に聞いてください。

未使用の薬は薬剤師に返却してください。

製品 説明

それはどのようなものか

Visanneは、片面に「B」のマークが付いた、丸い白からオフホワイトの錠剤です。ブリスターパックには曜日が記されており、14錠が含まれています。

Visanneは、1か月、3か月、6か月のパックで提供されます。すべてのパックサイズが販売されているわけではありません。

材料

有効成分：

- ジエノゲスト2mg

不活性成分：

- 乳糖一水和物
- でんぶんじゃがいも
- セルロース-微結晶
- ポビドン
- 精製タルク
- クロスポビドン
- ステアリン酸マグネシウム

Visanneタブレットには、グルテン、タートラジン、またはアゾ染料は含まれていません。

サブライヤー

ドイツ製：

Bayer Australia Ltd
ABN 22 000 138714875パ
シフィックハイウェイ
Pymble NSW 2073

オーストラリアの登録
番号：

Visanne-AUST R 160465

準備日

2020年2月26日

TGAのWebサイトを参照してください

(www.ebs.tga.gov.au) 最新情報
オーストラリアの消費者医療
情報。

®の登録商標 バイエルグループ、ドイツ

©BayerAustraliaLtd
全著作権所有

