



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : NPS

# 비잔® (비즈안)

## 이것은 무엇입니까 전단

이 전단지는 Visanne에 대한 몇 가지 일반적인 질문에 대한 답변입니다. 사용 가능한 모든 항목이 포함되어 있지 않습니다.

정보. 이것은 의사나 약사와 이야기하는 것을 대신하지 않습니다.

모든 의약품에는 위험과 이점이 있습니다. 귀하의 의사는 귀하가 Visanne을 복용할 때의 위험성과 귀하에게 기대할 수 있는 이점을 비교 평가했습니다.

**우려되는 사항이 있거나 이 약을 복용하는 것에 대해 확신이 없으면 의사나 약사에게 더 많은 조언을 구하십시오.**

**이 전단지를 약과 함께 보관하십시오.**

다시 읽어야 할 수도 있습니다.

## 비잔이란? 사용

Visanne은 다음의 고통스러운 증상의 치료에 사용됩니다.

자궁 내막 병변(자궁 내막의 변위된 조직).

Visanne에는 프로게스테론 호르몬인 디에노게스트가 들어 있습니다.

Visanne 정제를 매일 1정 복용하면 자궁내막 조직이 수축하고 골반 통증 및 고통스러운 월별 출혈과 같은 관련 불만이 줄어듭니다.

### 디에노게스트

왜 이런 일이 발생하는지 궁금한 사항이 있으면 의사에게 문의하십시오. 당신을 위해 약이 처방되었습니다.

의사가 다른 이유로 처방했을 수 있습니다.

## 복용하기 전에 비잔

### 복용하지 말아야 할 때

다음에 대한 알레르기가 있는 경우 Visanne을 복용하지 마십시오.

- 디에노게스트(비잔의 활성 성분)

- 에 나열된 성분 중 이 전단지의 끝.

알레르기 반응의 일부 증상은 다음과 같습니다.

- 호흡 곤란
- 천명 또는 호흡 곤란

- 얼굴, 입술, 혀 또는 신체의 다른 부분의 붓기

- 피부에 발진, 가려움증 또는 두드러기.

다음과 같은 경우 혈전이 있거나 있었던 경우 Visanne을 복용하지 마십시오.

- 다리의 혈관(심부 정맥 혈전증 - DVT)
- 폐(폐색전증 - 체육)
- 심장(심장마비)
- 뇌(뇌졸중)
- 신체의 다른 부분.

**혈전 위험 증가가 우려되는 경우 Visanne을 복용하지 마십시오.**

혈전은 드뭅니다. 매우 가끔 혈전이 발생할 수 있음

심각한 영구 장애 또는 치명적일 수 있습니다.

**다음과 같은 경우 Visanne을 복용하지 마십시오.**

- 혈관 손상을 동반한 당뇨병
- 심각한 간 질환 및 간 기능이 정상으로 돌아오지 않은 경우
- 성 호르몬의 영향으로 성장할 수 있는 암(예: 유방이나 생식기)
- 양성 또는 악성 간 종양
- 설명할 수 없는 질 출혈.

**Visanne을 복용하는 동안 이러한 상태 중 하나라도 처음 나타나면 즉시 복용을 중단하고 의사에게 알려십시오.**

임신 중이거나 임신 가능성이 있다고 생각되는 경우 Visanne을 복용하지 마십시오.

시작하기 전에 임신 가능성을 배제해야 합니다. 비잔느.

**모유 수유 중인 경우 Visanne을 복용하지 마십시오.**

**어린이에게 Visanne을 주지 마십시오.** Visanne은 초경(첫 월경 출혈) 이전의 여아에게 사용해서는 안 됩니다.

**팩과 물집에 인쇄된 유효 기간이 지난 후에는 Visanne을 복용하지 마십시오.**

만료 날짜는 상자와 각 물집에 "EXP" 뒤에 인쇄되어 있습니다(예: 11 18은 2018년 11월을 나타냄). 만료 날짜는 해당 월의 마지막 날을 나타냅니다. 만료된 경우 폐기를 위해 약사에게 반환하십시오.

포장이 찢어졌거나 변조의 흔적이 보이면 Visanne을 복용하지 마십시오.

포장이 손상된 경우 폐기를 위해 약사에게 반품하십시오.

이 약을 복용해야 하는지 여부가 확실하지 않은 경우 의사와 상담하십시오.

### 복용을 시작하기 전에

다른 의약품, 식품, 방부제 또는 염료에 알레르기가 있는 경우 의사에게 알려십시오.

Visanne을 아래 나열된 조건 중 하나라도 사용하는 경우 면밀한 감독이 필요할 수 있습니다. 의사가 이에 대해 설명할 수 있습니다. 따라서 다음 중 하나라도 해당되는 경우 Visanne 사용을 시작하기 전에 의사에게 알려십시오.

- 당신은 담배를 피우다
- 당신은 과체중입니다
- 이전 임신 중에 당뇨병이 있거나 일시적으로 당뇨병이 있는 경우
- 당신은 고혈압이 있거나 고혈압이 발생합니다  
비잔스를 복용하는 동안
- 당신은 우울증에 시달렸습니다
- 자궁외 임신을 한 경우
- Visanne을 복용하는 동안 간 질환이 발생합니다.  
증상에는 다음이 포함될 수 있습니다.  
피부 또는 눈의 황변 또는 전신 가려움증. 그러한 경우에도 의사에게 알려십시오.  
이전 임신 중에 발생한 증상
- 기미(피부, 특히 얼굴의 황갈색 착색 패치)가 있습니다.  
– 그렇다면 태양이나 자외선에 대한 노출을 피하십시오
- 귀하 또는 귀하의 직계 가족 중 다리나 폐에 혈전, 심장마비, 뇌졸중, 유방암 또는 고콜레스테롤이 있는 사람이 있습니다.

Visanne에는 유당 일수화물이 포함되어 있습니다.

일부 설상에 과민증이 있는 경우 Visanne 복용을 시작하기 전에 의사와 상의하십시오.

### 다른 약 복용

다른 약을 복용하는 경우 의사 또는 약사에게 알려십시오. 약국, 슈퍼마켓 또는 건강 식품 가게에서 처방전 없이 구입하는 모든 의약품을 포함합니다.

일부 의약품/식품과 Visanne은 서로 간섭할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- 페니토인, 프리미돈, 바르비투르 산염(예:  
페노바르비톤), 카바마제핀, 옥스카르바마제핀, 토피라메이트, 펠바메이트
- 플루옥세틴, 플루복사민과 같은 우울증 치료에 사용되는 약물
- 딜티아젬, 베라파밀은 고혈압, 흉통 또는 불규칙한 심장 박동을 치료하는 데 사용되는 의약품입니다.
- 리팜피신, 리파부틴과 같은 결핵 치료에 사용되는 의약품

- HIV 또는 C형 간염 바이러스(HCV) 치료에 사용되는 의약품
- 케토코나졸, 이트라코나졸, 플루코나졸,

보리코나졸)

- 일부 항생제(예: 에리스로마이신, 클라리스로마이신)
- 제산제 시메티딘
- St. John's Wort를 함유한 한약재
- 그레이프 프루트.

이러한 의약품/식품은 Visanne의 영향을 받거나 효과에 영향을 줄 수 있습니다. 의사는 약의 복용량을 변경하거나 다른 약을 처방해야 할 수도 있습니다.

다른 약을 복용하기 전에 의사나 약사에게 조언을 구하십시오.  
약.

## 복용 방법 비잔

의사나 약사가 제공한 모든 지시 사항을 주의 깊게 따르십시오.

이 전단지에 포함된 정보와 다를 수 있습니다.

약사 라벨이나 이 전단지에 인쇄된 포장의 지시 사항을 이해하지 못하는 경우 의사나

도움을 청하는 약사.

### 복용 방법

휴식 없이 매일 거의 같은 시간에 1정을 복용하십시오.

모든 정제를 복용할 때까지 블리스터 팩의 화살표 방향을 따르십시오.

월경 주기의 날부터 정제 복용을 시작할 수 있습니다.

정제는 질 출혈과 관계없이 지속적으로 복용해야 합니다. 즉, 첫 번째 팩이 완료된 후 중단 없이 다음 팩이 시작되어야 합니다.

정제 전체를 물로 삼키십시오.

식전이나 식후에 복용해도 상관 없습니다.

Visanne을 복용하는 데 얼마나 걸립니까?

의사가 지시하는 한 계속 약을 복용하십시오.

이 약은 상태를 조절하는 데 도움이 되지만 치료하지는 않습니다. 기분이 좋아도 약을 계속 복용하는 것이 중요합니다.

Visanne 복용을 잊은 경우

정제 복용을 잊었거나 구토 및/또는 설사로 고통받는 경우:

Visanne의 효능은 정제를 놓친 경우 또는 구토 및/또는 설사(정제 복용 후 3-4시간 이내에 발생한 경우)의 경우 감소될 수 있습니다. 정제를 놓친 경우 즉시 1정만 복용해야 합니다.

기억하고 다음 날 평소 시간에 태블릿을 계속 복용해야 합니다. 구토나 설사로 인해 흡수되지 않는 정제도 마찬가지로 1정으로 대체해야 합니다.

### 너무 많이 복용하는 경우(과용량)

즉시 독극물 정보 센터(호주: 13 11 26)에 연락하여 조언을 받거나

### 사고 및 긴급 상황

귀하 또는 다른 사람이 Visanne을 너무 많이 복용했다고 생각되면 가장 가까운 병원에 문의하십시오.

불편함이나 중독의 징후가 없더라도 이것을 하십시오.

긴급한 의료 조치가 필요할 수 있습니다.

## 당신이있는 동안 비잔느 복용

### 당신이해야 할 일

귀하를 치료하는 다른 의사, 치과 의사 및 약사에게 귀하가 이 약을 복용하고 있음을 알려십시오.

혈액 검사를 받으려고 하는 경우 의사에게 이 약을 복용하고 있음을 알려십시오.

일부 테스트의 결과를 방해할 수 있습니다.

수술을 받을 예정이라면 외과 의사나 마취과 의사에게 이 약을 복용하고 있음을 알려십시오.

수술 중 사용하는 다른 약물에 영향을 줄 수 있습니다.

진행 상황을 확인할 수 있도록 모든 의사의 약속을 지키십시오.

의사는 약이 효과가 있는지 확인하고 원치 않는 부작용을 예방하기 위해 때때로 몇 가지 검사를 할 수 있습니다.

이 약을 복용하는 동안 임신하면 즉시 의사에게 알려십시오.

### 하지 말아야 할 일

의사가 지시하지 않는 한 다른 불만을 치료하기 위해 Visanne을 복용하지 마십시오.

다른 사람이 당신과 같은 상태에 있더라도 당신의 약을 다른 사람에게 주지 마십시오.

### 주의할 점

임신을 피하려면 비호르몬제를 사용해야 합니다.

콘돔이나 다른 차단 방법과 같은 피임 예방 조치.

어떤 형태의 피임약(정제, 패치, 자궁 내

시스템) Visanne을 복용하는 동안.

리듬 또는 온도 방법을 사용하지 마십시오. 이러한 방법은 신뢰할 수 없습니다.

예외적인 경우에 Visanne 사용 중에 임신해야 하는 경우 Visanne과 같은 제제를 함유한 프로게스테론 사용자가 자궁외 임신(배아가 자궁 밖에서 발생함)을 가질 가능성이 더 높습니다.

과거에 자궁외 임신이 있었거나 나팔관 기능이 손상된 경우 Visanne 복용을 시작하기 전에 의사에게 알려십시오.

귀하가 일반적으로 경험하는 증상과 다른 설명할 수 없는 복통을 경험하는 경우

자궁내막증이 있는 경우 즉시 의사에게 연락해야 합니다. 자궁외 임신을 고려해야 합니다.

## 부작용

복용하는 동안 몸이 좋지 않을 경우 가능한 한 빨리 의사 또는 약사에게 알려십시오. 비잔느.

모든 약에는 부작용이 있을 수 있습니다. 때로는 심각하지만 대부분은 그렇지 않습니다. 일부 부작용이 발생하면 의료 조치가 필요하지 않을 수 있습니다.

이 가능한 부작용 목록에 놀라지 마십시오. 아무 경험도 하지 않을 수도 있습니다.

다음 목록에는 Visanne의 보다 일반적인 부작용이 포함되어 있습니다. 이들은 일반적으로 경미하고 시간이 지나면서 줄어듭니다.

다음과 같은 부작용이 발견되어 걱정되는 경우 의사나 약사에게 알려십시오.

- 두통 또는 편두통
- 유방 불편감,
- 안면 홍조
- 우울증, 과민성,

신경질, 수면 문제, 섹스에 대한 관심 상실

- 여드름, 탈모
- 메스꺼움, 복통, 바람, 부은 배 또는 구토
- 살찌 다
- 허리 통증
- 반점을 포함한 자궁/질 출혈
- 비정상적인 약점

기분이 좋지 않은 다른 것을 발견하면 의사나 약사에게 알려십시오.

나열되지 않은 다른 부작용도 일부 사람들에게 발생할 수 있습니다.

### 혈전증

혈전증은 혈전이 형성되어 혈액을 차단할 수 있습니다 선박.

혈전증은 때때로 다음에서 발생합니다. 다리의 깊은 정맥(DVT). 이 혈전이 형성된 정맥에서 떨어져 나가면 폐동맥에 도달하여 차단하여 폐색전증(PE)을 유발할 수 있습니다.

심부 정맥 혈전증은 드물게 발생합니다. Visanne 복용 여부에 관계없이 발생할 수 있습니다. 임신한 경우에도 발생할 수 있습니다.

정맥 혈전 색전증(DVT 또는 PE)의 위험은 Visanne과 같은 호르몬(프로게스테론 함유) 제제 사용자가 비사용자보다 약간 더 높은 것으로 보이지만 임신 중이나 복합 경구 사용 중만큼 높지는 않습니다.

피임약(알약).

정맥 혈전색전증의 위험은 다음과 같이 증가합니다.

- 나이가 들면서
- 과체중이라면
- 출산 직후
- 과거에 혈전이 있었던 경우
- 직계 가족 중 비교적 어린 나이에 혈전이 있었던 사람이 있는 경우
- 수술 후 또는 다리에 석고/부목을 끼운 후와 같이 장기간 고정된 상태에서

예상되는 입원이나 수술에 앞서 Visanne을 잘 사용하고 있다고 의사에게 알려주세요.

의사는 수술 몇 주 전에 또는 고정 시점에 Visanne 복용을 중단하고 Visanne 복용을 다시 시작할 수 있다고 말할 수 있습니다.

혈전은 심장(심장마비 유발) 또는 뇌(뇌졸중 유발)의 혈관에서도 발생할 수 있습니다.

연구에서 Visanne과 유사한 프로게스토크 함유 제제와 심장마비 또는 뇌졸중 위험 증가 사이의 연관성에 대한 증거는 거의 또는 전혀 없습니다.

그러한 사건의 위험은 오히려 연령 증가와 관련이 있습니다. 고혈압(고혈압), 흡연.

고혈압이 있는 여성의 경우 프로게스토크에 의해 뇌졸중 위험이 약간 증가할 수 있습니다.

Visanne과 같은 제제를 포함합니다.

Visanne을 사용하는 동안 고혈압이 발생하면 사용을 중단하라는 지시를 받을 수 있습니다.

**혈전의 징후가 보이면 Visanne 복용을 중단하고 의사와 상담하십시오. 즉시.**

혈전의 가능한 징후는 다음과 같습니다.

- 특이한 기침

- 가슴, 팔 또는 흉골 아래의 통증
- 등으로 퍼지는 불편함
- 호흡곤란 및/또는 호흡곤란
- 한쪽 다리의 부기, 통증 또는 압통
- 얼굴, 팔 또는 다리의 갑작스러운 쇠약, 마비 또는 나쁜 '핀과 바늘', 특히 신체의 한 쪽
- 갑작스러운 보행 장애, 현기증, 균형 또는 조정 상실
- 심각하고 갑작스러운 복통
- 기절 공격, 또는 당신은 붓고
- 평소보다 더 심한 비정상적인 두통 또는 편두통
- 언어, 이해 또는 시력에 갑작스러운 문제

### 압

유방암은 피임약을 사용하지 않는 같은 연령의 여성보다 복합 경구 피임약(피임약)을 사용하는 여성에서 약간 더 자주 진단되었습니다. 그 차이가 알약으로 인한 것인지 아니면

암은 Pill 사용자에게서 더 일찍 발견되었습니다.

Visanne과 같은 프로게스테론 단독 제제에 대한 증거는 결정적이지 않습니다.

**정기적으로 유방을 확인하고 덩어리가 느껴지면 의사에게 연락하는 것이 중요합니다.**

드문 경우에 양성 간 종양 및 훨씬 더 드물게는 알약 사용자에게서 악성 간 종양이 보고되었습니다. 이 종양은 내부 출혈을 유발할 수 있습니다.

**복부에 심한 통증이 있으면 즉시 의사에게 연락하십시오.**

### 출혈 패턴

Visanne 치료는 대다수 여성의 월경 출혈 패턴에 영향을 미칩니다.

자궁 선근증 또는 자궁 평활근종이 있는 여성의 자궁 출혈은 Visanne에서 더 악화될 수 있습니다.

**출혈이 심하고 시간이 지남에 따라 계속되면 빈혈이 발생할 수 있습니다 (일부 경우 중증). 이러한 경우 의사는 Visanne 복용을 중단하도록 조언할 수 있습니다.**

### 골밀도(BMD)

Visanne을 장기간 사용하면 청소년(12~18세)의 골밀도(BMD)에 영향을 미칠 수 있으므로 의사는 다른 제품과 비교하여 Visanne 사용의 이점을 주의 깊게 평가할 것입니다.

골 손실(골다공증)의 잠재적 위험 예:

- 대사성 골질환
- 직계 가족 중 뼈 손실(골다공증)을 겪은 적이 있는 경우

- 넘어지거나 사고로 인한 것이 아닌 뼈가 부러진 적이 있는 경우

- 골량을 감소시킬 수 있는 약물 (예: 간질 약물 또는 스테로이드 사용)

- 낮은 체질량 지수 또는 섭식 장애 (예: 신경성 식욕 부진 또는 폭식증)

- 알코올 사용

- 흡연

Visanne을 사용할 때 의사는 골다공증 위험을 줄이기 위해 체중 부하 운동과 적절한 칼슘 및 비타민 D를 포함한 건강한 식단과 같은 식이 및 생활 습관 수정을 권장할 수도 있습니다. 뼈 건강을 개선하기 위해 의사에게 조언을 구하십시오.

---

## 복용 후 비잔

---

### 저장

**복용 시간이 될 때까지 정제를 블리스터 팩에 보관하십시오.**

포장에서 정제를 꺼내면 잘 보관되지 않을 수 있습니다.

**온도가 낮은 서늘하고 건조한 곳에 정제를 보관하십시오. 30°C 이하로 유지됩니다.**

**Visanne 또는 다른 약을 욕실, 싱크대 근처 또는 창틀에 보관하지 마십시오. 차 안에 약을 두지 마십시오.**

열과 습기는 일부를 파괴할 수 있습니다. 약.

의사가 이 약의 복용을 중단하거나 만료된 경우 날짜가 지나면 약사에게 남은 약을 어떻게 처리하는지 문의하십시오.

**사용하지 않은 약은 약사에게 반납하십시오.**

---

## 제품 설명

---

### 어떻게 생겼는지

Visanne은 한 면에 "B"가 표시된 원형의 흰색 내지 회백색 정제입니다. 블리스터 팩에는 요일이 표시되어 있으며 14개의 정제가 들어 있습니다.

Visanne은 1개월, 3개월, 6개월 패키지로 제공됩니다. 모든 팩 크기가 판매되는 것은 아닙니다.

### 재료

활성 성분:

- 디에노게스트 2mg

비활성 성분:

- 유당 일수화물
- 전분 감자
- 셀룰로오스-미세결정질
- 포비돈
- 정제된 활석
- 크로스포비돈
- 마그네슘 스테아레이트

Visanne 정제에는 글루텐, 타르트라진 또는 아조 염료가 포함되어 있지 않습니다.

### 공급업체

독일제:

바이엘 오스트레일리아 주식회사  
ABN 22 000 138 714  
875 퍼시픽 하이웨이  
핀블 NSW 2073

호주 등록 번호:

비잔 - AUST R 160465

### 작성일자

2020년 2월 26일

TGA 웹사이트 참조  
(www.ebs.tga.gov.au) 최신 정보  
호주 소비자 의약품 정보.

® 등록 상표 독일 바이엘 그룹

© 바이엘 오스트레일리아 Ltd 판권 소유

