



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : NPS

ВИЗАННА® (А именно Ан) Диеногест

ЧТО В ЭТОМ ЛИСТОЧКА

Эта брошюра отвечает на некоторые распространенные вопросы о Визанне. Он не содержит всех доступных Информации. Это не заменит разговора с вашим врачом или фармацевтом.

Все лекарства имеют риски и преимущества. Ваш врач взвесил риски, связанные с тем, что вы принимаете Визанну, и преимущества, которые, по их мнению, она вам принесет.

Если у вас есть какие-либо опасения или вы Если вы не уверены в приеме этого лекарства, обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

Храните эту листовку вместе с лекарством.

Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

ЧТО ТАКОЕ ВИЗАННА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

Визанну применяют для лечения болезненных симптомов поражения эндометрия (смещенная ткань слизистой оболочки матки).

Визанна содержит гормон прогестаген, диеногест.

Прием одной таблетки Визанны каждый день приводит к сокращению ткани эндометрия и уменьшению сопутствующих жалоб, таких как тазовая боль и болезненные ежемесячные кровотечения.

Спросите своего врача, если у вас есть какие-либо вопросы о том, почему это вам прописали лекарство.

Ваш врач, возможно, прописал его по другой причине.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ВИЗАННА

Когда вы не должны принимать его

Не принимайте Визанну, если у вас аллергия на:

- диеногест (активный ингредиент Визанны)
- любой из ингредиентов, перечисленных в конце этой брошюры.

Некоторые из симптомов аллергической реакции могут включать:

- сбивчивое дыхание
- свистящее дыхание или затрудненное дыхание
- отек лица, губ, языка или других частей тела
- сыпь, зуд или крапивница на коже.

Не принимайте Визанну, если у вас есть или были тромбы в:

- кровеносные сосуды ног (тромбоз глубоких вен - ТГВ)
- легкие (легочная эмболия - ЧП)
- сердце (сердечный приступ)
- головной мозг (инсульт)
- другие части тела.

Не принимайте Визанну, если вы обеспокоены повышенным риском образования тромбов.

Сгустки крови встречаются редко. Очень редко тромбы могут вызывать

серьезная постоянная инвалидность или даже смерть.

Не принимайте Визанну, если у вас есть или были:

- сахарный диабет с поражением сосудов
- серьезное заболевание печени, и ваша функция печени не вернулась к норме
- рак, который может развиваться под влиянием половых гормонов (например, молочной железы или половых органов)
- доброкачественная или злокачественная опухоль печени
- необъяснимые вагинальные кровотечения.

Если какое-либо из этих состояний возникает впервые при приеме Визанны, немедленно прекратите прием и сообщите об этом своему врачу.

Не принимайте Визанну, если вы беременны или думаете, что можете быть беременны.

Перед началом следует исключить возможность беременности. Визанна.

Не принимайте Визанну, если вы кормите грудью.

Не давайте Визанну ребенку. Визанна не применяется у детей женского пола до менархе (первое менструальное кровотечение).

Не принимайте Визанну после истечения срока годности, указанного на упаковке и блистере.

Срок годности указан на коробке и на каждом блистере после «EXP» (например, 11 18 относится к ноябрю 2018 г.). Срок годности относится к последнему дню этого месяца. Если срок его действия истек, верните его своему фармацевту для утилизации.

Не принимайте Визанну, если упаковка разорвана или на ней есть следы вскрытия.

Если упаковка повреждена, верните ее своему фармацевту для утилизации.

Если вы не уверены, следует ли вам начать принимать это лекарство, поговорите со своим врачом.

Прежде чем вы начнете принимать его

Сообщите своему врачу, если у вас есть аллергия на какие-либо другие лекарства, продукты питания, консерванты или красители.

Если Визанн используется при наличии любого из перечисленных ниже состояний, возможно, вам потребуется находиться под пристальным наблюдением. Ваш врач может объяснить это вам. Поэтому, если что-либо из перечисленного относится к вам, сообщите об этом своему врачу, прежде чем начинать использовать Визанну:

- ты куришь
- у тебя лишний вес
- у вас диабет или был диабет временно во время предыдущей беременности
- у вас высокое кровяное давление или развивается высокое кровяное давление при приеме Визанны
- **вы страдали от депрессии**
- если у вас была внематочная беременность
- у вас развивается заболевание печени при приеме Визанны. Симптомы могут включать пожелтение кожи или глаз или зуд по всему телу. Сообщите своему врачу также, если такие симптомы возникли во время предыдущей беременности
- у вас хлоазма (желтовато-коричневые пигментные пятна на коже, особенно на лице)
— если это так, избегайте воздействия солнца или ультрафиолетового излучения
- у вас или у кого-либо из ваших ближайших родственников были тромбы в ногах или легких, сердечный приступ, инсульт, рак молочной железы или высокий уровень холестерина.

Визанн содержит моногидрат лактозы.

Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу, прежде чем начать принимать Визанну.

Прием других лекарств

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете какие-либо другие лекарства, в том числе те, которые вы получаете без рецепта в аптеке, супермаркете или магазине здоровой пищи.

Некоторые лекарства/пищевые продукты и Визанна могут мешать друг другу. Это включает:

- лекарства, используемые для лечения эпилепсии, такие как фенитоин, примидон, барбитураты (например, фенобарбитон), карбамазепин, окскарбамазепин, топирамат, фелбамат
- лекарства, используемые для лечения депрессии, такие как флуоксетин, флувоксамин
- дилтиазем, верапамил, которые используются для лечения высокого кровяного давления, боли в груди или нерегулярного сердцебиения
- лекарства, используемые для лечения туберкулеза, такие как рифампицин, рифабутин
- лекарства, используемые для лечения ВИЧ или вируса гепатита С (HCV)
- лекарства, используемые для лечения грибковых инфекций, такие как кетоконазол, итраконазол, флуконазол, вориконазол)
- некоторые антибиотики (например, эритромицин, кларитромицин)
- циметидин, антацид
- растительные лекарственные средства, содержащие зверобой
- грейпфрут.

На эти лекарства/продукты может воздействовать Визанна, или они могут повлиять на эффективность ее действия. Вашему врачу может потребоваться изменить дозу вашего лекарства или назначить другое лекарство.

Попросите совета у своего врача или фармацевта, прежде чем принимать какие-либо другие лекарственные средства.

КАК ВЗЯТЬ ВИЗАННА

Внимательно следуйте всем указаниям, данным вам врачом или фармацевтом.

Они могут отличаться от информации, содержащейся в данной брошюре.

Если вы не понимаете инструкции на упаковке, напечатанные на этикетке фармацевта или в этом листке-вкладыше, обратитесь к своему врачу или фармацевту в помощь.

Как это взять

Принимайте по одной таблетке в день примерно в одно и то же время без перерыва.

Следуйте направлению стрелок на блистерной упаковке, пока не будут приняты все таблетки.

Прием таблеток можно начинать в любой день менструального цикла.

Таблетки необходимо принимать непрерывно, невзирая на вагинальное кровотечение. Это означает, что после того, как первая упаковка была закончена, следующая должна быть начата без перерыва.

Проглотите таблетку целиком, запивая водой.

Неважно, если вы принимаете его до или после еды.

Как долго принимать Визанну

Продолжайте принимать лекарство до тех пор, пока ваш врач говорит вам.

Это лекарство помогает контролировать ваше состояние, но не лечит его. Важно продолжать принимать лекарство, даже если вы чувствуете себя хорошо.

Если вы забыли принять Визанну

Если вы забыли принять таблетку или у вас рвота и/или диарея:

Эффективность Визанны может быть снижена в случае пропуска приема таблеток или рвоты и/или диареи (если они возникают в течение 3-4 часов после приема таблетки). В случае пропуска таблетки (таблеток) вам следует принять только одну таблетку, как только вы

помните, и затем следует продолжать принимать таблетку в обычное время на следующий день. Таблетку, не всосавшуюся из-за рвоты или диареи, также следует заменить одной таблеткой.

Если вы приняли слишком много (передозировка)

Немедленно свяжитесь с Информационным центром по отравлениям (Австралия: 13 11 26) за консультацией или посетите

Авария и чрезвычайная ситуация на ближайшую больницу, если вы считаете, что вы или кто-либо другой принял слишком много Визанны.

Делайте это, даже если нет признаков дискомфорта или отравления.

Вам может понадобиться срочная медицинская помощь.

ПОКА ВЫ ПРИЕМ ВИЗАННЫ

Вещи, которые вы должны сделать

Сообщите другим врачам, стоматологам и фармацевтам, которые лечат вас, что вы принимаете это лекарство.

Если вы собираетесь пройти какие-либо анализы крови, сообщите своему врачу, что вы принимаете это лекарство.

Это может повлиять на результаты некоторых тестов.

Если вам предстоит операция, сообщите хирургу или анестезиологу, что вы принимаете это лекарство.

Это может повлиять на другие лекарства, используемые во время операции.

Придерживайтесь всех назначений врача, чтобы можно было проверить ваш прогресс.

Ваш врач может время от времени проводить некоторые тесты, чтобы убедиться, что лекарство работает, и предотвратить нежелательные побочные эффекты.

Если вы забеременели во время приема этого лекарства, немедленно сообщите об этом своему врачу.

Вещи, которые вы не должны делать

Не принимайте Визанну для лечения каких-либо других жалоб, если только ваш врач не скажет вам об этом.

Не передавайте свое лекарство никому другому, даже если у него такое же заболевание, как у вас.

Вещи, о которых нужно быть осторожным

Чтобы не забеременеть, следует использовать негормональные средства контрацепции, такие как презерватив или другой барьерный метод.

Вы не должны использовать контрацептивы, содержащие половые гормоны, в любой форме (таблетки, пластыри, внутриматочные система) при приеме Визанны.

Не используйте ритмический или температурный методы. Эти методы могут быть ненадежными.

Если в исключительном случае вы забеременеете во время применения Визанна, у принимающих препараты, содержащие прогестагены, такие как Визанна, выше вероятность внематочной беременности (эмбрион развивается вне матки).

Сообщите своему врачу, прежде чем начать принимать Визанну, если у вас была внематочная беременность в прошлом или у вас нарушена функция фаллопиевых труб.

Если вы испытываете необъяснимые абдоминальные жалобы, которые отличаются от симптомов, которые вы обычно испытываете в эндометриоза, вам следует немедленно обратиться к врачу, потому что следует учитывать внематочную беременность.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Сообщите своему врачу или фармацевту как можно скорее, если вы плохо себя чувствуете во время приема Визанна.

Все лекарства могут иметь побочные эффекты. Иногда они серьезные, чаще всего нет. Вам может не понадобиться медицинская помощь, если у вас возникнут некоторые побочные эффекты.

Не пугайтесь этого списка возможных побочных эффектов, вы можете не испытывать ни одного из них.

Следующий список включает наиболее распространенные побочные эффекты Визанны. Они обычно мягкие и уменьшаются со временем.

Если вы заметили какой-либо из следующих побочных эффектов, и они вас беспокоят, сообщите об этом своему врачу или фармацевту:

- головная боль или мигрень
- дискомфорт в груди,
- **ПРИЛИВЫ**
- изменения настроения, включая депрессию, раздражительность, нервозность, проблемы со сном, потеря интереса к сексу
- прыщи, выпадение волос
- тошнота, боль в животе, метеоризм, вздутие живота или рвота
- увеличение веса
- боль в спине
- маточные/вагинальные кровотечения, включая кровянистые выделения
- необычная слабость

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы заметили что-то еще, что заставляет вас чувствовать себя плохо.

Другие побочные эффекты, не указанные в списке, также могут возникать у некоторых людей.

Тромбоз

Тромбоз – это образование кровяного сгустка, который может блокировать кровоток судно.

Тромбоз иногда возникает в глубокие вены ног (ТГВ). Если этот тромб отрывается от вен, где он образовался, он может достичь и закупорить артерии легких, вызывая легочную эмболию (ТЭЛА).

Тромбоз глубоких вен встречается редко. Это может развиваться независимо от того, принимаете ли вы Визанну. Это также может произойти, если вы забеременеете.

Риск венозной тромбоземболии (ТГВ или ТЭЛА), по-видимому, несколько выше у принимающих гормональные (содержащие прогестаген) препараты, такие как Визан, чем у не принимавших, но не такой высокий, как во время беременности или при использовании комбинированных пероральных препаратов.

противозачаточные средства (таблетки).

Риск венозной тромбоэмболии увеличивается, например:

- с возрастом
- если у тебя лишний вес
- вскоре после родов
- если у вас был сгусток крови в прошлом
- если у кого-либо из ваших ближайших родственников был тромб в относительно раннем возрасте
- во время длительных периодов иммобилизации, например, после хирургического вмешательства или на ногах в гипсе/шинах и т. д.

Сообщите своему врачу, что вы принимаете Визанну, заблаговременно до предполагаемой госпитализации или операции.

Ваш врач может порекомендовать вам прекратить прием Визанны за несколько недель до операции или во время иммобилизации и когда вы сможете снова начать принимать Визанну.

Сгустки крови также могут образовываться в кровеносных сосудах сердца (вызывая сердечный приступ) или головного мозга (вызывая инсульт).

Из исследований мало или совсем нет доказательств связи между препаратами, содержащими прогестаген, подобными Визанне, и повышенным риском сердечного приступа или инсульта.

Риск таких событий скорее связан с возрастом, гипертония (высокое кровяное давление) и курение.

У женщин с артериальной гипертензией риск инсульта может быть несколько увеличен прогестагеном. Содержащие такие препараты, как Визанна.

Если у вас разовьется высокое кровяное давление при использовании Visanne, вам может быть рекомендовано прекратить его использование.

Если вы заметили возможные признаки тромба, прекратите прием Визанны и обратитесь к врачу. немедленно.

Возможные признаки сгустка крови включают в себя:

- необычный кашель

- боль в груди, руке или ниже грудины
- дискомфорт, иррадирующий в спину
- одышка и/или затрудненное дыхание
- опухоль, боль или нежность одной ноги
- внезапная слабость, онемение или сильное покалывание лица, руки или ноги, особенно на одной стороне тела
- внезапные проблемы с ходьбой, головокружение, потеря равновесия или координации
- сильные, внезапные боли в животе
- приступ обморока, или вы рухнете
- необычные головные боли или мигрени, которые хуже, чем обычно
- внезапные проблемы с речью, пониманием или зрением

Рак

Рак молочной железы диагностируется несколько чаще у женщин, применяющих комбинированные оральные контрацептивы (таблетки), чем у женщин того же возраста, не принимающих противозачаточные таблетки. Неизвестно, вызвана ли эта разница таблетками или

Рак был обнаружен ранее у пользователей противозачаточных таблеток.

Доказательства неубедительны в отношении препаратов, содержащих только прогестерон, таких как Визанна.

Важно регулярно проверять грудь и обращаться к врачу, если вы чувствуете какую-либо опухоль.

В редких случаях у принимавших противозачаточные таблетки сообщалось о доброкачественных опухолях печени и еще реже о злокачественных опухолях печени. Эти опухоли могут привести к внутреннему кровотечению.

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас сильная боль в животе.

Образцы кровотечения

Лечение Визанной влияет на характер менструальных кровотечений у большинства женщин.

Маточные кровотечения у женщин, например, с аденомиозом матки или лейомиомой матки, могут усиливаться при применении Визанны.

Если кровотечение обильное и непрерывное с течением времени, это может привести к анемии (в некоторых случаях тяжелой степени). В таких случаях ваш врач может посоветовать вам прекратить прием Визанны.

Минеральная плотность костей (BMD)

Длительное использование Визанны может повлиять на минеральную плотность костной ткани (МПКТ) у подростков (от 12 до < 18 лет), поэтому ваш врач тщательно взвесит преимущества использования Визанны по сравнению с другими препаратами. потенциальные риски потери костной массы (остеопороз), например

- метаболическое заболевание костей
- если кто-либо из ваших ближайших родственников когда-либо страдал от потери костной массы (остеопороза)
- если вы когда-либо ломали кость, которая не была вызвана падением или несчастным случаем
- использование лекарств, которые могут уменьшить костную массу, например, лекарства от эпилепсии или стероиды
- низкий индекс массы тела или расстройство пищевого поведения, например нервная анорексия или булимия
- употребление алкоголя
- курение

При использовании Визанны ваш врач может также порекомендовать изменения в питании и образе жизни, такие как упражнения с отягощениями и здоровое питание, включающее достаточное количество кальция и витамина D, чтобы снизить риск развития остеопороза. Попросите вашего врача посоветовать, как улучшить здоровье костей.

ПОСЛЕ ПРИЕМА ВИЗАННА

Хранилище

Храните таблетки в блистерной упаковке до тех пор, пока не придет время их принимать.

Если вы достанете таблетки из упаковки, они могут плохо храниться.

Храните таблетки в прохладном сухом месте, где температура остается ниже 30°C.

Не храните Визанну или любое другое лекарство в ванной, рядом с раковиной или на подоконнике. Не оставляйте лекарства в машине.

Жара и сырость могут разрушить некоторые лекарства.

Если ваш врач говорит вам прекратить прием этого лекарства или срок годности дата прошла, спросите своего фармацевта, что делать с оставшимся лекарством.

Верните любое неиспользованное лекарство своему фармацевту.

ТОВАР ОПИСАНИЕ

На что это похоже

Визанна представляет собой круглую таблетку белого или почти белого цвета с маркировкой «В» на одной стороне. Блистерная упаковка отмечена днями недели и содержит 14 таблеток.

Визанна выпускается в упаковках по 1 месяцу, 3 месяцам и 6 месяцам. Не все размеры упаковки могут продаваться.

Ингредиенты

Активные ингредиенты:

- диеногест 2 мг

Неактивные Ингредиенты:

- лактозы моногидрат
- картофельный крахмал
- целлюлозно-микрористаллическая
- повидон
- очищенный тальк
- кросповидон
- стеарат магния

Таблетки Visanne не содержат глютен, тартразин или азокрасители.

Поставщик

Сделано в Германии для:

Байер Австралия Лтд.
ABN 22 000 138 714 875
Тихоокеанское шоссе
Пимбл Новый Южный Уэльс 2073

Австралийский

регистрационный номер:

Визанна - AUST R 160465

Дата подготовки

26 февраля 2020 г.

См. веб-сайт TGA

(www.ebs.tga.gov.au) для последних

Информация об австралийской потребительской медицине.

® Зарегистрированная торговая марка

Группа «Байер», Германия

© Байер Австралия Лтд.

Все права защищены

