



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : NPS

VISANE® (กล่าวคือ- ัน)

มีอะไรอยู่ในนี้ ใบปลิว

เอกสารนี้ตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับวิชาน มันไม่ได้มีทั้งหมดที่มีอยู่

ข้อมูล. ไม่ใช่แทนการพูดคุยกับแพทย์ หรือเภสัชกรของคุณ

ยาทั้งหมดมีความเสี่ยงและผลประโยชน์ แพทย์ของคุณได้ซึ่งนำหน้าความเสี่ยงของคุณที่ใช้ยา Visane กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะมีต่อคุณ

หากท่านมีข้อกังวลใดๆ หรือกำลังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้ยานี้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม เก็บเอกสารนี้พร้อมกัญยา

คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง

วิสัยทัศน์คืออะไร ใช้สำหรับ

Visanne ใช้สำหรับรักษาอาการเจ็บปวดของ

รอยโรคเยื่อโพรงมดลูก (เนื้อเยื่อที่ถูกรบกวนของเยื่อบุมดลูก)

Visanne มีฮอร์โมนโปรเจสโตเจน dienogest

การรับประทานยา Visanne วันละ 1 เม็ดจะทำให้เนื้อเยื่อเยื่อโพรงมดลูกหดตัวและช่วยลดการร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง เช่น ปวดกระดูกเชิงกรานและเลือดออกประจำเดือนอย่างเจ็บปวด

ถามแพทย์ของคุณหากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับสาเหตุนี้ได้กำหนดยาให้คุณแล้ว

แพทย์ของคุณอาจกำหนดให้ด้วยเหตุผลอื่น

ก่อนที่คุณจะใช้ วิชานี้

เมื่อต้องไม่รับ

อย่าใช้ Visane หากคุณแพ้:

- dienogest (สารออกฤทธิ์ใน Visanne)
- ส่วนผสมใด ๆ ที่ระบุไว้ที่ส่วนท้ายของแผ่นพับนี้

อาการแพ้บางอย่างอาจรวมถึง:

- หายใจถี่
- หายใจมีเสียงหวีดหรือหายใจลำบาก
- บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
- ผื่นคันหรือลมพิษบนผิวหนัง

อย่ารับประทาน Visane หากคุณมีหรือเคยมีลิ่มเลือดใน:

- หลอดเลือดที่ขา (deep vein thrombosis - DVT)
- ปอด (pulmonary embolism)

- ปรึกษาแพทย์

- หัวใจ (หัวใจวาย)
- สมอ (จังหวะ)
- ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

อย่าใช้ Visane หากคุณกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของลิ่มเลือด

ลิ่มเลือดนั้นหายาก ลิ่มเลือดบางครั้งอาจทำให้เกิด

คุณภาพการวางร้ายแรงหรืออาจถึงแก่ชีวิตได้

อย่าใช้ Visane ถ้าคุณมีหรือเคย:

- เบาหวานกับหลอดเลือดเสียหาย
- โรคตับรุนแรงและการทำงานของตับไม่กลับมาเป็นปกติ
- มะเร็งที่อาจเติบโตภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนเพศ (เช่นของเต้านมหรืออวัยวะสืบพันธุ์)
- เนื้องอกในตับที่เป็นพิษเป็นภัยหรือร้าย
- เลือดออกทางช่องคลอดไม่ได้อธิบาย

หากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกขณะรับประทานวิชาน ให้หยุดใช้ทันทีและแจ้งให้แพทย์ทราบ

อย่ารับประทาน Visane หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือคิดว่าคุณอาจกำลังตั้งครรภ์

ควรตัดความเป็นไปได้ของการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มวิชาน.

อย่าใช้ Visane ถ้าคุณให้นมลูก

อย่าให้วิชานกับลูก Visanne ห้ามใช้ในเด็กผู้หญิงก่อนมีประจำเดือน (เลือดออกครั้งแรก)

ห้ามรับประทาน Visane หลังจากวันหมดอายุที่พิมพ์บนของและตุ่ม

วันหมดอายุพิมพ์อยู่บนกล่องและบนแต่ละตุ่มหลัง "EXP" (เช่น 11 18 หมายถึงเดือนพฤศจิกายน 2018) วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น หากหมดอายุให้ส่งคืนเภสัชกรเพื่อกำจัด

ห้ามใช้ Visane หากบรรจุกัมมันตภาพ ขาดหรือมีสัญญาณของการปลอม แปลง

หากบรรจุกัมมันตภาพเสียหาย ให้ส่งคืน
เภสัชกรเพื่อกำจัด

หากคุณไม่แน่ใจว่าควรเริ่มใช้ยานี้หรือ ไม่ ให้ปรึกษาแพทย์

ก่อนจะเริ่มทาน

แจ้งแพทย์หากคุณแพ้ยา อาหาร
สารกันบูด หรือสีย้อมอื่นๆ

หากใช้ Visanne ในสภาวะที่แสดง
ด้านล่าง คุณอาจจำเป็นต้องอยู่ภายใต้
การดูแลอย่างใกล้ชิด แพทย์ของคุณ
สามารถอธิบายเรื่องนี้กับคุณได้ ดังนั้น
หากข้อใดข้อหนึ่งตรงกับคุณ โปรด
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเริ่มใช้
Visane:

- คุณสูบบุหรี่
- คุณมีน้ำหนักรุนแรง
- คุณเป็นเบาหวานหรือเป็นเบา
หวานชั่วคราวในระหว่างตั้ง
ครรภ์ครั้งก่อน
- คุณมีความดันโลหิตสูงหรือมีความ
ดันโลหิตสูง
ขณะรับประทานวิซัน
- คุณเป็นโรคซึมเศร้า
- หากคุณมีการตั้งครรภ์นอก
มดลูก
- คุณเป็นโรคตับขณะรับประทาน
วิซัน
อาการอาจรวมถึง
สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตาหรือมี
อาการคันทั่วร่างกาย แจ้งแพทย์ของ
คุณด้วยหากเป็นเช่นนั้น
อาการที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้ง
ครรภ์ครั้งก่อน
- คุณมีเกล็ดเลือด (รอยคล้ำสีน้ำตาล
เหลืองบนผิวหนังโดยเฉพาะที่ใบหน้า)
 - ถ้าเป็นเช่นนั้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
แสงแดดหรือรังสีอัลตราไวโอเล็ต
- คุณหรือใครก็ตามในครอบครัวที่ใกล้
ชิดของคุณมีเลือดอุดตันที่ขาหรือ
ปอด หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง
มะเร็งเต้านม หรือคอเลสเตอรอลสูง

Visanne มีแอลกอฮอล์ใน ไซเตรต

หากคุณแพ้แอลกอฮอล์ ให้ติดต่อ
แพทย์ก่อนเริ่มทานวิซัน

กินยาตัวอื่น

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหาก
คุณกำลังใช้ยาตัวอื่นอยู่
ยา รวมถึงยาใดๆ ที่คุณได้รับโดยไม่
ต้องมีใบสั่งยาจากร้านขายยา ซูเปอร์
มาร์เก็ต หรือร้านขายอาหารเพื่อ
สุขภาพ

ยา/อาหารและยาบางชนิดและวิซันอาจ
รบกวนซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมถึง:

- ยาที่ใช้รักษาโรคลมชัก เช่น
phenytoin, primidone,
barbiturates (เช่น
ฟีโนบาร์บิทัล),
คาร์บามาซีพีน,
ออกซคาร์บามาซีพีน, โทไพราเมต,
เฟลบาเมก
- ยาที่ใช้รักษาอาการซึมเศร้า เช่น
fluoxetine, fluvoxamine
- ดิลไทอาเซม, เวราพามิล ซึ่งเป็นยา
รักษาความดันโลหิตสูง อาการเจ็บ
หน้าอก หรือหัวใจเต้นผิดปกติ
- ยาที่ใช้รักษาวัณโรคเช่น
rifampicin, rifabutin
- ยาที่ใช้รักษาเอชไอวีหรือไวรัสตับ
อักเสบบี (HCV)
- ยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อรา เช่น คีโต
โคนาโซล อิทราโคนาโซล ฟลูโคนา
โซล
โวลีโคนาโซล)
- ยาปฏิชีวนะบางชนิด (เช่น
erythromycin, clarithromycin)
- ซิเมทิดีน ยาลดกรด
- ยาสมุนไพรที่มีสารโทเซนต์จอนห์
- เกรฟฟรุ๊ต.

ยา/อาหารเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจาก
Visane หรืออาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงาน แพทย์ของคุณอาจต้อง
เปลี่ยนขนาดยาหรือสิ่งยาอื่น

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคำ
แนะนำก่อนรับประทานยาอื่นๆ

วิธีการใช้ วิซัน

ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกรของคุณอย่างระมัดระวัง

อาจแตกต่างไปจากข้อมูลในเอกสารฉบับ
นี้

หากคุณไม่เข้าใจคำแนะนำบนบรรจุ
ภัณฑ์ที่พิมพ์บนฉลากของเภสัชกร
หรือในเอกสารฉบับนี้ ให้ปรึกษาแพทย์
ของคุณหรือ

เภสัชกรเพื่อขอความช่วยเหลือ

วิธีรับประทาน

รับประทานวันละ 1 เม็ดในเวลา
เดียวกันในแต่ละวันโดยไม่หยุดพัก

ปฏิบัติตามทิศทางของลูกศรบนก้อน
ตุ่มจนกระทั่งเม็ดยาหมด

สามารถเริ่มรับประทานแท็บเล็ตได้ทุก
วันของรอบเดือน

ต้องรับประทานยาเม็ดอย่างต่อเนื่องโดย
ไม่คำนึงถึงเลือดออกทางช่องคลอด ซึ่ง
หมายความว่าหลังจากแพ็คแรกเสร็จสิ้น
แพ็คต่อไปควรเริ่มต้นโดยไม่หยุดชะงัก

กลืนทั้งเม็ดด้วยน้ำ

ไม่ว่าจะทานก่อนหรือหลังอาหาร

วิธีของใช้เวลานานเท่าไร?

กินยาต่อไปตราบนานเท่าที่แพทย์ของ คุณบอกคุณ

ยานี้ช่วยควบคุมอาการของคุณ แต่ไม่
สามารถรักษาได้ สิ่งสำคัญคือต้องทาน
ยาต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี

หากคุณลืมทานวิซัน

หากคุณลืมกินยาเม็ดหรือมีอาการ อาเจียนและ/หรือท้องร่วง:

ประสิทธิภาพของ Visanne อาจลดลง
ในกรณีที่ลืมรับประทานยาเม็ดหรือ
อาเจียน และ/หรือท้องร่วง (หากเกิดขึ้น
ภายใน 3-4 ชั่วโมงหลังรับประทานยาเม็ด
) กรณีที่พลาดเม็ด ควรทานเพียง 1 เม็ด
ทันที

จำไว้ว่าควรทานยาเม็ดต่อไปตามเวลาปกติในวันถัดไป แท็บเล็ตที่ไม่ดูดซึมเนื่องจากอาการอาเจียนหรือท้องเสียควรถูกแทนที่ด้วยหนึ่งเม็ด

ถ้าคุณกินมากเกินไป (ยาเกินขนาด)

ติดต่อศูนย์ข้อมูลสารพิษทันที (ออสเตรเลีย: 13 11 26) เพื่อขอคำแนะนำหรือไปที่อุบัติเหตุและฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หากคุณคิดว่าคุณหรือใครก็ตามที่รับประทานวิชานมากเกินไป

ถ้าเช่นนี้แม้ว่าจะไม่มีอาการไม่สบายหรือเป็นพิษก็ตาม
คุณอาจต้องไปพบแพทย์โดยด่วน

ขณะที่คุณอยู่รับวิชา

สิ่งที่ต้องทำ

แจ้งแพทย์ กทันตแพทย์ และเภสัชกรคนอื่น ๆ ที่ปฏิบัติต่อคุณว่าคุณกำลังใช้ยา

หากคุณกำลังจะตรวจเลือด ออกแพทยว่าคุณกำลังใช้ยา

อาจรบกวนผลการทดสอบบางอย่าง

หากคุณกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด แจ้งศัลยแพทย์หรือวิสัญญีแพทย์ว่าคุณกำลังใช้ยา

อาจส่งผลกระทบต่อยาอื่นที่ใช้ระหว่างการผ่าตัด

เก็บการนัดหมายของแพทย์ทั้งหมดเพื่อให้สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคุณได้

แพทย์ของคุณอาจทำการทดสอบเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่ายาที่กำลังทำงานและเพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์

หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ยา แจ้งให้แพทย์ทราบทันที

สิ่งที่ห้ามทำ

ห้ามใช้ยา Visane รักษาอาการหรือเงื่อนไขอื่น ๆ เว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

อย่าให้ยาของคุณแก่ผู้อื่น แม้ว่าจะมีอาการเช่นเดียวกับคุณก็ตาม

สิ่งที่ต้องระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ คุณควรใช้ non-hormonal

ข้อควรระวังในการคุมกำเนิด เช่น ถุงยางอนามัย หรือวิธีอื่น ๆ

คุณต้องไม่ใช้ฮอร์โมนเพศที่มียาคุมกำเนิดในรูปแบบใด ๆ (เม็ด, แผ่นแปะ, มดลูก ระบบ) ขณะรับวิชา

อย่าใช้วิธีจังหวะหรืออุณหภูมิจากวิธีการเหล่านี้ไม่น่าเชื่อถือ

หากในกรณีพิเศษที่คุณควรตั้งครรภ์ระหว่างการใช้ Visanne มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ใช้โปรเจสโตเจนที่มีการเตรียมการ เช่น Visanne จะมีการตั้งครรภ์นอกมดลูก (ตัวอ่อนพัฒนานอกมดลูก)

แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบก่อนเริ่มใช้ยา Visanne หากเคยตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือมีการทำงานของท่อ นำไปขบพร่อง

หากคุณพบอาการท้องอืดโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งแตกต่างจากอาการที่คุณมักพบจาก

endometriosis คุณควรติดต่อแพทย์ของคุณทันทีเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกจะต้องได้รับการพิจารณา

ผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบโดยเร็วที่สุดหากคุณรู้สึกไม่สบายขณะรับวิชา

ยาทุกชนิดอาจมีผลข้างเคียง บางครั้งก็จริงจัง ส่วนใหญ่ไม่ คุณอาจไม่ต้องการการรักษาพยาบาลหากคุณได้รับผลข้างเคียงบางอย่าง

อย่าตื่นตระหนกกับรายการผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น คุณอาจไม่พบอาการเหล่านี้

รายการต่อไปนีรวมถึงผลข้างเคียงที่พบบ่อยของวิชา สิ่งเหล่านี้มีจะไม่รุนแรงและลดลงตามเวลา

หากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงใด ๆ ต่อไปนี้และทำให้คุณกังวลใจ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ:

- ปวดหัวหรือไมเกรน
- ความรู้สึกไม่สบายเต้านม,
- ร้อนวูบวาบ
- การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์รวมทั้งภาวะซึมเศร้า, หงุดหงิด, ประหม่า, ปัญหาในการนอนหลับ, หมดความสนใจในเพศ
- สีว ผมร่วง
- คลื่นไส้, ปวดท้อง, ลม, ท้องบวมหรืออาเจียน
- น้ำหนักมากขึ้น, น้ำหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น
- ปวดหลัง
- เลือดออกในโพรงมดลูก/ช่องคลอด รวมทั้งการจำ
- จุดอ่อนผิดปกติ

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณสังเกตเห็นสิ่งอื่นที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบาย

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อาจเกิดขึ้นในบางคน

การเกิดลิ่มเลือด

ลิ่มเลือดอุดตันคือการก่อตัวของลิ่มเลือดที่อาจปิดกั้นเลือดเรือ.

ลิ่มเลือดอุดตันบางครั้งเกิดขึ้นในหลอดเลือดดำส่วนลึกของขา (DVT) หากลิ่มเลือดนี้แตกออกจากเส้นเลือดที่ก่อตัวลิ่มเลือดอาจไปถึงและปิดกั้นหลอดเลือดแดงของปอด ทำให้เกิดเส้นเลือดอุดตันที่ปอด (PE)

ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำลึกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก มันสามารถพัฒนาได้ไม่ว่าคุณจะทาน Visane หรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้หากคุณตั้งครรภ์

ความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (DVT หรือ PE) ดูเหมือนจะสูงขึ้นเล็กน้อยในผู้ใช้ยาที่มีฮอร์โมน (มีโปรเจสโตเจน) เช่น Visanne มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ยา แต่ไม่สูงเท่ากับระหว่างตั้งครรภ์หรือระหว่างการใช้ช่องปากแบบผสม

ยาคุมกำเนิด (ยาเม็ด).

ความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
ในหลอดเลือดดำเพิ่มขึ้น เช่น

- ด้วยอายุที่มากขึ้น
- ถ้าคุณมีน้ำหนักเกิน
- หลังคลอดได้ไม่นาน
- หากคุณมีลิ่มเลือดในอดีต
- ถ้าคุณในครอบครัวของคุณมีลิ่มเลือดตั้งแต่อายุน้อย
- ระหว่างการตั้งครรภ์เป็นเวลานาน เช่น หลังการผ่าตัด หรือมีขาเป็นปูน/เปลือก เป็นต้น

บอกแพทย์ว่าคุณกำลังใช้ยา Visane อยู่ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือการผ่าตัด

แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณหยุดใช้ Visanne หลายสัปดาห์ก่อนการผ่าตัด หรือในช่วงเวลาของการตั้งครรภ์และเมื่อคุณสามารถเริ่มใช้ Visane ได้อีกครั้ง

ลิ่มเลือดอาจเกิดขึ้นในหลอดเลือดของหัวใจ (ทำให้เกิดอาการหัวใจวาย) หรือในสมอง (ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง)

จากการศึกษาวิจัย มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยสำหรับความเชื่อมโยงระหว่างโปรเจสโตเจนที่มีฤทธิ์เตรียมการที่คล้ายกับ Visanne และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง

ความเสี่ยงของเหตุการณ์ดังกล่าวค่อนข้างเกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มขึ้น ความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตสูง) และการสูบบุหรี่

ในสตรีที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากฮอร์โมนโปรเจสโตเจนที่มีเครื่องปรุงอย่างวิซาน

หากคุณมีความดันโลหิตสูงขณะใช้ Visanne คุณอาจได้รับคำสั่งให้หยุดใช้

หากคุณสังเกตเห็นสัญญาณของลิ่มเลือด ให้หยุดใช้ยา Visanne และปรึกษาแพทย์ของคุณโดยทันที.

สัญญาณที่เป็นไปได้ของลิ่มเลือด ได้แก่:

- อาการไอผิดปกติ

- เจ็บหน้าอก แขน หรือใต้กระดูกหน้าอก
- ความรู้สึกไม่สบายแน่นไปทางด้านหลัง
- หายใจลำบากและ/หรือหายใจลำบาก
- บวม ปวด หรือปวดขาข้างเดียว
- อาการอ่อนแรงอย่างกะทันหัน ชา หรือ 'เขม่นมุด' ที่ใบหน้า แขนหรือขาไม่ดี โดยเฉพาะที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย
- เดินลำบากกะทันหัน เวียนหัว เสียการทรงตัวหรือประสานงาน
- ปวดท้องรุนแรงกะทันหัน
- การโจมตีเป็นลมหรือคุณล้มลง
- ปวดหัวผิดปกติหรือไมเกรนที่เลวร้ายกว่าปกติ
- ปัญหากะทันหันกับคำพูด ความเข้าใจ หรือการมองเห็นของคุณ

มะเร็ง

มะเร็งเต้านมได้รับการวินิจฉัยบ่อยขึ้นเล็กน้อยในสตรีที่ใช้ยาคุมกำเนิดแบบผสม (ยาเม็ด) มากกว่าในสตรีอายุเท่ากันที่ไม่ได้ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ไม่ทราบว่าความแตกต่างเกิดจากยาหรือว่า

ตรวจพบมะเร็งก่อนหน้านี้ในผู้ใช้ Pill

หลักฐานไม่สามารถสรุปได้สำหรับการเตรียมโปรเจสโตเจนเท่านั้นเช่น Visanne

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรตรวจเต้านมเป็นประจำและติดต่อแพทย์หากคุณรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อ

ในบางกรณีพบไม่บ่อยนักว่าจะมีเนื้องอกในตับที่เป็นพิษเป็นภัย และพบได้ยากกว่านั้น มีรายงานเกี่ยวกับเนื้องอกในตับที่เป็นมะเร็งในผู้ใช้ยา เนื้องอกเหล่านี้จะทำให้เลือดออกภายในได้

ติดต่อแพทย์ของคุณทันทีหากคุณมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง

รูปแบบเลือดออก

การรักษาด้วย Visanne ส่งผลต่อรูปแบบการมีประจำเดือนในผู้หญิงส่วนใหญ่

เลือดออกในมดลูกในสตรีเช่น adenomyosis uteri หรือ uterine leiomyomata อาจแยแสเมื่อใช้ Visanne

หากเลือดออกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจนำไปสู่ภาวะโลหิตจาง (รุนแรงในบางกรณี) ในกรณีเช่นนี้แพทย์ของคุณอาจแนะนำให้หยุดใช้วิซาน

ความหนาแน่นของกระดูก (BMD)

การใช้ Visanne ในระยะยาวอาจส่งผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูก (BMD) ของวัยรุ่น (อายุ 12 ถึง < 18 ปี) ดังนั้นแพทย์ของคุณจะชั่งน้ำหนักประโยชน์ของการใช้ Visanne กับผู้อื่นอย่างรอบคอบ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดการสูญเสียมวลกระดูก (โรคกระดูกพรุน) เช่น

- โรคกระดูกเปราะหลาย
- ถ้าใครในครอบครัวของคุณเคยประสบปัญหาการสูญเสียมวลกระดูก (โรคกระดูกพรุน)
- หากเคยกระดูกหักที่ไม่ได้เกิดจากการหกล้มหรืออุบัติเหตุ
- การใช้ยาที่สามารถลดมวลกระดูกได้ เช่น ยารักษาโรคลมบ้าหมู หรือสเตียรอยด์
- ดัชนีมวลกายต่ำหรือความผิดปกติของการกินเช่น anorexia nervosa หรือ bulimia
- การใช้แอลกอฮอล์
- สูบบุหรี่

เมื่อใช้ Visanne แพทย์ของคุณอาจแนะนำการปรับเปลี่ยนอาหารและวิถีชีวิต เช่น การออกกำลังกายโดยแบกน้ำหนักและการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งแคลเซียมและวิตามินดีที่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุน ขอคำแนะนำจากแพทย์เพื่อปรับปรุงสุขภาพกระดูกของคุณ

หลังจากทาน วิซันเน่

พื้นที่จัดเก็บ

เก็บเก็บเล็ดของคุณไว้ในกล่องตม จนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องทาน

หากคุณนำเก็บเล็ดออกจากแพ็ค
เก็บเล็ดอาจเก็บไว้ได้ไม่ดี

เก็บเก็บเล็ดไว้ในที่แห้งและเย็นซึ่ง มีอุณหภูมิ อยู่ต่ำกว่า 30°C

ห้ามเก็บวิซันเน่หรือยาอื่นๆ ในห้องน้ำ ใกล้อ่างล้างหน้า หรือบนขอบหน้าต่าง ห้ามทิ้งยาไว้ในรถ

ความร้อนและความชื้นสามารถทำลายบางสิ่งได้
ยา.

หากแพทย์บอกให้คุณหยุดใช้ยานี้หรือ
วันหมดอายุ
วันหมดอายุตามเกสัชกรของคุณว่า
จะทำการอย่างไรกับยาที่เหลืออยู่

คินยาที่ไม่ได้ใช้ให้เภสัชกรของคุณ

ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย

หน้าตาเป็นยังไง

Visanne เป็นยาเม็ดกลม สีขาวหรือสี
ขาว มีเครื่องหมาย "B" อยู่ด้านหนึ่ง ตม
ตมมีบอกรหัสในสัปดาห์และบรรจุ 14 เม็ด

Visanne มาในแพ็ค 1 เดือน 3 เดือนและ
6 เดือน ขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่อาจไม่
สามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

วัตถุดิบ

สารออกฤทธิ์:

- โดโนเจสท์ 2 มก.

ส่วนผสมที่ไม่ใช้งาน:

- แลคโตสโมโนไฮเดรต
- มันฝรั่งแป้ง
- เซลลูโลส-microcrystalline
- โพรโตน
- แป้งฝุ่นบริสุทธิ์
- ครอสโพรโตน
- แมกนีเซียมสเตียเรต

เม็ด Visanne ไม่มีกลูเตน มาร์
กราซิน หรือสีย้อมเอโซ

ผู้ผลิต

ผลิตในประเทศเยอรมนีสำหรับ:

Bayer Australia Ltd
ABN 22 000 138 714
875 Pacific Highway
Pymble NSW 2073

หมายเลขทะเบียน

ออสเตรเลีย:

Visanne - AUST R 160465

วันที่เตรียมการ

26 กุมภาพันธ์ 2020

ดูเว็บไซต์ TGA

(www.ebs.tga.gov.au) สำหรับข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเวชภัณฑ์และผู้บริโภคของ
ออสเตรเลีย

® เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
กลุ่มไบเออร์ ประเทศเยอรมนี

© บริษัท ไบเออร์ออสเตรเลีย
จำกัด สงวนลิขสิทธิ์

