



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : NPS

VISANNE® (Vez- Ahn) dienogest

BUNUN İÇİNDE NE VAR BROŞÜR

Bu broşür, Visanne hakkında sık sorulan bazı soruları yanıtlamaktadır. Mevcut tüm içeriği içermiyor bilgi. Doktorunuz veya eczacınız ile konuşmanın yerini tutmaz.

Tüm ilaçların riskleri ve faydaları vardır. Doktorunuz, VISANNE almanın risklerini, sizin için sağlayacağını düşündükleri yararlarla karşılaştırdı.

Herhangi bir endişeniz varsa veya Bu ilacı alma konusunda emin değilseniz, daha fazla tavsiye için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu broşürü ilaç ile beraber saklayın.

Tekrar okumanız gerekebilir.

VISANNE NEDİR? İÇİN KULLANILIR

Visanne ağırlı semptomların tedavisinde kullanılır.

endometriyal lezyonlar (rahim astarının yer değiştirmiş dokusu).

Visanne bir progesteron hormonu olan dienogest içerir.

Her gün bir VISANNE tableti almak endometriyal dokunun küçülmesine yol açar ve buna bağlı pelvik ağrı ve ağırlı aylık kanamalar gibi şikayetleri azaltır.

Bunun nedenine ilişkin herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun. size ilaç yazıldı.

Doktorunuz başka bir nedenle reçete etmiş olabilir.

ALMADAN ÖNCE VISANNE

Ne zaman almamalısın

Aşağıdakilere karşı alerjiniz varsa Visanne'i kullanmayınız:

- dienogest (Visanne'deki aktif madde)
- listelenen bileşenlerden herhangi biri bu broşürün sonu.

Alerjik reaksiyon belirtilerinden bazıları şunları içerebilir:

- nefes darlığı
- hırıltı veya nefes almada zorluk
- yüzün, dudakların, dilin veya vücudun diğer kısımlarının şişmesi
- ciltte kızarıklık, kaşıntı veya kurdeşen.

Aşağıdaki durumlarda kan pıhtısı varsa veya olduysa Visanne'i kullanmayınız:

- bacakların kan damarları (derin ven trombozu - DVT)
- akciğerler (pulmoner emboli -PE)
- kalp (kalp krizi)
- beyin (inme)
- vücudun diğer kısımları.

Artan kan pıhtısı riskinden endişe duyuyorsanız VISANNE almayınız.

Kan pıhtıları nadirdir. Çok nadiren kan pıhtıları neden olabilir

ciddi kalıcı sakatlık, hatta ölümcül olabilir.

Aşağıdaki durumlardaysanız veya olduysa Visanne'i kullanmayınız:

- kan damarı hasarı olan şeker hastalığı
- şiddetli karaciğer hastalığı ve karaciğer fonksiyonunuz normale dönmeyi
- seks hormonlarının etkisi altında büyüeyebilen kanser (örn. meme veya genital organlar)
- iyi huylu veya kötü huylu karaciğer tümörü
- açıklanamayan vajinal kanama.

Bu koşullardan herhangi biri VISANNE kullanırken ilk kez ortaya çıkarsa, hemen almayı bırakın ve doktorunuza bildirin.

Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız VISANNE almayınız.

Başlamadan önce hamilelik olasılığı ekarte edilmelidir. Visanne.

Emziriyorsanız VISANNE almayınız.

Bir çocuğa Visanne vermeyin. VISANNE, kız çocuklarında menarştan (ilk adet kanaması) önce kullanılmaz.

Paket ve blister üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra VISANNE'yi almayınız.

Son kullanma tarihi karton üzerinde ve her bir blisterde "EXP"den sonra yazılıdır (örn. 11 18, Kasım 2018'i ifade eder). Son kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder. Son kullanma tarihi geçmişse, atılması için eczacınıza iade edin.

Ambalaj yırtılmışsa veya kurcalanma belirtileri gösteriyorsa Visanne'yi almayın.

Ambalaj hasarlıysa, bertaraf edilmesi için eczacınıza iade edin.

Bu ilacı almaya başlamanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz, doktorunuzla konuşun.

Onu almaya başlamadan önce

Başka ilaçlara, gıdalara, koruyucu maddelere veya boyalara karşı alerjiniz varsa doktorunuza söyleyiniz.

Aşağıda listelenen durumlardan herhangi birinin varlığında VISANNE kullanılırsa, yakın gözetim altında tutulmanız gerekebilir. Doktorunuz bunu size açıklayabilir. Bu nedenle, bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, VISANNE kullanmaya başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz:

- sigara içiyorsun
- fazla kilolusun
- şeker hastalığınız var veya önceki hamilelik sırasında geçici olarak şeker hastalığınız var
- yüksek tansiyonunuz var veya yüksek tansiyon geliştiriyorsunuz Visanne alırken
- depresyondan muzdaripsin
- dış gebelik geçirdiyse
- Visanne kullanırken bir karaciğer hastalığı geliştirirseniz. Belirtiler şunları içerebilir ciltte veya gözlerde sararma veya vücudun her yerinde kaşıntı. varsa da doktorunuzu bilgilendiriniz. semptomlar önceki bir hamilelik sırasında ortaya çıktı
- kloazmanız (ciltte, özellikle yüzde sarımsı kahverengi pigmentasyon lekeleri) varsa
 - öyleyse, güneşe veya ultraviyole radyasyona maruz kalmaktan kaçın
- Siz veya yakın ailenizdeki herhangi biri, bacaklarda veya akciğerlerde kan pıhtısı, kalp krizi, felç, meme kanseri veya yüksek kolesterol geçirdi.

Visanne laktöz monohidrat içerir.

Bazı şekerlere karşı intoleransınız varsa, VISANNE almaya başlamadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçları almak

Başka bir ilaç alıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Eczenenizden, süpermarketten veya sağlıklı gıda dükkanından reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere ilaçlar.

Bazı ilaçlar/gıdalar ve Visanne birbirini etkileyebilir. Bunlar şunları içerir:

- Fenitoin, primidon, barbitüratlar gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. fenobarbiton), karbamazepin, okskarbamazepin, topiramet, felbamet
- fluoksetin, fluvoksamin gibi depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar
- Yüksek tansiyon, göğüs ağrısı veya düzensiz kalp atışlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar olan diltiazem, verapamil
- rifampisin, rifabutin gibi tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar
- HIV veya hepatit C virüsünü (HCV) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
- Ketokonazol, itrakonazol, flukonazol gibi mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar, vorikonazol)
- bazı antibiyotikler (örn. eritromisin, klaritromisin)
- simetidin, bir antasit
- John's Wort içeren bitkisel ilaçlar
- greyfurt.

Bu ilaçlar/gıdalar Visanne'den etkilenebilir veya ne kadar iyi çalıştığını etkileyebilir. Doktorunuzun ilacınızın dozunu değiştirmesi veya farklı bir ilaç reçete etmesi gerekebilir.

Başka bir ilaç almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ilaç.

NASIL ALINIR VISANNE

Doktorunuz veya eczacınız tarafından size verilen tüm talimatları dikkatlice izleyin.

Bu broşürde yer alan bilgilerden farklı olabilirler.

Eczacı etiketinde veya bu kullanma talimatında yazılı olan ambalajın üzerindeki talimatları anlamadıysanız, doktorunuza veya yardım için eczacı.

nasıl alınır

Her gün yaklaşık aynı saatte ara vermeden günde bir tablet alın.

Tüm tabletler alınana kadar blister ambalajdaki okların yönünü izleyin.

Adet döngüsünün herhangi bir gününde tablet almaya başlayabilirsiniz.

Tabletler vajinal kanamaya bakılmaksızın sürekli olarak alınmalıdır. Bu, ilk paket bittikten sonra bir sonrakinin kesintisiz olarak başlatılması gerektiği anlamına gelir.

Tableti bütün olarak suyla yutunuz.

Yemekten önce veya sonra almanız farketmez.

Visanne ne kadar sürer

Doktorunuz size söylediği sürece ilacınızı almaya devam ediniz.

Bu ilaç durumunuzu kontrol etmeye yardımcı olur, ancak tedavi etmez. Kendinizi iyi hissetmeniz bile ilacınızı almaya devam etmeniz önemlidir.

Visanne'i almayı unutursanız

Bir tablet almayı unutursanız veya kusma ve/veya ishaliniz varsa:

VISANNE'in etkinliği, unutulmuş tabletler veya kusma ve/veya ishal durumunda (tablet alındıktan sonra 3-4 saat içinde ortaya çıkarsa) azalabilir. Tablet(ler)in unutulması durumunda, tabletinizi alır almaz sadece bir tablet almalısınız.

unutmayın ve ertesi gün tableti her zamanki saatinizde almaya devam etmelisiniz. Kusma veya ishal nedeniyle emilmeyen bir tablet de aynı şekilde bir tablet ile değiştirilmelidir.

Çok fazla alırsanız (doz aşımı)

Tavsiye için hemen Zehir Bilgi Merkezi (Avustralya: 13 11 26) ile iletişime geçin veya şu adrese gidin:

Kaza ve Acil Durum

En yakın hastane, sizin veya bir başkasının çok fazla Visanne almış olabileceğini düşünüyorsanız.

Herhangi bir rahatsızlık veya zehirlenme belirtisi olmasa bile bunu yapın.

Acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınız olabilir.

sen varken VISANNE ALMAK

yapmanız gerekenler

Sizi tedavi eden diğer doktorlara, diş hekimlerine ve eczacılara bu ilacı aldığınızı söyleyin.

Herhangi bir kan testi yaptırıcaksanız, doktorunuza bu ilacı aldığınızı söyleyiniz.

Bazı testlerin sonuçlarını etkileyebilir.

Ameliyat olacaksanız, cerrah veya anestezi uzmanına bu ilacı aldığınızı söyleyin.

Ameliyat sırasında kullanılan diğer ilaçları etkileyebilir.

İlerlemenizin kontrol edilebilmesi için doktorunuzun tüm randevularını saklayın.

Doktorunuz, ilacın işe yaradığından emin olmak ve istenmeyen yan etkileri önlemek için zaman zaman bazı testler yapabilir.

Bu ilacı kullanırken hamile kalırsanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

yapmaman gereken şeyler

Doktorunuz size söylemediği sürece, başka herhangi bir şikayeti tedavi etmek için VISANNE almayınız.

Sizinle aynı durumda olsalar bile ilacınızı başka birine vermeyin.

Dikkat edilmesi gerekenler

Hamile kalmaktan kaçınmak için hormonal olmayan ilaçlar kullanmalısınız. prezervatif veya başka bir bariyer yöntemi gibi doğum kontrol önlemleri.

Herhangi bir biçimde (tablet, yama, intrauterin) seks hormonu içeren kontraseptifler kullanmamalısınız. sistemi) Visanne alırken.

Ritim veya sıcaklık yöntemlerini kullanmayın. Bu yöntemler güvenilir olmazlar.

İstisnai bir durumda VISANNE kullanımı sırasında hamile kalırsanız, VISANNE gibi progesteron içeren preparatları kullananların ektopik gebelik (embriyo rahmin dışında gelişir) olasılığı daha yüksektir.

Geçmişte dış gebelik yaşadysanız veya fallop tüplerinde bozukluk varsa VISANNE almaya başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz.

Genel olarak yaşadığınız semptomlardan farklı, açıklanamayan karın şikayetleriniz varsa, endometriozis, derhal doktorunuza başvurmalısınız çünkü ektopik gebelik düşünülmelidir.

YAN ETKİLER

kullanırken kendinizi iyi hissetmiyorsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Visanne.

Tüm ilaçların yan etkileri olabilir. Bazen ciddidirler, çoğu zaman değildirler. Bazı yan etkileri yaşarsanız tıbbi müdahaleye ihtiyacınız olmayabilir.

Bu olası yan etkiler listesinden endişe etmeyin, bunların hiçbirini yaşamayabilirsiniz.

Aşağıdaki liste, Visanne'nin daha yaygın yan etkilerini içerir. Bunlar genellikle hafiftir ve zamanla azalır.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz ve bunlar sizi endişelendiriyorsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

- baş ağrısı veya migren
- mide rahatsızlığı,
- ateş basması
- depresyon, sinirlilik dahil olmak üzere ruh hali değişiklikleri, sinirlilik, uyku sorunları, sekse ilgi kaybı
- akne, saç dökülmesi
- mide bulantısı, karın ağrısı, rüzgar, şişmiş karın veya kusma
- kilo almak
- sırt ağrısı
- lekelenme dahil rahim/ vajinal kanama
- olağandışı zayıflık

Kendinizi iyi hissetmenize neden olan başka bir şey fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Listelenmeyen diğer yan etkiler de bazı kişilerde ortaya çıkabilir.

Tromboz

Tromboz, kanı bloke edebilen bir kan pıhtısı oluşumudur. gemi.

Tromboz bazen oluşur bacakların derin damarları (DVT). Bu kan pıhtısı olduğu damarlardan koparsa akciğer atardamarlarına ulaşır tıkararak pulmoner emboliye (PE) neden olabilir.

Derin ven trombozu nadir görülen bir durumdur. Visanne alıp almadığınız gelişebilir. Hamile kalırsanız da olabilir.

Venöz tromboembolizm (DVT veya PE) riski, VISANNE gibi hormonal (progesteron içeren) müstahzarları kullananlarda, kullanmayanlara göre biraz daha yüksek görünmektedir, ancak hamilelik veya kombine oral ilaç kullanımı sırasındaki kadar yüksek değildir. doğum kontrol hapları (Hap).

Venöz tromboembolizm riski artar, örneğin:

- artan yaşla
- fazla kiloluyunuz
- doğumdan kısa bir süre sonra
- Geçmişte kan pıhtısı olduysa
- Yakın ailenizde nispeten erken yaşta kan pıhtısı oluşmuşsa
- uzun süreli hareketsizlikler sırasında, örneğin ameliyattan sonra veya bacak(lar)ınızın alçı/ateller vs. içinde olması gibi.

Herhangi bir hastaneye yatış veya ameliyattan önce doktorunuza VISANNE kullandığınızı söyleyin.

Doktorunuz, ameliyattan birkaç hafta önce veya hareketsizlik anında ve tekrar VISANNE almaya başlayabileceğiniz zaman VISANNE almayı bırakmanızı söyleyebilir.

Kan pıhtıları ayrıca kalbin kan damarlarında (kalp krizine neden olur) veya beyinde (felce neden olur) oluşabilir.

Çalışmalarda, Visanne'e benzer progesteron içeren müstahzarlar ile artmış kalp krizi veya felç riski arasında bir bağlantı olduğuna dair çok az kanıt var veya hiç kanıt yok.

Bu tür olayların riski daha çok artan yaşla ilişkilidir, hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve sigara.

Hipertansiyonlu kadınlarda inme riski progesteron tarafından hafifçe artabilir. Visanne gibi müstahzarlar içeren.

Visanne kullanırken yüksek tansiyon geliştirirseniz, kullanmayı bırakmanız söylenebilir.

Olası bir kan pıhtısı belirtileri fark ederseniz, VISANNE almayı bırakın ve doktorunuza danışın. hemen.

Bir kan pıhtısı olası belirtileri şunlardır:

- olağandışı bir öksürük

- göğüste, kolda veya göğüs kemiğinin altında ağrı
- sırta yayılan rahatsızlık
- nefes darlığı ve/veya nefes almada zorluk
- bir bacağın şişmesi, ağrısı veya hassasiyeti
- özellikle vücudun bir tarafında yüz, kol veya bacakta ani güçsüzlük, uyuşukluk veya kötü 'iğnelenmeler'
- ani yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge veya koordinasyon kaybı
- şiddetli, ani mide ağrıları
- bir bayılma krizi, yoksa çökerseniz
- normalden daha kötü olan olağandışı baş ağrıları veya migren
- konuşma, anlama veya görme ile ilgili ani problemler

Kanser

Kombine oral kontraseptif (Hap) kullanan kadınlarda meme kanseri, aynı yaştaki ve Hapı kullanmayan kadınlara göre biraz daha sık teşhis edilmiştir. Farkın haptan mı yoksa haptan mı kaynaklandığı bilinmiyor.

Hap kullananlarda kanser daha erken tespit edildi.

Kanıt, sadece Visanne gibi progesteron preparatları için yetersizdir.

Göğüslerinizi düzenli olarak kontrol etmeniz ve herhangi bir yumru hissederseniz doktorunuzla iletişime geçmeniz önemlidir.

Hap kullananlarda nadir vakalarda iyi huylu karaciğer tümörleri ve daha da nadiren kötü huylu karaciğer tümörleri bildirilmiştir. Bu tümörler iç kanamaya neden olabilir.

Karnınızda şiddetli ağrı varsa hemen doktorunuza başvurun.

Kanama Modelleri

Visanne tedavisi, kadınların çoğunda adet kanama düzenini etkiler.

Adenomyozis uteri veya uterin leiomyomata gibi kadınlarda rahim kanaması, Visanne ile daha kötü olabilir.

Kanama ağır ve zamanla sürekli ise, bu anemiye (bazı durumlarda şiddetli) yol açabilir. Bu gibi durumlarda doktorunuz VISANNE almayı bırakmanızı tavsiye edebilir.

Kemik Mineral Yoğunluğu (BMD)

VISANNE'in uzun süreli kullanımı ergenlerin (12 ila <18 yaş) kemik mineral yoğunluğunu (KMY) etkileyebilir ve bu nedenle doktorunuz VISANNE kullanmanın yararlarını diğerlerine karşı dikkatle değerlendirecektir. kemik kaybı (osteoporoz) için potansiyel riskler, örn.

- metabolik kemik hastalığı
- Yakın akrabalarınızdan herhangi biri daha önce kemik kaybı (osteoporoz) yaşadığıysa
- Düşme veya kazadan kaynaklanmayan bir kemiğiniz kırıldıysa
- kemik kütlelerini azaltabilen ilaçların kullanımı, örneğin epilepsi ilaçları veya steroidler
- düşük vücut kitle indeksi veya yeme bozuklukları, örneğin anoreksiya nervoza veya bulimia
- alkol kullanımı
- sigara içmek

VISANNE kullanırken, doktorunuz osteoporoz riskinizi azaltmak için ağırlık taşıma egzersizi ve yeterli kalsiyum ve D vitamini içeren sağlıklı bir diyet gibi diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri de önerebilir. Kemik sağlığını iyileştirmek için doktorunuzdan tavsiye isteyin.

ALDIKTAN SONRA VISANNE

Depolamak

Tabletlerinizi alma zamanı gelene kadar blister ambalajında saklayın.

Tabletleri paketinden çıkarırsanız, iyi durmayabilirler.

Tabletlerinizi sıcaklığın yüksek olduğu serin ve kuru bir yerde saklayın. 30°C'nin altında kalır.

Visanne veya başka bir ilacı banyoda, lavabonun yanında veya pencere pervazında saklamayın. İlaçları arabada bırakmayın.

Isı ve nem bazılarını yok edebilir ilaçlar.

Doktorunuz size bu ilacı almayı bırakmanızı veya son kullanma tarihini tarihi geçmişse, kalan herhangi bir ilacı ne yapacağınızı eczacınıza sorunuz.

Kullanılmayan ilaçları eczacınıza iade edin.

ÜRÜN TANIM

Ne gibi görünüyor

Visanne, bir tarafında "B" ile işaretlenmiş yuvarlak, beyaz ila kirli beyaz bir tablettir. Blister paket haftanın günleri ile işaretlenmiştir ve 14 tablet içerir.

Visanne 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık paketler halinde gelir. Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

İçindekiler

Aktif içerik:

- dienogest 2 mg

Aktif olmayan bileşenler:

- laktoz monohidrat
- nişastalı patates
- selüloz-mikrokristal
- povidon
- saflaştırılmış talk
- krospovidon
- magnezyum stearat

Visanne tabletleri glüten, tartrazin veya azo boyar maddeler içermez.

Tedarikçi

Almanya'da üretilmiştir:

Bayer Avustralya Ltd.
ABN 22 000 138 714
875 Pasifik Otoyolu
Pymble NSW 2073

Avustralya kayıt numarası:

Visanne - AVUSTRALYA R 160465

Hazırlık Tarihi

26 Şubat 2020

TGA web sitesine bakın

(www.ebs.tga.gov.au) son durum için

Avustralya Tüketici Tıbbı
Bilgileri.

® Tescilli ticari markası
Bayer grubu, Almanya

© Bayer Avustralya Ltd.

Tüm hakları Saklıdır

