



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : NPS

# VISANNE® (viz- Ahn) chết người

## CÓ GÌ TRONG ĐÂY LEAFLET

Tờ rơi này trả lời một số câu hỏi phổ biến về Visanne. Nó không chứa tất cả những thứ có sẵn thông tin. Nó không thay thế cho việc nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Tất cả các loại thuốc đều có rủi ro và lợi ích. Bác sĩ của bạn đã cân nhắc những rủi ro khi bạn dùng Visanne so với những lợi ích mà họ mong đợi nó sẽ mang lại cho bạn.

**Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, hoặc không chắc chắn về việc dùng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được tư vấn thêm.**

**Giữ cái tờ giấy với mấy thứ thuốc nhé.**

Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.

## VISANNE LÀ GÌ

### ĐƯỢC DÙNG CHO

Visanne được sử dụng để điều trị các triệu chứng đau đớn của tổn thương nội mạc tử cung (mô di lệch của niêm mạc tử cung).

Visanne chứa một loại hormone progestogen, dienogest.

Uống một viên Visanne mỗi ngày dẫn đến sự co lại của mô nội mạc tử cung và làm giảm các triệu chứng liên quan như đau vùng chậu và chảy máu hàng tháng.

**Hỏi bác sĩ của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về lý do tại sao điều này thuốc đã được kê đơn cho bạn.**

Bác sĩ của bạn có thể đã kê đơn nó vì một lý do khác.

## TRƯỚC KHI BẠN LẤY VISANNE

*Khi nào bạn không nên lấy nó*

**Không dùng Visanne nếu bạn bị dị ứng với:**

- dienogest (thành phần hoạt chất trong Visanne)
- bất kỳ thành phần nào được liệt kê tại phần cuối của tờ rơi này.

Một số triệu chứng của phản ứng dị ứng có thể bao gồm:

- hụt hơi
- thở khò khè hoặc khó thở
- sưng mặt, môi, lưỡi hoặc các bộ phận khác của cơ thể
- phát ban, ngứa hoặc phát ban trên da.

**Không dùng Visanne nếu bạn có hoặc đã có cục máu đông trong:**

- mạch máu của chân (huyết khối tĩnh mạch sâu - DVT)
- phổi (thuyên tắc phổi - PE)
- tim (đau tim)
- não (đột quỵ)
- các bộ phận khác của cơ thể.

**Không dùng Visanne nếu bạn lo lắng về việc tăng nguy cơ đông máu.**

Các cục máu đông rất hiếm. Đôi khi có thể gây ra cục máu đông

thương tật vĩnh viễn nghiêm trọng, hoặc thậm chí có thể gây tử vong.

**Đừng dùng Visanne nếu bạn đã hoặc đã có:**

- bệnh đái tháo đường với tổn thương mạch máu
- bệnh gan nặng và chức năng gan của bạn không trở lại bình thường
- ung thư có thể phát triển dưới ảnh hưởng của hormone sinh dục (ví dụ: của vú hoặc các cơ quan sinh dục)
- khối u gan lành tính hoặc ác tính
- chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân.

**Nếu bất kỳ điều kiện nào trong số này xuất hiện lần đầu tiên khi dùng Visanne, hãy ngừng dùng ngay và cho bác sĩ của bạn.**

**Không dùng Visanne nếu bạn đang mang thai hoặc nghĩ rằng bạn có thể mang thai.**

Nên loại trừ khả năng có thai trước khi bắt đầu Visanne.

**Không dùng Visanne nếu bạn đang cho con bú.**

**Đừng đưa Visanne cho một đứa trẻ.**

Visanne không được sử dụng cho trẻ em nữ trước kỳ kinh nguyệt (ra máu kinh đầu tiên).

**Không dùng Visanne sau ngày hết hạn được in trên bao bì và vỉ.**

Hạn sử dụng được in trên hộp và trên mỗi vỉ sau "EXP" (ví dụ: 11 18 đề cập đến tháng 11 năm 2018). Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó. Nếu nó đã hết hạn, hãy trả lại cho dược sĩ của bạn để xử lý.

## Không dùng Visanne nếu bao bì bị rách hoặc có dấu hiệu giả mạo.

Nếu bao bì bị hỏng, hãy trả lại cho dược sĩ của bạn để xử lý.

Nếu bạn không chắc mình có nên bắt đầu dùng thuốc này hay không, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn.

### Trước khi bạn bắt đầu dùng nó

Cho bác sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ loại thuốc, thực phẩm, chất bảo quản hoặc thuốc nhuộm nào khác.

Nếu Visanne được sử dụng với bất kỳ điều kiện nào được liệt kê dưới đây, bạn có thể cần được giám sát chặt chẽ. Bác sĩ của bạn có thể giải thích điều này cho bạn. Do đó, nếu bất kỳ điều nào trong số này áp dụng cho bạn, hãy nói với bác sĩ của bạn trước khi bắt đầu sử dụng Visanne:

- bạn hút thuốc
- Bạn hơi nặng kí rồi đó
- bạn bị tiểu đường hoặc bị tiểu đường tạm thời trong lần mang thai trước
- bạn bị cao huyết áp hoặc phát triển huyết áp cao trong khi dùng Visanne
- bạn đã bị trầm cảm
- nếu bạn đã có thai ngoài tử cung
- bạn phát triển bệnh gan khi dùng Visanne.  
Các triệu chứng có thể bao gồm vàng da, mắt hoặc ngứa khắp người. Thông báo cho bác sĩ của bạn nếu như vậy các triệu chứng xảy ra trong lần mang thai trước
- bạn bị nám da (các mảng sẫm tố màu hơi vàng trên da, đặc biệt là ở mặt)
  - nếu vậy, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc bức xạ tia cực tím
- bạn hoặc bất kỳ ai trong gia đình trực hệ của bạn đã bị đông máu ở chân hoặc phổi, đau tim, đột quỵ, ung thư vú hoặc cholesterol cao.

## Visanne có chứa lactose monohydrate.

Nếu bạn không dung nạp một số loại đường, hãy liên hệ với bác sĩ trước khi bạn bắt đầu dùng Visanne.

### Dùng các loại thuốc khác

Nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn đang dùng bất kỳ loại nào khác thuốc, bao gồm bất kỳ loại thuốc nào bạn nhận được mà không cần đơn từ hiệu thuốc, siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm chăm sóc sức khỏe của bạn.

Một số loại thuốc / thực phẩm và Visanne có thể gây nhiễu lẫn nhau.

Bao gồm các:

- thuốc được sử dụng để điều trị chứng động kinh như phenytoin, primidone, barbiturat (ví dụ: phenobarbitone), carbamazepine, oxcarbamazepine, topiramate, felbamate
- thuốc dùng để điều trị trầm cảm như fluoxetine, fluvoxamine
- diltiazem, verapamil là những loại thuốc được sử dụng để điều trị huyết áp cao, đau ngực hoặc nhịp tim không đều
- thuốc dùng để điều trị bệnh lao như rifampicin, rifabutin
- thuốc được sử dụng để điều trị HIV hoặc vi rút viêm gan C (HCV)
- thuốc được sử dụng để điều trị nhiễm nấm như ketoconazole, itraconazole, fluconazole, voriconazole)
- một số thuốc kháng sinh (ví dụ như erythromycin, clarithromycin)
- cimetidine, một loại thuốc kháng axit
- thuốc thảo dược có chứa St. John's Wort
- bưởi.

Các loại thuốc / thực phẩm này có thể bị ảnh hưởng bởi Visanne hoặc có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của thuốc. Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc kê một loại thuốc khác.

**Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng bất kỳ loại nào khác thuốc.**

## CÁCH THAM GIA VISANNE

Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn một cách cẩn thận.

Chúng có thể khác với thông tin có trong tờ rơi này.

**Nếu bạn không hiểu hướng dẫn trên bao bì, được in trên nhãn dược sĩ hoặc trong tờ rơi này, hãy hỏi bác sĩ của bạn hoặc dược sĩ để được giúp đỡ.**

### Làm thế nào để lấy nó

Uống một viên mỗi ngày vào cùng thời điểm mỗi ngày, không nghỉ.

Làm theo hướng của các mũi tên trên vỉ cho đến khi uống hết các viên.

Có thể bắt đầu sử dụng máy tính bảng vào bất kỳ ngày nào trong chu kỳ kinh nguyệt của bạn.

Viên nén phải được thực hiện liên tục mà không liên quan đến chảy máu âm đạo. Điều này có nghĩa là sau khi gói đầu tiên kết thúc, gói tiếp theo sẽ được bắt đầu mà không bị gián đoạn.

**Nuốt toàn bộ viên thuốc với nước.**

Không thành vấn đề nếu bạn uống trước hay sau khi ăn.

### Mất bao lâu để dùng Visanne

**Tiếp tục dùng thuốc của bạn cho đến khi bác sĩ nói với bạn.**

Thuốc này giúp kiểm soát tình trạng của bạn, nhưng không chữa khỏi bệnh. Điều quan trọng là phải tiếp tục uống thuốc ngay cả khi bạn cảm thấy khỏe.

### Nếu bạn quên uống Visanne

**Nếu bạn quên uống một viên thuốc hoặc nếu bạn bị nôn mửa và / hoặc tiêu chảy:**

Hiệu quả của Visanne có thể bị giảm trong trường hợp quên viên nén hoặc nôn mửa và / hoặc tiêu chảy (nếu xảy ra trong vòng 3-4 giờ sau khi uống viên). Trong trường hợp bỏ lỡ (các) máy tính bảng, bạn chỉ nên uống một viên thuốc ngay khi bạn

hãy nhớ, và sau đó nên tiếp tục dùng máy tính bảng vào giờ bình thường của bạn vào ngày hôm sau. Tương tự như vậy, một viên thuốc không được hấp thu do nôn mửa hoặc tiêu chảy nên được thay thế bằng một viên thuốc.

*Nếu bạn dùng quá nhiều (quá liều)*

**Liên hệ ngay với Trung tâm Thông tin Chất độc (Úc: 13 11 26) để được tư vấn, hoặc truy cập Tai nạn và Khẩn cấp tại bệnh viện gần nhất, nếu bạn nghĩ rằng bạn hoặc bất kỳ ai khác có thể đã dùng quá nhiều Visanne.**

**Làm điều này ngay cả khi không có dấu hiệu khó chịu hoặc ngộ độc.**

Bạn có thể cần chăm sóc y tế khẩn cấp.

---

## TRONG KHI BẠN ĐANG THAM GIA VISANNE

---

*Những điều bạn phải làm*

**Cho bất kỳ bác sĩ, nha sĩ và dược sĩ nào khác điều trị với bạn rằng bạn đang dùng thuốc này.**

**Nếu bạn chuẩn bị làm bất kỳ xét nghiệm máu nào, hãy nói với bác sĩ rằng bạn đang dùng thuốc này.**

Nó có thể ảnh hưởng đến kết quả của một số bài kiểm tra.

**Nếu bạn chuẩn bị phẫu thuật, hãy nói với bác sĩ phẫu thuật hoặc bác sĩ gây mê rằng bạn đang dùng thuốc này.**

Nó có thể ảnh hưởng đến các loại thuốc khác được sử dụng trong quá trình phẫu thuật.

**Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn để có thể kiểm tra tiến trình của bạn.**

Bác sĩ của bạn có thể thực hiện một số xét nghiệm theo thời gian để đảm bảo thuốc đang hoạt động và ngăn ngừa các tác dụng phụ không mong muốn.

**Nếu bạn có thai trong khi dùng thuốc này, hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức.**

*Những điều bạn không được làm*

**Không dùng Visanne để điều trị bất kỳ khiếm nại nào khác trừ khi bác sĩ yêu cầu.**

**Không đưa thuốc của bạn cho bất kỳ ai khác, ngay cả khi họ có cùng tình trạng với bạn.**

*Những điều cần cẩn thận*

Để tránh mang thai, bạn nên sử dụng thuốc không nội tiết

các biện pháp phòng ngừa tránh thai, chẳng hạn như bao cao su hoặc các biện pháp rào cản khác.

Bạn không được sử dụng các biện pháp tránh thai chứa hormone sinh dục dưới bất kỳ hình thức nào (viên nén, miếng dán, thuốc đặt trong tử cung hệ thống) trong khi dùng Visanne.

Không sử dụng phương pháp nhịp điệu hoặc nhiệt độ. Những phương pháp này có thể không đáng tin cậy.

Nếu trong một trường hợp ngoại lệ, bạn nên mang thai trong thời gian sử dụng Visanne, thì khả năng cao hơn ở những người sử dụng các chế phẩm có chứa progestogen như Visanne mang thai ngoài tử cung (phôi thai phát triển bên ngoài tử cung).

Hãy cho bác sĩ biết trước khi bạn bắt đầu dùng Visanne, nếu bạn đã từng mang thai ngoài tử cung hoặc bị suy giảm chức năng của ống dẫn trứng.

Nếu bạn gặp phải những phản nản về bụng không giải thích được khác với những triệu chứng bạn thường gặp từ lạc nội mạc tử cung, bạn nên liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức vì thai ngoài tử cung phải được xem xét.

---

## PHẢN ỨNG PHỤ

---

**Nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn càng sớm càng tốt nếu bạn cảm thấy không khỏe khi đang dùng Visanne.**

Tất cả các loại thuốc đều có thể gây nên tác dụng phụ. Đôi khi họ nghiêm túc, hầu hết thời gian thì không. Bạn có thể không cần chăm sóc y tế nếu bạn nhận được một số tác dụng phụ.

**Đừng lo lắng bởi danh sách các tác dụng phụ có thể xảy ra này, bạn có thể không gặp phải bất kỳ tác dụng phụ nào.**

Danh sách sau đây bao gồm những tác dụng phụ phổ biến hơn của Visanne. Chúng thường nhẹ và giảm dần theo thời gian.

**Nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây và chúng làm bạn lo lắng, hãy nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn:**

- nhức đầu hoặc đau nửa đầu
- khó chịu ở vú,
- nóng bừng
- thay đổi tâm trạng, bao gồm trầm cảm, cấu kính, lo lắng, khó ngủ, mất hứng thú với tình dục
- mụn trứng cá, rụng tóc
- buồn nôn, đau bụng, gió, sưng bụng hoặc nôn mửa
- tăng cân
- đau lưng
- chảy máu tử cung / âm đạo bao gồm cả đốm
- điểm yếu bất thường

**Nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều gì khác khiến bạn cảm thấy không khỏe.**

Các tác dụng phụ khác không được liệt kê cũng có thể xảy ra ở một số người.

### *Huyết khối*

Huyết khối là sự hình thành cục máu đông có thể gây tắc nghẽn mạch máu tàu.

Huyết khối đôi khi xảy ra ở các tĩnh mạch sâu của chân (DVT). Nếu cục máu đông này vỡ ra khỏi các tĩnh mạch nơi nó được hình thành, nó có thể đến và làm tắc các động mạch phổi, gây ra thuyên tắc phổi (PE).

Huyết khối tĩnh mạch sâu là một trường hợp hiếm khi xảy ra. Nó có thể phát triển cho dù bạn có đang dùng Visanne hay không. Nó cũng có thể xảy ra nếu bạn mang thai.

Nguy cơ huyết khối tĩnh mạch (DVT hoặc PE) dường như cao hơn một chút ở những người sử dụng các chế phẩm chứa nội tiết tố (chứa progestogen) như Visanne, so với những người không sử dụng, nhưng không cao như trong thời kỳ mang thai hoặc trong khi sử dụng kết hợp đường uống

thuốc tránh thai (thuốc tránh thai).

Nguy cơ huyết khối tĩnh mạch tăng lên, chẳng hạn như:

- với tuổi tác ngày càng tăng
- nếu bạn thừa cân
- ngay sau khi sinh con
- nếu bạn đã có một cục máu đông trong quá khứ
- nếu ai đó trong gia đình bạn bị đông máu ở độ tuổi tương đối sớm
- trong thời gian dài bất động, ví dụ như sau khi phẫu thuật hoặc bó (các) chân của bạn bằng thạch cao / nẹp, v.v.

Cho bác sĩ biết bạn đang sử dụng Visanne trước khi nhập viện hoặc phẫu thuật dự kiến.

Bác sĩ có thể yêu cầu bạn ngừng dùng Visanne vài tuần trước khi phẫu thuật, hoặc tại thời điểm bất động và khi nào bạn có thể bắt đầu dùng lại Visanne.

Cục máu đông cũng có thể xảy ra trong các mạch máu của tim (gây đau tim) hoặc não (gây đột quỵ).

Từ các nghiên cứu, có rất ít hoặc không có bằng chứng về mối liên hệ giữa các chế phẩm chứa progestogen tương tự như Visanne và tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.

Rủi ro của những sự kiện như vậy liên quan đến tuổi tác ngày càng tăng, tăng huyết áp (huyết áp cao) và hút thuốc.

Ở phụ nữ bị tăng huyết áp, nguy cơ đột quỵ có thể tăng nhẹ do progestogen có chứa các chế phẩm như Visanne.

Nếu bạn phát triển huyết áp cao trong khi sử dụng Visanne, bạn có thể được yêu cầu ngừng sử dụng nó.

**Nếu bạn nhận thấy các dấu hiệu có thể có của cục máu đông, hãy ngừng dùng Visanne và tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn ngay lập tức.**

**Các dấu hiệu có thể có của cục máu đông bao gồm:**

- một cơn ho bất thường

- đau ở ngực, cánh tay hoặc dưới xương ức
- khó chịu tỏa ra sau lưng
- khó thở và / hoặc khó thở
- sưng, đau hoặc đau một bên chân
- đột ngột yếu, tê hoặc 'kim châm' ở mặt, cánh tay hoặc chân, đặc biệt là ở một bên của cơ thể
- đột ngột khó đi bộ, chóng mặt, mất thăng bằng hoặc phối hợp
- đau bụng dữ dội, đột ngột
- một cuộc tấn công ngất xỉu, hoặc bạn gục ngã
- đau đầu bất thường hoặc chứng đau nửa đầu tồi tệ hơn bình thường
- các vấn đề đột ngột với lời nói, sự hiểu biết hoặc thị lực của bạn

#### *Cung Cự Giải*

Ung thư vú được chẩn đoán thường xuyên hơn ở những phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai kết hợp (Thuốc tránh thai) so với những phụ nữ cùng tuổi không sử dụng Thuốc tránh thai. Không biết liệu sự khác biệt là do thuốc hay liệu

ung thư đã được phát hiện sớm hơn ở những người dùng thuốc tránh thai.

Bằng chứng là không thể kết luận đối với các chế phẩm chỉ có progesterone như Visanne.

**Điều quan trọng là bạn phải kiểm tra vú thường xuyên và liên hệ với bác sĩ nếu bạn cảm thấy bất kỳ khối u nào.**

Trong một số trường hợp hiếm hoi, các khối u gan lành tính và thậm chí hiếm hơn, các khối u gan ác tính đã được báo cáo ở những người sử dụng thuốc. Những khối u này có thể dẫn đến chảy máu bên trong.

**Liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn bị đau dữ dội ở bụng.**

#### *Các mô hình chảy máu*

Điều trị bằng Visanne ảnh hưởng đến mô hình chảy máu kinh nguyệt ở đa số phụ nữ.

Chảy máu tử cung ở phụ nữ bị u tuyến tử cung hoặc u xơ tử cung, có thể nặng hơn khi dùng Visanne.

**Nếu chảy máu nhiều và liên tục trong thời gian dài, điều này có thể dẫn đến thiếu máu (nghiêm trọng trong một số trường hợp).**

**Trong những trường hợp như vậy, bác sĩ có thể khuyên bạn ngừng dùng Visanne.**

#### *Mật độ khoáng xương (BMD)*

Việc sử dụng Visanne lâu dài có thể ảnh hưởng đến mật độ khoáng xương (BMD) của thanh thiếu niên (12 đến <18 tuổi) và do đó bác sĩ của bạn sẽ cần nhắc nhở cẩn thận giữa lợi ích của việc sử dụng Visanne so với các nguy cơ tiềm ẩn đối với mất xương (loãng xương), ví dụ

- bệnh xương chuyển hóa
- nếu ai đó trong gia đình bạn đã từng bị mất xương (loãng xương)
- nếu bạn đã từng bị gãy xương mà không phải do ngã hoặc tai nạn
- sử dụng các loại thuốc có thể làm giảm khối lượng xương, ví dụ như thuốc động kinh hoặc steroid
- chỉ số khối cơ thể thấp hoặc rối loạn ăn uống như chán ăn tâm thần hoặc ăn vô độ
- sử dụng rượu
- hút thuốc

Khi sử dụng Visanne, bác sĩ cũng có thể khuyên bạn nên thay đổi chế độ ăn uống và lối sống như tập thể dục chịu trọng lượng và chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm đầy đủ canxi và vitamin D, để giảm nguy cơ loãng xương. Hãy hỏi bác sĩ của bạn để được tư vấn để cải thiện sức khỏe xương của bạn.

---

## SAU KHI KẼ VISANNE

---

### *Kho*

#### **Giữ máy tính bảng của bạn trong vỉ cho đến khi uống.**

Nếu bạn lấy viên thuốc ra khỏi bao bì, chúng có thể không giữ được tốt.

#### **Giữ máy tính bảng của bạn ở nơi khô mát, nơi có nhiệt độ ở dưới 30 ° C.**

**Không cất Visanne hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác trong phòng tắm, gần bồn rửa hoặc trên bệ cửa sổ. Không để thuốc trong xe.**

Nhiệt và ẩm ướt có thể phá hủy một số các loại thuốc.

Nếu bác sĩ yêu cầu bạn ngừng dùng thuốc này hoặc hết hạn sử dụng đã qua ngày, hãy hỏi dược sĩ của bạn phải làm gì với bất kỳ loại thuốc nào còn sót lại.

**Trả lại bất kỳ loại thuốc không sử dụng nào cho dược sĩ của bạn.**

---

## SẢN PHẨM SỰ MIÊU TẢ

---

### *Nó trông như thế nào*

Visanne là một viên tròn, màu trắng đến trắng được đánh dấu bằng chữ "B" ở một mặt. Vỉ có ghi các ngày trong tuần gồm 14 viên.

Visanne có các gói 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng. Không phải tất cả các kích cỡ gói có thể được bán trên thị trường.

### *Thành phần*

Thành phần hoạt tính:

- dienogest 2mg

Thành phần không hoạt động:

- Lactose monohydrate
- khoai tây tinh bột
- cellulose-vi tinh thể
- povidone
- bột talc tinh khiết
- crospovidone
- Chất Magiê Stearate

Viên nén Visanne không chứa gluten, tartrazine hoặc thuốc nhuộm azo.

### *Nhà cung cấp*

Sản xuất tại Đức cho:

Bayer Australia Ltd  
ABN 22 000 138 714 875  
Xa lộ Thái Bình Dương  
Pymble NSW 2073

### *Số đăng ký Úc:*

Visanne - AUST R 160465

### *Ngày chuẩn bị*

26 tháng 2 năm 2020

Xem trang web TGA

([www.ebs.tga.gov.au](http://www.ebs.tga.gov.au)) để biết thông tin mới nhất

Thông tin về Thuốc tiêu dùng của Úc.

® Nhãn hiệu đã đăng ký của Nhóm Bayer, Đức

© Bayer Australia Ltd Đã đăng ký Bản quyền

